

**Faringosept 10 mg comprimate de supt**  
Ambazonă monohidrat

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**

**CUTIE CU BLISTER DIN AI/PVC-PE-PVDC transparent, incolor**  
**CUTIE CU BLISTER DIN AI/PVC-PE-PVDC transparent, maro**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Faringosept 10 mg comprimate de supt  
Ambazonă monohidrat

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Fiecare comprimat de supt conține ambazonă monohidrat 10 mg.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Conține zahăr și lactoză monohidrat (vezi prospectul pentru informații suplimentare).

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Comprimat de supt  
10 comprimate de supt

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Administrare bucofaringiană.  
A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

#### **9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

#### **10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**

#### **11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Terapia S.A.  
Str. Fabricii nr. 124, Cluj Napoca, România

Sigla Terapia/Ranbaxy

#### **12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

769/2008/01 ( blister din Al/PVC-PE-PVDC transparent, incolor)  
769/ 2008 /02 (blister din Al/PVC-PE-PVDC transparent, maro)

#### **13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Serie:

#### **14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

#### **15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Se utilizează la adulți, adolescenți și copii cu vârsta peste 14 ani ca adjuvant în infecții acute cu poartă de intrare sau localizare la nivelul cavității bucale și faringelui (gingivite, faringite, amigdalite) și postamigdalectomie (îndepărtarea amigdalelor pe cale chirurgicală). Comprimatele nu se înghit, ci se lasă să se dizolve lent în cavitatea bucală.

Doza uzuală la adulți este de 3 - 5 comprimate pe zi timp de 3 – 4 zile, la adolescenți și copii cu vârsta peste 14 ani este de 1 comprimat de 3 ori pe zi timp de 3 - 4 zile. Se administrează imediat după mese (la 15-30 minute). Se recomandă ca timp de 2-3 ore după administrare să se evite consumul de alimente sau lichide.

Nu depășiți doza recomandată. Dacă simptomele persistă, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră.

#### **16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

Faringosept 10 mg

**Faringosept 10 mg comprimate de supt**  
Ambazonă monohidrat

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE  
TERMOSUDATĂ**

**BLISTER DIN Al/PVC-PE-PVDC transparent, incolor**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Faringosept 10 mg comprimate de supt  
Ambazonă monohidrat

**2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Sigla Terapia/Ranbaxy

**3. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Serie:

**5. ALTE INFORMAȚII**

**Faringosept 10 mg comprimate de supt**  
Ambazonă monohidrat

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE  
TERMOSUDATĂ**

**BLISTER DIN AI/PVC-PE-PVDC transparent, maro**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Faringosept 10 mg comprimate de supt  
Ambazonă monohidrat

**2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Sigla Terapia/Ranbaxy

**3. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Serie:

**5. ALTE INFORMAȚII**