

OROFAR 1 mg/1 mg comprimate de supt
Clorură de benzoxoniu/clorhidrat de lidocaină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

OROFAR 1 mg/1 mg comprimate de supt
Clorură de benzoxoniu/clorhidrat de lidocaină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat de supt conține clorură de benzoxoniu 1 mg și clorhidrat de lidocaină 1 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR.

Conține sorbitol (E 420) (vezi prospectul pentru informații suplimentare).

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Comprimat de supt
24 comprimate de supt

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare bucofaringiană.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

KR/Drugs/KTK/25/460/2001

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original.
A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

STADA M&D SRL
Strada Sfântul Elefterie, nr. 18, Parte A, Etaj 1
Sector 5, București, România

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

7709/2015/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Tratament simptomatic în cazul infecțiilor orofaringiene: dureri în gât asociate cu răceli, faringite, laringite, stomatite, afte, gingivite. Adjuvant în tratamentul amigdalitelor.

Doze

Adulți și copii peste 12 ani

În infecțiile ușoare-moderate: lăsați să se dizolve lent în gură un comprimat de supt la fiecare 2-3 ore; în cazul aftelor, comprimatul de supt se lasă să se dizolve lent în contact cu leziunea.

Infecții severe: un comprimat de supt la fiecare 1-2 ore, fără a se depăși 10 comprimate de supt pe zi.

Copii între 6 și 11 ani

Nu se va depăși doza de 6 comprimate de supt pe zi.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Orofar comprimate de supt

OROFAR 1 mg/1 mg comprimate de supt
Clorură de benzoxoniu/clorhidrat de lidocaină

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ**

BLISTER

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

OROFAR 1 mg/1 mg comprimate de supt
Clorură de benzoxoniu/clorhidrat de lidocaină

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

STADA M&D SRL

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

5. ALTE INFORMAȚII

KR/Drugs/KTK/25/460/2001