

**Vicks Sinex 0,5 mg/ml spray nazal, soluție  
clorhidrat de oximetazolină**

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****CUTIE****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Vicks Sinex 0,5 mg/ml spray nazal, soluție  
clorhidrat de oximetazolină

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

1 ml soluție conține: clorhidrat de oximetazolină 0,5 mg.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Excipienți:

Sorbitol (E 420), citrat de sodiu dihidrat (pentru ajustarea pH-ului), polisorbitat 80, alcool benzilic, acid citric anhidru (pentru ajustarea pH-ului), soluție de clorură de benzalconiu, acesulfam de potasiu, (levo) mentol, cineol, edetat disodic, extract uscat de aloe vera, (levo) carvonă, apă purificată.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Spray nazal, soluție

15 ml

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Administrare nazală.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

Aruncați după 12 luni de la prima deschidere a flaconului

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL****11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Wick Pharma, Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH  
Sulzbacher Straße 40, 65824 Schwalbach am Taunus, Germania

**12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

8034/2015/01-ambalaj cu 1 flacon a 15 ml

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Serie:

**14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

**15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Pentru tratamentul de scurtă durată al congestiei mucoasei nazale în răceală sau rinită.

Doze:

Adulți, adolescenți și copii cu vârsta peste 10 ani: 1-2 pulverizări în fiecare nară de maxim 2-3 ori pe zi.

Copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 10 ani: 1 pulverizare în fiecare nară de maxim 2-3 ori pe zi.

Vicks Sinex nu este destinat copiilor cu vârsta sub 6 ani.

Nu utilizați acest medicament mai mult de 7 zile consecutive.

**16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

VICKS SINEX 0,5 mg/ml spray nazal, soluție

**17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

Nu este cazul.

**18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

Nu este cazul.

**Vicks Sinex 0,5 mg/ml spray nazal, soluție  
clorhidrat de oximetazolină****MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE  
MICI****Etichetă de flacon****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE  
ADMINISTRARE**

Vicks Sinex 0,5 mg/ml spray nazal, soluție  
clorhidrat de oximetazolină  
Administrare nazală

**2. MODUL DE ADMINISTRARE**

A se citi prospectul înainte de utilizare

**3. DATA DE EXPIRARE**

Exp:

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Serie:

**5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ**

15 ml

**6. ALTE INFORMAȚII**

Pentru tratamentul de scurtă durată al congestiei mucoasei nazale în răceală sau rinită.

Conține: clorură de benzalconiu, alcool benzilic, levomentol și cineol. Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

Doze:

Adulți, adolescenți și copii cu vârsta peste 10 ani: 1-2 pulverizări în fiecare nară de maxim 2-3 ori pe zi.

Copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 10 ani: 1 pulverizare în fiecare nară de maxim 2-3 ori pe zi.

Vicks Sinex nu este destinat copiilor cu vârsta sub 6 ani.

Acest medicament nu trebuie utilizat mai mult de 7 zile consecutive.