

ASPENTER 75 mg comprimate gastrorezistente
Acid acetilsalicilic**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****CUTIE****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

ASPENTER 75 mg comprimate gastrorezistente
Acid acetilsalicilic

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Un comprimat gastrorezistent conține acid acetilsalicilic 75 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Comprimat gastrorezistent
30 comprimate gastrorezistente
50 comprimate gastrorezistente
28 comprimate gastrorezistente

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMANA ȘI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONĂRE(ĂRI) SPECIALĂ(E) DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ÎNDEPĂRTAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

TERAPIA S.A.
Str. Fabricii Nr. 124, Cluj Napoca, județul Cluj
România
{Sigla companiei}

12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

8517/2016/01- ambalaj cu 30 comprimate gastrorezistente
8517/2016/02 -ambalaj cu 50 comprimate gastrorezistente
8517/2016/03- ambalaj cu 28 comprimate gastrorezistente

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Aspenter 75 mg acționează prin prevenirea formării cheagurilor de sânge și este utilizat pentru reducerea riscului de infarct miocardic la pacienții cu angină pectorală sau cu factori de risc multipli, prevenirea repetării infarctului miocardic și a accidentului vascular cerebral ischemic tranzitor și a infarctului cerebral, menținerea circulației sângelui la nivelul vaselor de sânge ale inimii după anumite intervenții chirurgicale.

Nu luați Aspenter 75 mg dacă sunteți alergic la acidul acetilsalicilic, la alți salicilați sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament.

Nu se utilizează Aspenter 75 mg la copiii cu vârsta sub 16 ani.

Doza uzuală pentru utilizare pe termen lung este de 75-150 mg o dată pe zi.

A nu se depăși doza și durata recomandate pentru tratament.

Pentru informații suplimentare consultați prospectul Aspenter 75 mg.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

{ASPENTER 75 mg}

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

<Nu este cazul.>

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

<Nu este cazul.>

ASPENTER 75 mg comprimate gastrorezistente
Acid acetilsalicilic

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ**

BLISTER din oPA-Al-PVC/Al

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ASPENTER 75 mg comprimate gastrorezistente
Acid acetilsalicilic

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

{Sigla companiei}

3. DATA DE EXPIRARE

EXP
{LL/AAAA}

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

5. ALTE INFORMAȚII

Pentru blisterul cu 7 comprimate gastrorezistente:

Abrevieri pentru zilele săptămânii:

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du