

Fervex durere și febră pentru copii 30 mg/ml soluție orală
paracetamol**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ȘI PRIMAR**
CUTIE DE CARTON ȘI ETICHETA DE FLACON**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Fervex durere și febră pentru copii 30 mg/ml soluție orală
paracetamol

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI ACTIVE

Fiecare ml de soluție orală conține paracetamol 30 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR**Cutie:**

Excipienți cu efect cunoscut: sucroză, propilenglicol (E1520), sodiu și urme de alcool benzilic și sulfiți.
Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Soluție orală cu linguriță dozatoare
90 ml
150 ml

5. MODUL ȘI CALEA DE ADMINISTRARE

Administrare orală
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

Cutie:

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C. A se păstra în ambalajul original.
Soluția orală trebuie utilizată în maxim 3 luni după prima deschidere.

Flacon:

Soluția orală trebuie utilizată în maxim 3 luni după prima deschidere.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Cutie

UPSA SAS
3, rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison, Franța

Flacon

UPSA SAS, Franța

12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

8837/2016/01-02

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Cutie

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Cutie

Alină durerea și febra

Fervex durere și febră pentru copii este indicat în tratamentul simptomatic al febrei și/sau durerilor, cum ar fi dureri de cap, răceală, dureri de dinți, dureri musculare.

Doza zilnică maximă de paracetamol nu trebuie să depășească 60 mg/kg. Intervalul minim dintre administrări este de 4 până la 6 ore.

Fervex durere și febră pentru copii 30 mg/ml trebuie administrat de la 10 la 15 mg/kg/doză, la fiecare 4 - 6 ore, până la o doză totală zilnică maximă de 60 mg/kg pe zi.

Acest medicament este destinat copiilor cu greutatea corporală de la 4 la 32 kg (de exemplu: copii de la 1 lună la 12 ani). Doza trebuie stabilită în funcție de greutatea copilului. Semnul de pe lingurița dozatoare arată doza medicamentului în funcție de greutatea copilului. Pentru administrare utilizați lingurița

dozatoare inclusă în ambalaj. Nu utilizați un alt dispozitiv de măsurare.

Pentru copiii care au alte greutăți sunt disponibile alte forme de paracetamol pentru care trebuie să vă adresați medicului sau farmacistului.

Soluția poate fi băută ca atare sau diluată într-o cantitate mică de lichid (de exemplu: apă, lapte, suc de fructe).

Se apasă și se învâрте capacul pentru a deschide flaconul.

Se închide flaconul după fiecare utilizare.

A nu se lua împreună cu alte medicamente care conțin paracetamol.

Flacon

Acest medicament este destinat copiilor cu greutatea corporală de la 4 la 32 kg (de exemplu: copii de la 1 lună la 12 ani). Doza trebuie stabilită în funcție de greutatea copilului. Semnul de pe lingurița dozatoare arată dozajul medicamentului în funcție de greutatea copilului.

Pentru copiii care au alte greutăți, sunt disponibile alte forme de paracetamol pentru care trebuie să vă adresați medicului sau farmacistului.

Soluția poate fi băută ca atare sau diluată într-o cantitate mică de lichid (de exemplu: apă, lapte, suc de fructe).

Se apasă și se învâрте capacul pentru a deschide flaconul.

Se închide flaconul după fiecare utilizare.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Cutie:

fervex durere și febră pentru copii 30 mg/ml

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

<Nu este cazul.>

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

<Nu este cazul.>