

Fervex durere și febră forte 1000 mg comprimate efervescente
paracetamol

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ȘI PRIMAR

CUTIE/TUB DE POLIPROPILENĂ

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Fervex durere și febră forte 1000 mg comprimate efervescente
paracetamol

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat efervescent conține paracetamol 1000 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Excipienți cu efect cunoscut: benzoat de sodiu (E211), sodiu și sorbitol (E420).

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Comprimat efervescent
8 comprimate efervescente

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE (SUNT) NECESARĂ(E)

Conținut ridicat de sodiu - vezi prospectul pentru informații suplimentare.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL****11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

UPSA SAS
3, rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison,
Franța

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

8838/2016/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE*Cutie*

Fervex durere și febră forte este indicat în tratamentul simptomatic al durerilor de intensitate ușoară până la moderată, cu diferite localizări (dureri de cap, dureri de dinți, dureri ale mușchilor sau în caz de menstruație dureroasă) și în tratamentul simptomatic al febrei. De asemenea, medicul dumneavoastră vă poate prescrie acest medicament și pentru durerile artrozice.

Acest medicament este recomandat adulților și adolescenților cu greutatea corporală peste 50 kg (cu vârsta mai mare de 15 ani).

Doza uzuală este de un comprimat efervescent la un interval de 6 – 8 ore. Dacă este necesar, administrarea se poate repeta după cel puțin 4 ore. Comprimatul efervescent se dizolvă complet într-un pahar cu apă.

A nu se depăși doza recomandată.

Pentru copii și adolescenții sub 15 ani, sunt disponibile alte forme de prezentare care conțin paracetamol. Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

A nu se lua împreună cu alte medicamente care conțin paracetamol sau clorhidrat de propacetamol.

Tub de propilenă

Fervex durere și febră forte este indicat în tratamentul simptomatic al durerilor de intensitate ușoară până la moderată, cu diferite localizări (dureri de cap, dureri de dinți, dureri ale mușchilor sau în caz de menstruație dureroasă) și în tratamentul simptomatic al febrei. De asemenea, medicul dumneavoastră vă poate prescrie acest medicament și pentru durerile artrozice.

Acest medicament este recomandat numai adulților și adolescenților cu greutatea corporală peste 50 kg (cu vârsta mai mare de 15 ani).

Doza uzuală este de un comprimat efervescent la un interval de 6 – 8 ore. Dacă este necesar, administrarea se poate repeta după cel puțin 4 ore. Comprimatul efervescent se dizolvă complet într-un pahar cu apă.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Cutie:

fervex durere și febră forte 1000 mg

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

<Nu este cazul.>

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

<Nu este cazul.>