

Nurofen pentru copii cu aromă de căpșuni 100 mg/5 ml suspensie orală
Ibuprofen**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ȘI AMBALAJUL PRIMAR
CUTIE ȘI ETICHETA DE FLACON****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Nurofen pentru copii cu aromă de căpșuni 100 mg/5 ml suspensie orală
Ibuprofen

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare mililitru de suspensie orală conține ibuprofen 20 mg
5 ml suspensie orală conțin ibuprofen 100 mg

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține: maltitol lichid (E 965), sodiu și propilenglicol.
Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Suspensie orală
[Pe flacon]
100 ml suspensie orală

[Pe cutie]
Un flacon a 100 ml suspensie orală și o seringă dozatoare

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală
A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT
LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

A se utiliza în maxim 6 luni după prima deschidere a flaconului.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL****11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) SRL
Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr.48, Clădirea Crystal Tower, Etaj 11,
Sectorul 1, București, România

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

9005/2016/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE*[Pe cutie]*

Calmează durerea și reduce febra

La sugari și copii cu vârsta între 3 luni și 12 ani:

- reduce febra
 - √ febra care apare în cadrul diverselor afecțiuni
 - √ febra post-vaccinare
- calmează durerea de intensitate ușoară sau moderată
 - √ durere în gât
 - √ durere de dinți sau durerea determinată de apariția dinților
 - √ durere de cap
 - √ durere asociată luxațiilor
 - √ durere asociată inflamațiilor de la nivelul urechii

Produsul nu trebuie administrat copiilor sub 3 luni, decât dacă este recomandat de către medicul dumneavoastră.

Durere sau febră

Doza zilnică recomandată de Nurofen pentru copii este de 20-30 mg ibuprofen /kg administrată pe cale orală, administrată în mai multe prize. În funcție de vârsta copilului, se administrează următoarele doze, utilizând seringă gradată:

Sugari cu vârsta între 3-12 luni: 50 mg (2,5 ml) de 3 ori pe zi.
Copii între 1-3 ani: 100 mg (5 ml) de 3 ori pe zi.
Copii între 4-6 ani: 150 mg (7,5 ml) de 3 ori pe zi.
Copii între 7-9 ani: 200 mg (10 ml) de 3 ori pe zi.
Copii între 10-12 ani: 300 mg (15 ml) de 3 ori pe zi.
Produsul nu trebuie administrat copiilor cu greutatea corporală mai mică de 5 kg.

Tratamentul febrei post-vaccinare

Doza recomandată este de 50 mg ibuprofen (2,5 ml suspensie orală Nurofen pentru copii) urmată, la nevoie, de o altă doză de 50 mg ibuprofen (2,5 ml Nurofen pentru copii suspensie orală), la interval de 6 ore. Nu trebuie administrat mai mult de 5 ml suspensie orală Nurofen pentru copii (100 mg ibuprofen) într-un interval de 24 de ore.

La copii cu vârsta peste 6 luni și adolescenți, dacă simptomele persistă mai mult de 3 zile, se recomandă consult medical.

La copii cu vârsta cuprinsă între 3-5 luni, cu greutate peste 5 kg, dacă simptomele se agravează se recomandă consult medical, iar dacă simptomele persistă se recomandă consult medical în primele 24 de ore.

[Pe flacon]

Calmează durerea și reduce febra

La sugari și copii cu vârsta între 3 luni și 12 ani reduce febra și calmează durerea de intensitate ușoară sau moderată
Produsul nu trebuie administrat copiilor sub 3 luni, decât dacă este recomandat de către medicul dumneavoastră.

Durere sau febră

Doza zilnică recomandată de Nurofen pentru copii este de 20-30 mg ibuprofen /kg administrată pe cale orală, administrată în mai multe prize. În funcție de vârsta copilului, se administrează următoarele doze, utilizând siringa gradată:

Sugari cu vârsta între 3-12 luni: 50 mg (2,5 ml) de 3 ori pe zi.
Copii între 1-3 ani: 100 mg (5 ml) de 3 ori pe zi.
Copii între 4-6 ani: 150 mg (7,5 ml) de 3 ori pe zi.
Copii între 7-9 ani: 200 mg (10 ml) de 3 ori pe zi.
Copii între 10-12 ani: 300 mg (15 ml) de 3 ori pe zi.
Produsul nu trebuie administrat copiilor cu greutatea corporală mai mică de 5 kg.

Tratamentul febrei post-vaccinare

Doza recomandată este de 50 mg ibuprofen (2,5 ml suspensie orală Nurofen pentru copii) urmată, la nevoie, de o altă doză de 50 mg ibuprofen (2,5 ml Nurofen pentru copii suspensie orală), la interval de 6 ore. Nu trebuie administrat mai mult de 5 ml suspensie orală Nurofen pentru copii (100 mg ibuprofen) într-un interval de 24 de ore.

La copii cu vârsta peste 6 luni și adolescenți, dacă simptomele persistă mai mult de 3 zile, se recomandă consult medical.

La copii cu vârsta cuprinsă între 3-5 luni, cu greutate peste 5 kg, dacă simptomele se agravează se recomandă consult medical, iar dacă simptomele persistă se recomandă consult medical în primele 24 de ore.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

[Pe cutie]

{NUROFEN PENTRU COPII CU AROMĂ DE CĂPȘUNI }