

**Extraneal soluție pentru dializă peritoneală****AMBALAJ PRIMAR – pungă simplă Sy II cu conector luer**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **1500 ml**

Calea de administrare: **intraperitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla: **BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**Osmolaritatea teoretică :284 mOsm/l**

**Soluție apirogenă**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**A nu se folosi soluții care nu sunt limpezi sau care au ambalajul deteriorat**

**Orice soluție nefolosită se va arunca**

**Înainte de administrare, soluția trebuie încălzită în pungă suprasigilată la temperatura de 37°C**

**A se utiliza imediat după deschiderea ambalajului**

**AMBALAJ DE UZ SPITALICESC - cutie**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **6 pungi simple Sy II a 1500 ml cu conector luer**

Calea de administrare: **intraperitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele și adresa deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla

**BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

**Calea 13 Septembrie, nr.90**

**Camera 6.15 - 6.16, etaj 6, sector 5, București, România**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**Se eliberează pe bază de prescripție medicală PR**

Numărul autorizației de punere pe piață: **91/2007/01**

**Extraneal soluție pentru dializă peritoneală****AMBALAJ PRIMAR – pungă simplă Sy III cu conector spike**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **1500 ml**

Calea de administrare: **intraperitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla: **BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**Osmolaritatea teoretică :284 mOsm/l**

**Soluție apirogenă**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**A nu se folosi soluții care nu sunt limpezi sau care au ambalajul deteriorat**

**Orice soluție nefolosită se va arunca**

**Înainte de administrare, soluția trebuie încălzită în pungă suprasigilată la temperatura de 37°C**

**A se utiliza imediat după deschiderea ambalajului**

**AMBALAJ DE UZ SPITALICESC - cutie**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **6 pungi simple Sy III a 1500 ml cu conector spike**

Calea de administrare: **intraperitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele și adresa deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla

**BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

**Calea 13 Septembrie, nr.90**

**Camera 6.15 - 6.16, etaj 6, sector 5, București, România**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**Se eliberează pe bază de prescripție medicală PR**

Numărul autorizației de punere pe piață: **91/2007/02**

**Extraneal soluție pentru dializă peritoneală****AMBALAJ PRIMAR – pungă dublă Sy II cu conector luer**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **1500 ml**

Calea de administrare: **intraperitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla: **BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**Osmolaritatea teoretică :284 mOsm/l**

**Soluție apirogenă**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**A nu se folosi soluții care nu sunt limpezi sau care au ambalajul deteriorat**

**Orice soluție nefolosită se va arunca**

**Înainte de administrare, soluția trebuie încălzită în pungă suprasigilată la temperatura de 37°C**

**A se utiliza imediat după deschiderea ambalajului**

**AMBALAJ DE UZ SPITALICESC - cutie**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **6 pungi duble Sy II a 1500 ml cu conector luer**

Calea de administrare: **intraperitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele și adresa deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla

**BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

**Calea 13 Septembrie, nr.90**

**Camera 6.15 - 6.16, etaj 6, sector 5, București, România**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**Se eliberează pe bază de prescripție medicală PR**

Numărul autorizației de punere pe piață: **91/2007/03**

**Extraneal soluție pentru dializă peritoneală****AMBALAJ PRIMAR – pungă dublă Sy III cu conector spike**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **1500 ml**

Calea de administrare: **intrapitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla: **BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**Osmolaritatea teoretică :284 mOsm/l**

**Soluție apirogenă**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**A nu se folosi soluții care nu sunt limpezi sau care au ambalajul deteriorat**

**Orice soluție nefolosită se va arunca**

**Înainte de administrare, soluția trebuie încălzită în pungă suprasigilată la temperatura de 37°C**

**A se utiliza imediat după deschiderea ambalajului**

**AMBALAJ DE UZ SPITALICESC - cutie**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **6 pungi duble Sy III a 1500 ml cu conector spike**

Calea de administrare: **intrapitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele și adresa deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla

**BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

**Calea 13 Septembrie, nr.90**

**Camera 6.15 - 6.16, etaj 6, sector 5, București, România**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**Se eliberează pe bază de prescripție medicală PR**

Numărul autorizației de punere pe piață: **91/2007/04**

**Extraneal soluție pentru dializă peritoneală****AMBALAJ PRIMAR – pungă dublă cu conector lineo**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **1500 ml**

Calea de administrare: **intraperitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla: **BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**Osmolaritatea teoretică :284 mOsm/l**

**Soluție apirogenă**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**A nu se folosi soluții care nu sunt limpezi sau care au ambalajul deteriorat**

**Orice soluție nefolosită se va arunca**

**Înainte de administrare, soluția trebuie încălzită în pungă suprasigilată la temperatura de 37°C**

**A se utiliza imediat după deschiderea ambalajului**

**AMBALAJ DE UZ SPITALICESC - cutie**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **6 pungi duble a 1500 ml cu conector lineo**

Calea de administrare: **intraperitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele și adresa deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla

**BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

**Calea 13 Septembrie, nr.90**

**Camera 6.15 - 6.16, etaj 6, sector 5, București, România**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**Se eliberează pe bază de prescripție medicală PR**

Numărul autorizației de punere pe piață: **91/2007/05**

**Extraneal soluție pentru dializă peritoneală****AMBALAJ PRIMAR – pungă simplă Sy II cu conector luer**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **2000 ml**

Calea de administrare: **intrapitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla: **BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**Osmolaritatea teoretică :284 mOsm/l**

**Soluție apirogenă**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**A nu se folosi soluții care nu sunt limpezi sau care au ambalajul deteriorat**

**Orice soluție nefolosită se va arunca**

**Înainte de administrare, soluția trebuie încălzită în pungă suprasigilată la temperatura de 37°C**

**A se utiliza imediat după deschiderea ambalajului**

**AMBALAJ DE UZ SPITALICESC - cutie**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **5 pungi simple Sy II a 2000 ml cu conector luer**

Calea de administrare: **intrapitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele și adresa deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla

**BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

**Calea 13 Septembrie, nr.90**

**Camera 6.15 - 6.16, etaj 6, sector 5, București, România**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**Se eliberează pe bază de prescripție medicală PR**

Numărul autorizației de punere pe piață: **91/2007/06**

**Extraneal soluție pentru dializă peritoneală****AMBALAJ PRIMAR – pungă simplă Sy III cu conector spike**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **2000 ml**

Calea de administrare: **intrapitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla: **BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**Osmolaritatea teoretică :284 mOsm/l**

**Soluție apirogenă**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**A nu se folosi soluții care nu sunt limpezi sau care au ambalajul deteriorat**

**Orice soluție nefolosită se va arunca**

**Înainte de administrare, soluția trebuie încălzită în pungă suprasigilată la temperatura de 37°C**

**A se utiliza imediat după deschiderea ambalajului**

**AMBALAJ DE UZ SPITALICESC - cutie**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **5 pungi simple Sy III a 2000 ml cu conector spike**

Calea de administrare: **intrapitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele și adresa deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla

**BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

**Calea 13 Septembrie, nr.90**

**Camera 6.15 - 6.16, etaj 6, sector 5, București, România**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**Se eliberează pe bază de prescripție medicală PR**

Numărul autorizației de punere pe piață: **91/2007/07**

**Extraneal soluție pentru dializă peritoneală****AMBALAJ PRIMAR – pungă dublă Sy II cu conector luer**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **2000 ml**

Calea de administrare: **intrapitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla: **BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**Osmolaritatea teoretică :284 mOsm/l**

**Soluție apirogenă**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**A nu se folosi soluții care nu sunt limpezi sau care au ambalajul deteriorat**

**Orice soluție nefolosită se va arunca**

**Înainte de administrare, soluția trebuie încălzită în pungă suprasigilată la temperatura de 37°C**

**A se utiliza imediat după deschiderea ambalajului**

**AMBALAJ DE UZ SPITALICESC - cutie**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **5 pungi duble Sy II a 2000 ml cu conector luer**

Calea de administrare: **intrapitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele și adresa deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla

**BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

**Calea 13 Septembrie, nr.90**

**Camera 6.15 - 6.16, etaj 6, sector 5, București, România**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**Se eliberează pe bază de prescripție medicală PR**

Numărul autorizației de punere pe piață: **91/2007/08**



**Extraneal soluție pentru dializă peritoneală****AMBALAJ PRIMAR – pungă dublă Sy III cu conector spike**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **2000 ml**

Calea de administrare: **intrapertoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla: **BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**Osmolaritatea teoretică :284 mOsm/l**

**Soluție apirogenă**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**A nu se folosi soluții care nu sunt limpezi sau care au ambalajul deteriorat**

**Orice soluție nefolosită se va arunca**

**Înainte de administrare, soluția trebuie încălzită în pungă suprasigilată la temperatura de 37°C**

**A se utiliza imediat după deschiderea ambalajului**

**AMBALAJ DE UZ SPITALICESC - cutie**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **5 pungi duble Sy III a 2000 ml cu conector spike**

Calea de administrare: **intrapertoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele și adresa deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla

**BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

**Calea 13 Septembrie, nr.90**

**Camera 6.15 - 6.16, etaj 6, sector 5, București, România**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**Se eliberează pe bază de prescripție medicală PR**

Numărul autorizației de punere pe piață: **91/2007/09**

**Extraneal soluție pentru dializă peritoneală****AMBALAJ PRIMAR – pungă dublă cu conector lineo**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **2000 ml**

Calea de administrare: **intraperitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla: **BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**Osmolaritatea teoretică :284 mOsm/l**

**Soluție apirogenă**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**A nu se folosi soluții care nu sunt limpezi sau care au ambalajul deteriorat**

**Orice soluție nefolosită se va arunca**

**Înainte de administrare, soluția trebuie încălzită în pungă suprasigilată la temperatura de 37°C**

**A se utiliza imediat după deschiderea ambalajului**

**AMBALAJ DE UZ SPITALICESC - cutie**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **5 pungi duble a 2000 ml cu conector lineo**

Calea de administrare: **intraperitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele și adresa deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla

**BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

**Calea 13 Septembrie, nr.90**

**Camera 6.15 - 6.16, etaj 6, sector 5, București, România**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**Se eliberează pe bază de prescripție medicală PR**

Numărul autorizației de punere pe piață: **91/2007/10**

**Extraneal soluție pentru dializă peritoneală****AMBALAJ PRIMAR – pungă simplă Sy II cu conector luer**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **2500 ml**

Calea de administrare: **intraperitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla: **BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**Osmolaritatea teoretică :284 mOsm/l**

**Soluție apirogenă**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**A nu se folosi soluții care nu sunt limpezi sau care au ambalajul deteriorat**

**Orice soluție nefolosită se va arunca**

**Înainte de administrare, soluția trebuie încălzită în pungă suprasigilată la temperatura de 37°C**

**A se utiliza imediat după deschiderea ambalajului**

**AMBALAJ DE UZ SPITALICESC - cutie**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **4 pungi simple Sy II a 2500 ml cu conector luer**

Calea de administrare: **intraperitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele și adresa deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla

**BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

**Calea 13 Septembrie, nr.90**

**Camera 6.15 - 6.16, etaj 6, sector 5, București, România**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**Se eliberează pe bază de prescripție medicală PR**

Numărul autorizației de punere pe piață: **91/2007/11**

**Extraneal soluție pentru dializă peritoneală****AMBALAJ PRIMAR – pungă simplă Sy III cu conector spike**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **2500 ml**

Calea de administrare: **intrapitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla: **BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**Osmolaritatea teoretică :284 mOsm/l**

**Soluție apirogenă**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**A nu se folosi soluții care nu sunt limpezi sau care au ambalajul deteriorat**

**Orice soluție nefolosită se va arunca**

**Înainte de administrare, soluția trebuie încălzită în pungă suprasigilată la temperatura de 37°C**

**A se utiliza imediat după deschiderea ambalajului**

**AMBALAJ DE UZ SPITALICESC - cutie**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **4 pungi simple Sy III a 2500 ml cu conector spike**

Calea de administrare: **intrapitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele și adresa deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla

**BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

**Calea 13 Septembrie, nr.90**

**Camera 6.15 - 6.16, etaj 6, sector 5, București, România**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**Se eliberează pe bază de prescripție medicală PR**

Numărul autorizației de punere pe piață: **91/2007/12**

**Extraneal soluție pentru dializă peritoneală****AMBALAJ PRIMAR – pungă dublă Sy II cu conector luer**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **2500 ml**

Calea de administrare: **intrapitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla: **BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**Osmolaritatea teoretică :284 mOsm/l**

**Soluție apirogenă**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**A nu se folosi soluții care nu sunt limpezi sau care au ambalajul deteriorat**

**Orice soluție nefolosită se va arunca**

**Înainte de administrare, soluția trebuie încălzită în pungă suprasigilată la temperatura de 37°C**

**A se utiliza imediat după deschiderea ambalajului**

**AMBALAJ DE UZ SPITALICESC - cutie**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **4 pungi duble Sy II a 2500 ml cu conector luer**

Calea de administrare: **intrapitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele și adresa deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla

**BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

**Calea 13 Septembrie, nr.90**

**Camera 6.15 - 6.16, etaj 6, sector 5, București, România**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**Se eliberează pe bază de prescripție medicală PR**

Numărul autorizației de punere pe piață: **91/2007/13**

**Extraneal soluție pentru dializă peritoneală****AMBALAJ PRIMAR – pungă dublă Sy III cu conector spike**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **2500 ml**

Calea de administrare: **intraperitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla: **BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**Osmolaritatea teoretică :284 mOsm/l**

**Soluție apirogenă**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**A nu se folosi soluții care nu sunt limpezi sau care au ambalajul deteriorat**

**Orice soluție nefolosită se va arunca**

**Înainte de administrare, soluția trebuie încălzită în pungă suprasigilată la temperatura de 37°C**

**A se utiliza imediat după deschiderea ambalajului**

**AMBALAJ DE UZ SPITALICESC - cutie**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **4 pungă duble Sy III a 2500 ml cu conector spike**

Calea de administrare: **intraperitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele și adresa deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla

**BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

**Calea 13 Septembrie, nr.90**

**Camera 6.15 - 6.16, etaj 6, sector 5, București, România**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**Se eliberează pe bază de prescripție medicală PR**

Numărul autorizației de punere pe piață: **91/2007/14**

**Extraneal soluție pentru dializă peritoneală****AMBALAJ PRIMAR – pungă dublă cu conector lineo**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **2500 ml**

Calea de administrare: **intraperitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla: **BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**Osmolaritatea teoretică :284 mOsm/l**

**Soluție apirogenă**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**A nu se folosi soluții care nu sunt limpezi sau care au ambalajul deteriorat**

**Orice soluție nefolosită se va arunca**

**Înainte de administrare, soluția trebuie încălzită în pungă suprasigilată la temperatura de 37°C**

**A se utiliza imediat după deschiderea ambalajului**

**AMBALAJ DE UZ SPITALICESC - cutie**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **4 pungă duble a 2500 ml cu conector lineo**

Calea de administrare: **intraperitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele și adresa deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla

**BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

**Calea 13 Septembrie, nr.90**

**Camera 6.15 - 6.16, etaj 6, sector 5, București, România**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**Se eliberează pe bază de prescripție medicală PR**

Numărul autorizației de punere pe piață: **91/2007/15**

**Extraneal soluție pentru dializă peritoneală****AMBALAJ PRIMAR – pungă simplă Sy II cu conector luer**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **1500 ml**

Calea de administrare: **intraperitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla: **BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**Osmolaritatea teoretică :284 mOsm/l**

**Soluție apirogenă**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**A nu se folosi soluții care nu sunt limpezi sau care au ambalajul deteriorat**

**Orice soluție nefolosită se va arunca**

**Înainte de administrare, soluția trebuie încălzită în pungă suprasigilată la temperatura de 37°C**

**A se utiliza imediat după deschiderea ambalajului**

**AMBALAJ DE UZ SPITALICESC - cutie**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **8 pungi simple Sy II a 1500 ml cu conector luer**

Calea de administrare: **intraperitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele și adresa deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla

**BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

**Calea 13 Septembrie, nr.90**

**Camera 6.15 - 6.16, etaj 6, sector 5, București, România**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**Se eliberează pe bază de prescripție medicală PR**

Numărul autorizației de punere pe piață: **91/2007/16**



**Extraneal soluție pentru dializă peritoneală****AMBALAJ PRIMAR – pungă simplă Sy III cu conector spike**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **1500 ml**

Calea de administrare: **intraperitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla: **BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**Osmolaritatea teoretică :284 mOsm/l**

**Soluție apirogenă**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**A nu se folosi soluții care nu sunt limpezi sau care au ambalajul deteriorat**

**Orice soluție nefolosită se va arunca**

**Înainte de administrare, soluția trebuie încălzită în pungă suprasigilată la temperatura de 37°C**

**A se utiliza imediat după deschiderea ambalajului**

**AMBALAJ DE UZ SPITALICESC - cutie**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **8 pungi simple Sy III a 1500 ml cu conector spike**

Calea de administrare: **intraperitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele și adresa deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla

**BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

**Calea 13 Septembrie, nr.90**

**Camera 6.15 - 6.16, etaj 6, sector 5, București, România**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**Se eliberează pe bază de prescripție medicală PR**

Numărul autorizației de punere pe piață: **91/2007/17**

**Extraneal soluție pentru dializă peritoneală****AMBALAJ PRIMAR – pungă dublă Sy II cu conector luer**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **1500 ml**

Calea de administrare: **intraperitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla: **BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**Osmolaritatea teoretică :284 mOsm/l**

**Soluție apirogenă**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**A nu se folosi soluții care nu sunt limpezi sau care au ambalajul deteriorat**

**Orice soluție nefolosită se va arunca**

**Înainte de administrare, soluția trebuie încălzită în pungă suprasigilată la temperatura de 37°C**

**A se utiliza imediat după deschiderea ambalajului**

**AMBALAJ DE UZ SPITALICESC - cutie**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **8 pungi duble Sy II a 1500 ml cu conector luer**

Calea de administrare: **intraperitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele și adresa deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla

**BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

**Calea 13 Septembrie, nr.90**

**Camera 6.15 - 6.16, etaj 6, sector 5, București, România**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**Se eliberează pe bază de prescripție medicală PR**

Numărul autorizației de punere pe piață: **91/2007/18**

**Extraneal soluție pentru dializă peritoneală****AMBALAJ PRIMAR – pungă dublă Sy III cu conector spike**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **1500 ml**

Calea de administrare: **intraperitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla: **BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**Osmolaritatea teoretică :284 mOsm/l**

**Soluție apirogenă**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**A nu se folosi soluții care nu sunt limpezi sau care au ambalajul deteriorat**

**Orice soluție nefolosită se va arunca**

**Înainte de administrare, soluția trebuie încălzită în pungă suprasigilată la temperatura de 37°C**

**A se utiliza imediat după deschiderea ambalajului**

**AMBALAJ DE UZ SPITALICESC - cutie**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **8 pungi duble Sy III a 1500 ml cu conector spike**

Calea de administrare: **intraperitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele și adresa deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla

**BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

**Calea 13 Septembrie, nr.90**

**Camera 6.15 - 6.16, etaj 6, sector 5, București, România**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**Se eliberează pe bază de prescripție medicală PR**

Numărul autorizației de punere pe piață: **91/2007/19**

**Extraneal soluție pentru dializă peritoneală****AMBALAJ PRIMAR – pungă simplă Sy II cu conector luer**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **2000 ml**

Calea de administrare: **intrapitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla: **BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**Osmolaritatea teoretică :284 mOsm/l**

**Soluție apirogenă**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**A nu se folosi soluții care nu sunt limpezi sau care au ambalajul deteriorat**

**Orice soluție nefolosită se va arunca**

**Înainte de administrare, soluția trebuie încălzită în pungă suprasigilată la temperatura de 37°C**

**A se utiliza imediat după deschiderea ambalajului**

**AMBALAJ DE UZ SPITALICESC - cutie**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **8 pungi simple Sy II a 2000 ml cu conector luer**

Calea de administrare: **intrapitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele și adresa deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla

**BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

**Calea 13 Septembrie, nr.90**

**Camera 6.15 - 6.16, etaj 6, sector 5, București, România**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**Se eliberează pe bază de prescripție medicală PR**

Numărul autorizației de punere pe piață: **91/2007/20**

**Extraneal soluție pentru dializă peritoneală****AMBALAJ PRIMAR – pungă simplă Sy III cu conector spike**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **2000 ml**

Calea de administrare: **intraperitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla: **BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**Osmolaritatea teoretică :284 mOsm/l**

**Soluție apirogenă**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**A nu se folosi soluții care nu sunt limpezi sau care au ambalajul deteriorat**

**Orice soluție nefolosită se va arunca**

**Înainte de administrare, soluția trebuie încălzită în pungă suprasigilată la temperatura de 37°C**

**A se utiliza imediat după deschiderea ambalajului**

**AMBALAJ DE UZ SPITALICESC - cutie**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **8 pungi simple Sy III a 2000 ml cu conector spike**

Calea de administrare: **intraperitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele și adresa deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla

**BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

**Calea 13 Septembrie, nr.90**

**Camera 6.15 - 6.16, etaj 6, sector 5, București, România**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**Se eliberează pe bază de prescripție medicală PR**

Numărul autorizației de punere pe piață: **91/2007/21**

**Extraneal soluție pentru dializă peritoneală****AMBALAJ PRIMAR – pungă dublă Sy II cu conector luer**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **2000 ml**

Calea de administrare: **intrapitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla: **BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**Osmolaritatea teoretică :284 mOsm/l**

**Soluție apirogenă**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**A nu se folosi soluții care nu sunt limpezi sau care au ambalajul deteriorat**

**Orice soluție nefolosită se va arunca**

**Înainte de administrare, soluția trebuie încălzită în pungă suprasigilată la temperatura de 37°C**

**A se utiliza imediat după deschiderea ambalajului**

**AMBALAJ DE UZ SPITALICESC - cutie**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **8 pungi duble Sy II a 2000 ml cu conector luer**

Calea de administrare: **intrapitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele și adresa deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla

**BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

**Calea 13 Septembrie, nr.90**

**Camera 6.15 - 6.16, etaj 6, sector 5, București, România**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**Se eliberează pe bază de prescripție medicală PR**

Numărul autorizației de punere pe piață: **91/2007/22**

**Extraneal soluție pentru dializă peritoneală****AMBALAJ PRIMAR – pungă dublă Sy III cu conector spike**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **2000 ml**

Calea de administrare: **intraperitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla: **BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**Osmolaritatea teoretică :284 mOsm/l**

**Soluție apirogenă**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**A nu se folosi soluții care nu sunt limpezi sau care au ambalajul deteriorat**

**Orice soluție nefolosită se va arunca**

**Înainte de administrare, soluția trebuie încălzită în pungă suprasigilată la temperatura de 37°C**

**A se utiliza imediat după deschiderea ambalajului**

**AMBALAJ DE UZ SPITALICESC - cutie**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **8 pungi duble Sy III a 2000 ml cu conector spike**

Calea de administrare: **intraperitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele și adresa deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla

**BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

**Calea 13 Septembrie, nr.90**

**Camera 6.15 - 6.16, etaj 6, sector 5, București, România**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**Se eliberează pe bază de prescripție medicală PR**

Numărul autorizației de punere pe piață: **91/2007/23**

**Extraneal soluție pentru dializă peritoneală****AMBALAJ PRIMAR – pungă simplă Sy II cu conector luer**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **2000 ml**

Calea de administrare: **intraperitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla: **BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**Osmolaritatea teoretică :284 mOsm/l**

**Soluție apirogenă**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**A nu se folosi soluții care nu sunt limpezi sau care au ambalajul deteriorat**

**Orice soluție nefolosită se va arunca**

**Înainte de administrare, soluția trebuie încălzită în pungă suprasigilată la temperatura de 37°C**

**A se utiliza imediat după deschiderea ambalajului**

**AMBALAJ DE UZ SPITALICESC - cutie**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **6 pungi simple Sy II a 2000 ml cu conector luer**

Calea de administrare: **intraperitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele și adresa deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla

**BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

**Calea 13 Septembrie, nr.90**

**Camera 6.15 - 6.16, etaj 6, sector 5, București, România**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**Se eliberează pe bază de prescripție medicală PR**

Numărul autorizației de punere pe piață: **91/2007/24**



**Extraneal soluție pentru dializă peritoneală****AMBALAJ PRIMAR – pungă simplă Sy III cu conector spike**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **2000 ml**

Calea de administrare: **intraperitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla: **BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**Osmolaritatea teoretică :284 mOsm/l**

**Soluție apirogenă**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**A nu se folosi soluții care nu sunt limpezi sau care au ambalajul deteriorat**

**Orice soluție nefolosită se va arunca**

**Înainte de administrare, soluția trebuie încălzită în pungă suprasigilată la temperatura de 37°C**

**A se utiliza imediat după deschiderea ambalajului**

**AMBALAJ DE UZ SPITALICESC - cutie**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **6 pungi simple Sy III a 2000 ml cu conector spike**

Calea de administrare: **intraperitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele și adresa deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla

**BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

**Calea 13 Septembrie, nr.90**

**Camera 6.15 - 6.16, etaj 6, sector 5, București, România**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**Se eliberează pe bază de prescripție medicală PR**

Numărul autorizației de punere pe piață: **91/2007/25**

**Extraneal soluție pentru dializă peritoneală****AMBALAJ PRIMAR – pungă dublă Sy II cu conector luer**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **2000 ml**

Calea de administrare: **intraperitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla: **BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**Osmolaritatea teoretică :284 mOsm/l**

**Soluție apirogenă**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**A nu se folosi soluții care nu sunt limpezi sau care au ambalajul deteriorat**

**Orice soluție nefolosită se va arunca**

**Înainte de administrare, soluția trebuie încălzită în pungă suprasigilată la temperatura de 37°C**

**A se utiliza imediat după deschiderea ambalajului**

**AMBALAJ DE UZ SPITALICESC - cutie**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **6 pungi duble Sy II a 2000 ml cu conector luer**

Calea de administrare: **intraperitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele și adresa deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla

**BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

**Calea 13 Septembrie, nr.90**

**Camera 6.15 - 6.16, etaj 6, sector 5, București, România**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**Se eliberează pe bază de prescripție medicală PR**

Numărul autorizației de punere pe piață: **91/2007/26**

**Extraneal soluție pentru dializă peritoneală****AMBALAJ PRIMAR – pungă dublă Sy III cu conector spike**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **2000 ml**

Calea de administrare: **intraperitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla: **BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**Osmolaritatea teoretică :284 mOsm/l**

**Soluție apirogenă**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**A nu se folosi soluții care nu sunt limpezi sau care au ambalajul deteriorat**

**Orice soluție nefolosită se va arunca**

**Înainte de administrare, soluția trebuie încălzită în pungă suprasigilată la temperatura de 37°C**

**A se utiliza imediat după deschiderea ambalajului**

**AMBALAJ DE UZ SPITALICESC - cutie**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **6 pungi duble Sy III a 2000 ml cu conector spike**

Calea de administrare: **intraperitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele și adresa deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla

**BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

**Calea 13 Septembrie, nr.90**

**Camera 6.15 - 6.16, etaj 6, sector 5, București, România**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**Se eliberează pe bază de prescripție medicală PR**

Numărul autorizației de punere pe piață: **91/2007/27**

**Extraneal soluție pentru dializă peritoneală****AMBALAJ PRIMAR – pungă simplă Sy II cu conector luer**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **2500 ml**

Calea de administrare: **intraperitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla: **BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**Osmolaritatea teoretică :284 mOsm/l**

**Soluție apirogenă**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**A nu se folosi soluții care nu sunt limpezi sau care au ambalajul deteriorat**

**Orice soluție nefolosită se va arunca**

**Înainte de administrare, soluția trebuie încălzită în pungă suprasigilată la temperatura de 37°C**

**A se utiliza imediat după deschiderea ambalajului**

**AMBALAJ DE UZ SPITALICESC - cutie**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **5 pungi simple Sy II a 2500 ml cu conector luer**

Calea de administrare: **intraperitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele și adresa deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla

**BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

**Calea 13 Septembrie, nr.90**

**Camera 6.15 - 6.16, etaj 6, sector 5, București, România**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**Se eliberează pe bază de prescripție medicală PR**

Numărul autorizației de punere pe piață: **91/2007/28**

**Extraneal soluție pentru dializă peritoneală****AMBALAJ PRIMAR – pungă simplă Sy III cu conector spike**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **2500 ml**

Calea de administrare: **intraperitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla: **BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**Osmolaritatea teoretică :284 mOsm/l**

**Soluție apirogenă**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**A nu se folosi soluții care nu sunt limpezi sau care au ambalajul deteriorat**

**Orice soluție nefolosită se va arunca**

**Înainte de administrare, soluția trebuie încălzită în pungă suprasigilată la temperatura de 37°C**

**A se utiliza imediat după deschiderea ambalajului**

**AMBALAJ DE UZ SPITALICESC - cutie**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **5 pungi simple Sy III a 2500 ml cu conector spike**

Calea de administrare: **intraperitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele și adresa deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla

**BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

**Calea 13 Septembrie, nr.90**

**Camera 6.15 - 6.16, etaj 6, sector 5, București, România**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**Se eliberează pe bază de prescripție medicală PR**

Numărul autorizației de punere pe piață: **91/2007/29**

**Extraneal soluție pentru dializă peritoneală****AMBALAJ PRIMAR – pungă dublă Sy II cu conector luer**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **2500 ml**

Calea de administrare: **intraperitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla: **BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**Osmolaritatea teoretică :284 mOsm/l**

**Soluție apirogenă**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**A nu se folosi soluții care nu sunt limpezi sau care au ambalajul deteriorat**

**Orice soluție nefolosită se va arunca**

**Înainte de administrare, soluția trebuie încălzită în pungă suprasigilată la temperatura de 37°C**

**A se utiliza imediat după deschiderea ambalajului**

**AMBALAJ DE UZ SPITALICESC - cutie**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **5 pungi duble Sy II a 2500 ml cu conector luer**

Calea de administrare: **intraperitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele și adresa deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla

**BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

**Calea 13 Septembrie, nr.90**

**Camera 6.15 - 6.16, etaj 6, sector 5, București, România**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**Se eliberează pe bază de prescripție medicală PR**

Numărul autorizației de punere pe piață: **91/2007/30**

**Extraneal soluție pentru dializă peritoneală****AMBALAJ PRIMAR – pungă dublă Sy III cu conector spike**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **2500 ml**

Calea de administrare: **intraperitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla: **BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**Osmolaritatea teoretică :284 mOsm/l**

**Soluție apirogenă**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**A nu se folosi soluții care nu sunt limpezi sau care au ambalajul deteriorat**

**Orice soluție nefolosită se va arunca**

**Înainte de administrare, soluția trebuie încălzită în pungă suprasigilată la temperatura de 37°C**

**A se utiliza imediat după deschiderea ambalajului**

**AMBALAJ DE UZ SPITALICESC - cutie**

Denumirea produsului: **Extraneal soluție pentru dializă peritoneală**

Forma farmaceutică: **soluție pentru dializă peritoneală**

Compoziția: **icodextrină 75 g, clorură de sodiu 5,4 g, lactat (S) de sodiu soluție 4,5 g, clorură de calciu dihidrat 0,257 g, clorură de magneziu hexahidrat 0,051 g și excipienți: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile pentru un litru soluție pentru dializă peritoneală**

Cantitatea pe ambalaj: **5 pungi duble Sy III a 2500 ml cu conector spike**

Calea de administrare: **intraperitoneală**

Seria de fabricație: **Serie**

Data expirării: **EXP**

Numele și adresa deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla

**BAXTER HEALTHCARE S.R.L.**

**Calea 13 Septembrie, nr.90**

**Camera 6.15 - 6.16, etaj 6, sector 5, București, România**

Mențiuni: **A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor**

**A nu păstra la temperaturi sub 4°C**

**A nu se administra prin perfuzie intravenoasă**

**Se eliberează pe bază de prescripție medicală PR**

Numărul autorizației de punere pe piață: **91/2007/31**