

**CitraFleet pulbere pentru soluție orală**  
Picosulfat de sodiu, oxid de magneziu ușor, acid citric

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****ETICHETA PENTRU CUTIA CU 2 PLICURI****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

CitraFleet pulbere pentru soluție orală  
Picosulfat de sodiu, oxid de magneziu ușor, acid citric

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Fiecare plic conține picosulfat de sodiu 10,0 mg, oxid de magneziu ușor 3,5 g, acid citric 10,97 g.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Conține și potasiu (5 mmol sau 195 mg).  
Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Pulbere pentru soluție orală  
2 plicuri

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE****Adulți cu vârsta de 18 ani sau peste:**

Tratamentul poate fi administrat într-unul din următoarele moduri:

- Un plic în seara dinaintea efectuării procedurii și al doilea plic în dimineața zilei în care se efectuează procedura.
- Un plic în după amiaza și al doilea în seara dinaintea efectuării procedurii. Această schemă este recomandată în cazul în care procedura se efectuează dimineața devreme sau
- Ambele plicuri în dimineața zilei în care se efectuează procedura. Această administrare este potrivită doar atunci când procedura este planificată după amiaza/seara.

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Citiți prospectul înainte de utilizare.

Administrare orală. A se utiliza imediat după reconstituire.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**

**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Casen Recordati, S.L.  
Autovía de Logroño, Km 13,300  
50180 Utebo - Zaragoza  
Spania

**12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

9349/2016/01 – ambalaj cu 2 plicuri

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot:

**14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

## **15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Facilitează evacuarea intestinului prin stimularea mișcărilor intestinale și creșterea conținutului de apă al materiilor fecale.

**Indicații:** Pentru curățarea intestinului înainte de orice procedură diagnostică ce necesită un intestin curat, de exemplu colonoscopie sau examinare radiologică.

## **16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

Citrafleet

## **17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

Nu este cazul.

## **18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

Nu este cazul.

**CitraFleet pulbere pentru soluție orală**  
Picosulfat de sodiu, oxid de magneziu ușor, acid citric

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**

**ETICHETA PENTRU CUTIA CU 2 PLICURI DIN AMBALAJ MULTIPLU CU 50 (25X2), 100 (50x2), 200 (100x2), 500 (250x2)**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

CitraFleet pulbere pentru soluție orală  
Picosulfat de sodiu, oxid de magneziu ușor, acid citric

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Fiecare plic conține picosulfat de sodiu 10,0 mg, oxid de magneziu ușor 3,5 g, acid citric 10,97 g.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Conține și potasiu (5 mmol sau 195 mg).  
Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Pulbere pentru soluție orală, în plic  
2 plicuri  
Face parte dintr-un ambalaj colectiv- a nu se vinde separat.

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE****Adulți cu vârsta de 18 ani sau peste:**

Tratamentul poate fi administrat într-unul din următoarele moduri:

- Un plic în seara dinaintea efectuării procedurii și al doilea plic în dimineața zilei în care se efectuează procedura
- Un plic în după amiaza și al doilea în seara dinaintea efectuării procedurii. Această schemă este recomandată în cazul în care procedura se efectuează dimineața devreme sau
- Ambele plicuri în dimineața zilei în care se efectuează procedura. Această administrare este potrivită doar atunci când procedura este planificată după amiaza/seara.

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Citiți prospectul înainte de utilizare.

Administrare orală. A se utiliza imediat după reconstituire.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**

**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Casen Recordati, S.L.  
Autovía de Logroño, Km 13,300  
50180 Utebo - Zaragoza  
Spania

**12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

9349/2016/02 – parte a unui ambalaj multiplu cu 50 (25X2) plicuri  
9349/2016/03 – parte a unui ambalaj multiplu cu 100 (50X2) plicuri  
9349/2016/04 – parte a unui ambalaj multiplu cu 200 (100X2) plicuri  
9349/2016/05 – parte a unui ambalaj multiplu cu 500 (250X2) plicuri

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot:

#### **14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

#### **15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Facilitează evacuarea intestinului prin stimularea mișcărilor intestinale și creșterea conținutului de apă al materiilor fecale.

**Indicații:** Pentru curățarea intestinului înainte de orice procedură diagnostică ce necesită un intestin curat, de exemplu colonoscopie sau examinare radiologică.

#### **16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

Citrafleet

#### **17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

Nu este cazul.

#### **18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

Nu este cazul.

**CitraFleet pulbere pentru soluție orală**  
Picosulfat de sodiu, oxid de magneziu ușor, acid citric

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**

**ETICHETA PENTRU CUTIA CU 2 PLICURI DIN AMBALAJ MULTIPLU CU 50 (25X2)**  
**Uz spitalicesc**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

CitraFleet pulbere pentru soluție orală  
Picosulfat de sodiu, oxid de magneziu ușor, acid citric

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Fiecare plic conține picosulfat de sodiu 10,0 mg, oxid de magneziu ușor 3,5 g, acid citric 10,97 g.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Conține și potasiu (5 mmol sau 195 mg).  
Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Pulbere pentru soluție orală, în plic  
2 plicuri  
Face parte dintr-un ambalaj de uz spitalicesc - a nu se vinde separat.

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE****Adulți cu vârsta de 18 ani sau peste:**

- Tratamentul poate fi administrat într-unul din următoarele moduri:
- Un plic în seara dinaintea efectuării procedurii și al doilea plic în dimineața zilei în care se efectuează procedura.
- Un plic în după amiaza și al doilea în seara dinaintea efectuării procedurii. Această schemă este recomandată în cazul în care procedura se efectuează dimineața devreme sau
- Ambele plicuri în dimineața zilei în care se efectuează procedura. Această administrare este potrivită doar atunci când procedura este planificată după amiaza/seara.

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Citiți prospectul înainte de utilizare.

Administrare orală. A se utiliza imediat după reconstituire.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**

**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Casen Recordati, S.L.  
Autovía de Logroño, Km 13,300  
50180 Utebo - Zaragoza  
Spania

**12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

9349/2016/12 – parte a unui ambalaj multiplu cu 50 (25X2) plicuri de uz spitalicesc

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot:

**14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**



Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

#### **15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Facilitează evacuarea intestinului prin stimularea mișcărilor intestinale și creșterea conținutului de apă al materiilor fecale.

**Indicații:** Pentru curățarea intestinului înainte de orice procedură diagnostică ce necesită un intestin curat, de exemplu colonoscopie sau examinare radiologică.

#### **16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

Citrafleet

#### **17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

Nu este cazul.

#### **18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

Nu este cazul.

**CitraFleet pulbere pentru soluție orală**  
Picosulfat de sodiu, oxid de magneziu ușor, acid citric

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****ETICHETA PENTRU CUTIA CU 50 PLICURI****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

CitraFleet pulbere pentru soluție orală  
Picosulfat de sodiu, oxid de magneziu ușor, acid citric

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Fiecare plic conține picosulfat de sodiu 10,0 mg, oxid de magneziu ușor 3,5 g, acid citric 10,97 g.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Conține și potasiu (5 mmol sau 195 mg).  
Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Pulbere pentru soluție orală, în plic  
50 plicuri

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

**Adulți cu vârsta de 18 ani sau peste.** Tratamentul poate fi administrat într-unul din următoarele moduri:

- Un plic în seara dinaintea efectuării procedurii și al doilea plic în dimineața zilei în care se efectuează procedura.
- Un plic în după amiaza și al doilea în seara dinaintea efectuării procedurii. Această schemă este recomandată în cazul în care procedura se efectuează dimineața devreme sau
- Ambele plicuri în dimineața zilei în care se efectuează procedura. Această administrare este potrivită doar atunci când procedura este planificată după amiaza/seara.

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Citiți prospectul înainte de utilizare.

Administrare orală. A se utiliza imediat după reconstituire.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**

**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Casen Recordati, S.L.  
Autovía de Logroño, Km 13,300  
50180 Utebo - Zaragoza  
Spania

**12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

9349/2016/06

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot:

**14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

## **15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Facilitează evacuarea intestinului prin stimularea mișcărilor intestinale și creșterea conținutului de apă al materiilor fecale.

**Indicații:** Pentru curățarea intestinului înainte de orice procedură diagnostică ce necesită un intestin curat, de exemplu colonoscopie sau examinare radiologică.

## **16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

Citrafleet

## **17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

Nu este cazul.

## **18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

Nu este cazul.

**CitraFleet pulbere pentru soluție orală**  
Picosulfat de sodiu, oxid de magneziu ușor, acid citric

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****ETICHETA PENTRU CUTIA CU 50 (25X2) PLICURI****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

CitraFleet pulbere pentru soluție orală  
Picosulfat de sodiu, oxid de magneziu ușor, acid citric

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Fiecare plic conține picosulfat de sodiu 10,0 mg, oxid de magneziu ușor 3,5 g, acid citric 10,97 g.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Conține și potasiu (5 mmol sau 195 mg).  
Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Pulbere pentru soluție orală, în plic  
50 (25x2) plicuri

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE****Adulți cu vârsta de 18 ani sau peste:**

- Tratamentul poate fi administrat într-unul din următoarele moduri:
- Un plic în seara dinaintea efectuării procedurii și al doilea plic în dimineața zilei în care se efectuează procedura.
- Un plic în după amiaza și al doilea în seara dinaintea efectuării procedurii. Această schemă este recomandată în cazul în care procedura se efectuează dimineața devreme sau
- Ambele plicuri în dimineața zilei în care se efectuează procedura. Această administrare este potrivită doar atunci când procedura este planificată după amiaza/seara.

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Citiți prospectul înainte de utilizare.

Administrare orală. A se utiliza imediat după reconstituire.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**

**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Casen Recordati, S.L.  
Autovía de Logroño, Km 13,300  
50180 Utebo - Zaragoza  
Spania

**12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

9349/2016/02

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot:

**14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

## **15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Facilitează evacuarea intestinului prin stimularea mișcărilor intestinale și creșterea conținutului de apă al materiilor fecale.

**Indicații:** Pentru curățarea intestinului înainte de orice procedură diagnostică ce necesită un intestin curat, de exemplu colonoscopie sau examinare radiologică.

## **16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

Citrafleet

## **17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

Nu este cazul.

## **18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

Nu este cazul.

**CitraFleet pulbere pentru soluție orală**  
Picosulfat de sodiu, oxid de magneziu ușor, acid citric

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****ETICHETA PENTRU CUTIA CU 100 PLICURI****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

CitraFleet pulbere pentru soluție orală  
Picosulfat de sodiu, oxid de magneziu ușor, acid citric

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Fiecare plic conține picosulfat de sodiu 10,0 mg, oxid de magneziu ușor 3,5 g, acid citric a 10,97 g.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Conține și potasiu (5 mmol sau 195 mg).  
Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Pulbere pentru soluție orală, în plic  
100 plicuri

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE****Adulți cu vârsta de 18 ani sau peste:**

Tratamentul poate fi administrat într-unul din următoarele moduri:

- Un plic în seara dinaintea efectuării procedurii și al doilea plic în dimineața zilei în care se efectuează procedura.
- Un plic în după amiaza și al doilea în seara dinaintea efectuării procedurii. Această schemă este recomandată în cazul în care procedura se efectuează dimineața devreme sau
- Ambele plicuri în dimineața zilei în care se efectuează procedura. Această administrare este potrivită doar atunci când procedura este planificată după amiaza/seara.

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Citiți prospectul înainte de utilizare.



Administrare orală. A se utiliza imediat după reconstituire.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**

**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Casen Recordati, S.L.  
Autovía de Logroño, Km 13,300  
50180 Utebo - Zaragoza  
Spania

**12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

9349/2016/07

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot:

**14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

## **15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Facilitează evacuarea intestinului prin stimularea mișcărilor intestinale și creșterea conținutului de apă al materiilor fecale.

**Indicații:** Pentru curățarea intestinului înainte de orice procedură diagnostică ce necesită un intestin curat, de exemplu colonoscopie sau examinare radiologică.

## **16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

Citrafleet

## **17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

Nu este cazul.

## **18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

Nu este cazul.

**CitraFleet pulbere pentru soluție orală**  
Picosulfat de sodiu, oxid de magneziu ușor, acid citric

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****ETICHETA PENTRU CUTIA CU 100 (50X2) PLICURI****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

CitraFleet pulbere pentru soluție orală  
Picosulfat de sodiu, oxid de magneziu ușor, acid citric

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Fiecare plic conține picosulfat de sodiu 10,0 mg, oxid de magneziu ușor 3,5 g, acid citric 10,97 g.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Conține și potasiu (5 mmol sau 195 mg).  
Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Pulbere pentru soluție orală, în plic  
100 (50x2) plicuri

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE****Adulți cu vârsta de 18 ani sau peste:**

Tratamentul poate fi administrat într-unul din următoarele moduri:

- Un plic în seara dinaintea efectuării procedurii și al doilea plic în dimineața zilei în care se efectuează procedura.
- Un plic în după amiaza și al doilea în seara dinaintea efectuării procedurii. Această schemă este recomandată în cazul în care procedura se efectuează dimineața devreme.
- Ambele plicuri în dimineața zilei în care se efectuează procedura. Această administrare este potrivită doar atunci când procedura este planificată după amiaza/seara.

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Citiți prospectul înainte de utilizare.

Administrare orală. A se utiliza imediat după reconstituire.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**

**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Casen Recordati, S.L.  
Autovía de Logroño, Km 13,300  
50180 Utebo - Zaragoza  
Spania

**12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

9349/2016/03

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot:

**14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

## 15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Facilitează evacuarea intestinului prin stimularea mișcărilor intestinale și creșterea conținutului de apă al materiilor fecale.

**Indicații:** Pentru curățarea intestinului înainte de orice procedură diagnostică ce necesită un intestin curat, de exemplu colonoscopie sau examinare radiologică.

## 16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Citrafleet

## 17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

## 18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

**CitraFleet pulbere pentru soluție orală**  
Picosulfat de sodiu, oxid de magneziu ușor, acid citric

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****ETICHETA PENTRU CUTIA CU 200 PLICURI****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

CitraFleet pulbere pentru soluție orală  
Picosulfat de sodiu, oxid de magneziu ușor, acid citric

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Fiecare plic conține picosulfat de sodiu 10,0 mg, oxid de magneziu ușor 3,5 g, acid citric 10,97 g.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Conține și potasiu (5 mmol sau 195 mg).  
Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Pulbere pentru soluție orală, în plic  
200 plicuri

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE****Adulți cu vârsta de 18 ani sau peste:**

- Tratamentul poate fi administrat într-unul din următoarele moduri:
- Un plic în seara dinaintea efectuării procedurii și al doilea plic în dimineața zilei în care se efectuează procedura.
- Un plic în după amiaza și al doilea în seara dinaintea efectuării procedurii. Această schemă este recomandată în cazul în care procedura se efectuează dimineața devreme, sau
- Ambele plicuri în dimineața zilei în care se efectuează procedura. Această administrare este potrivită doar atunci când procedura este planificată după amiaza/seara.

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Citiți prospectul înainte de utilizare.

Administrare orală. A se utiliza imediat după reconstituire.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**

**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Casen Recordati, S.L.  
Autovía de Logroño, Km 13,300  
50180 Utebo - Zaragoza  
Spania

**12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

9349/2016/08

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot:

**14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

## 15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Facilitează evacuarea intestinului prin stimularea mișcărilor intestinale și creșterea conținutului de apă al materiilor fecale.

**Indicații:** Pentru curățarea intestinului înainte de orice procedură diagnostică ce necesită un intestin curat, de exemplu colonoscopie sau examinare radiologică.

## 16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Citrafleet

## 17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

## 18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.



**CitraFleet pulbere pentru soluție orală**  
Picosulfat de sodiu, oxid de magneziu ușor, acid citric

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****ETICHETA PENTRU CUTIA CU 200 (100X2) PLICURI****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

CitraFleet pulbere pentru soluție orală  
Picosulfat de sodiu, oxid de magneziu ușor, acid citric

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Fiecare plic conține picosulfat de sodiu 10,0 mg, oxid de magneziu ușor 3,5 g, acid citric 10,97 g.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Conține și potasiu (5 mmol sau 195 mg).  
Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Pulbere pentru soluție orală, în plic  
200 (100x2) plicuri

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE****Adulți cu vârsta de 18 ani sau peste:**

- Tratamentul poate fi administrat într-unul din următoarele moduri:
- Un plic în seara dinaintea efectuării procedurii și al doilea plic în dimineața zilei în care se efectuează procedura.
- Un plic în după amiaza și al doilea în seara dinaintea efectuării procedurii. Această schemă este recomandată în cazul în care procedura se efectuează dimineața devreme sau
- Ambele plicuri în dimineața zilei în care se efectuează procedura. Această administrare este potrivită doar atunci când procedura este planificată după amiaza/seara.

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Citiți prospectul înainte de utilizare.

Administrare orală. A se utiliza imediat după reconstituire.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**

**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Casen Recordati, S.L.  
Autovía de Logroño, Km 13,300  
50180 Utebo - Zaragoza  
Spania

**12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

9349/2016/04

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot:

**14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

## **15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Facilitează evacuarea intestinului prin stimularea mișcărilor intestinale și creșterea conținutului de apă al materiilor fecale.

**Indicații:** Pentru curățarea intestinului înainte de orice procedură diagnostică ce necesită un intestin curat, de exemplu colonoscopie sau examinare radiologică.

## **16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

Citrafleet

## **17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

Nu este cazul.

## **18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

Nu este cazul.

**CitraFleet pulbere pentru soluție orală**  
Picosulfat de sodiu, oxid de magneziu ușor, acid citric

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****ETICHETA PENTRU CUTIA CU 500 PLICURI****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

CitraFleet pulbere pentru soluție orală  
Picosulfat de sodiu, oxid de magneziu ușor, acid citric

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Fiecare plic conține picosulfat de sodiu 10,0 mg, oxid de magneziu ușor 3,5 g, acid citric 10,97 g.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Conține și potasiu (5 mmol sau 195 mg).  
Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Pulbere pentru soluție orală, în plic  
500 plicuri

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE****Adulți cu vârsta de 18 ani sau peste:**

- Tratamentul poate fi administrat într-unul din următoarele moduri:
- Un plic în seara dinaintea efectuării procedurii și al doilea plic în dimineața zilei în care se efectuează procedura.
- Un plic în după amiaza și al doilea în seara dinaintea efectuării procedurii. Această schemă este recomandată în cazul în care procedura se efectuează dimineața devreme sau
- Ambele plicuri în dimineața zilei în care se efectuează procedura. Această administrare este potrivită doar atunci când procedura este planificată după amiaza/seara.

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Citiți prospectul înainte de utilizare.

Administrare orală. A se utiliza imediat după reconstituire.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**

**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Casen Recordati, S.L.  
Autovía de Logroño, Km 13,300  
50180 Utebo - Zaragoza  
Spania

**12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

9349/2016/09

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot:

**14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

## **15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Facilitează evacuarea intestinului prin stimularea mișcărilor intestinale și creșterea conținutului de apă al materiilor fecale.

**Indicații:** Pentru curățarea intestinului înainte de orice procedură diagnostică ce necesită un intestin curat, de exemplu colonoscopie sau examinare radiologică.

## **16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

Citrafleet

## **17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

Nu este cazul.

## **18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

Nu este cazul.

**CitraFleet pulbere pentru soluție orală**  
Picosulfat de sodiu, oxid de magneziu ușor, acid citric

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****ETICHETA PENTRU CUTIA CU 500 (250X2) PLICURI****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

CitraFleet pulbere pentru soluție orală  
Picosulfat de sodiu, oxid de magneziu ușor, acid citric

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Fiecare plic conține picosulfat de sodiu 10,0 mg, oxid de magneziu ușor 3,5 g, acid citric 10,97 g.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Conține și potasiu (5 mmol sau 195 mg).  
Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Pulbere pentru soluție orală, în plic  
500 (250x2) plicuri

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE****Adulți cu vârsta de 18 ani sau peste:**

- Tratamentul poate fi administrat într-unul din următoarele moduri:
- Un plic în seara dinaintea efectuării procedurii și al doilea plic în dimineața zilei în care se efectuează procedura.
- Un plic în după amiaza și al doilea în seara dinaintea efectuării procedurii. Această schemă este recomandată în cazul în care procedura se efectuează dimineața devreme sau
- Ambele plicuri în dimineața zilei în care se efectuează procedura. Această administrare este potrivită doar atunci când procedura este planificată după amiaza/seara.

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Citiți prospectul înainte de utilizare.

Administrare orală. A se utiliza imediat după reconstituire.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**

**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Casen Recordati, S.L.  
Autovía de Logroño, Km 13,300  
50180 Utebo - Zaragoza  
Spania

**12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

9349/2016/05

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot:

**14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.



## **15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Facilitează evacuarea intestinului prin stimularea mișcărilor intestinale și creșterea conținutului de apă al materiilor fecale.

**Indicații:** Pentru curățarea intestinului înainte de orice procedură diagnostică ce necesită un intestin curat, de exemplu colonoscopie sau examinare radiologică.

## **16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

Citrafleet

## **17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

Nu este cazul.

## **18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

Nu este cazul.

**CitraFleet pulbere pentru soluție orală**  
Picosulfat de sodiu, oxid de magneziu ușor, acid citric

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****ETICHETA PENTRU CUTIA CU 1000 PLICURI****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

CitraFleet pulbere pentru soluție orală  
Picosulfat de sodiu, oxid de magneziu ușor, acid citric.

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Fiecare plic conține picosulfat de sodiu 10,0 mg, oxid de magneziu ușor 3,5 g, acid citric 10,97 g.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Conține și potasiu (5 mmol sau 195 mg).  
Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Pulbere pentru soluție orală, în plic  
1000 plicuri

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE****Adulți cu vârsta de 18 ani sau peste:**

- Tratamentul poate fi administrat într-unul din următoarele moduri:
- Un plic în seara dinaintea efectuării procedurii și al doilea plic în dimineața zilei în care se efectuează procedura.
- Un plic în după amiaza și al doilea în seara dinaintea efectuării procedurii. Această schemă este recomandată în cazul în care procedura se efectuează dimineața devreme sau
- Ambele plicuri în dimineața zilei în care se efectuează procedura. Această administrare este potrivită doar atunci când procedura este planificată după amiaza/seara.

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Citiți prospectul înainte de utilizare.

Administrare orală. A se utiliza imediat după reconstituire.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**

**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Casen Recordati, S.L.  
Autovía de Logroño, Km 13,300  
50180 Utebo - Zaragoza  
Spania

**12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

9349/2016/10

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot:

**14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

**15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Facilitează evacuarea intestinului prin stimularea mișcărilor intestinale și creșterea conținutului de apă al materiilor fecale.

**Indicații:** Pentru curățarea intestinului înainte de orice procedură diagnostică ce necesită un intestin curat, de exemplu colonoscopie sau examinare radiologică.

#### **16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

Citrafleet

#### **17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

Nu este cazul.

#### **18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

Nu este cazul.

**CitraFleet pulbere pentru soluție orală**  
Picosulfat de sodiu, oxid de magneziu ușor, acid citric

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****ETICHETA PENTRU CUTIA CU 50 PLICURI****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

CitraFleet pulbere pentru soluție orală  
Picosulfat de sodiu, oxid de magneziu ușor, acid citric

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Fiecare plic conține picosulfat de sodiu 10,0 mg, oxid de magneziu ușor 3,5 g, acid citric 10,97 g.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Conține și potasiu (5 mmol sau 195 mg).  
Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Pulbere pentru soluție orală, în plic  
50 plicuri (ambalaj pentru uz spitalicesc)

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE****Adulți cu vârsta de 18 ani sau peste:**

Tratamentul poate fi administrat într-unul din următoarele moduri:

- Un plic în seara dinaintea efectuării procedurii și al doilea plic în dimineața zilei în care se efectuează procedura.
- Un plic în după amiaza și al doilea în seara dinaintea efectuării procedurii. Această schemă este recomandată în cazul în care procedura se efectuează dimineața devreme sau
- Ambele plicuri în dimineața zilei în care se efectuează procedura. Această administrare este potrivită doar atunci când procedura este planificată după amiaza/seara.

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Citiți prospectul înainte de utilizare

Administrare orală. A se utiliza imediat după reconstituire.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**

**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Casen Recordati, S.L.  
Autovía de Logroño, Km 13,300  
50180 Utebo - Zaragoza  
Spania

**12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

9349/2016/11

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot:

**14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

## **15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Facilitează evacuarea intestinului prin stimularea mișcărilor intestinale și creșterea conținutului de apă al materiilor fecale.

**Indicații:** Pentru curățarea intestinului înainte de orice procedură diagnostică ce necesită un intestin curat, de exemplu colonoscopie sau examinare radiologică.

## **16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

Citrafleet

## **17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

Nu este cazul.

## **18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

Nu este cazul.

**CitraFleet pulbere pentru soluție orală**  
Picosulfat de sodiu, oxid de magneziu ușor, acid citric

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****ETICHETA PENTRU CUTIA CU 50 (25X2) PLICURI****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

CitraFleet pulbere pentru soluție orală  
Picosulfat de sodiu, oxid de magneziu ușor, acid citric

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Fiecare plic conține picosulfat de sodiu 10,0 mg, oxid de magneziu ușor 3,5 g, acid citric 10,97 g.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Conține și potasiu (5 mmol sau 195 mg).  
Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Pulbere pentru soluție orală, în plic  
50 (25x2) plicuri (ambalaj pentru uz spitalicesc)

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE****Adulți cu vârsta de 18 ani sau peste:**

Tratamentul poate fi administrat într-unul din următoarele moduri:

- Un plic în seara dinaintea efectuării procedurii și al doilea plic în dimineața zilei în care se efectuează procedura.
- Un plic în după amiaza și al doilea în seara dinaintea efectuării procedurii. Această schemă este recomandată în cazul în care procedura se efectuează dimineața devreme sau
- Ambele plicuri în dimineața zilei în care se efectuează procedura. Această administrare este potrivită doar atunci când procedura este planificată după amiaza/seara.

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Citiți prospectul înainte de utilizare.



Administrare orală. A se utiliza imediat după reconstituire.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**

**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Casen Recordati, S.L.  
Autovía de Logroño, Km 13,300  
50180 Utebo - Zaragoza  
Spania

**12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

9349/2016/12

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot:

**14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

#### **15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Facilitează evacuarea intestinului prin stimularea mișcărilor intestinale și creșterea conținutului de apă al materiilor fecale.

**Indicații:** Pentru curățarea intestinului înainte de orice procedură diagnostică ce necesită un intestin curat, de exemplu colonoscopie sau examinare radiologică.

#### **16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

Citrafleet

#### **17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

Nu este cazul.

#### **18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

Nu este cazul.

**CitraFleet pulbere pentru soluție orală**  
Picosulfat de sodiu, oxid de magneziu ușor, acid citric

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR****ETICHETA PENTRU PLIC****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

CitraFleet pulbere pentru soluție orală  
Picosulfat de sodiu, oxid de magneziu ușor, acid citric

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Fiecare plic conține picosulfat de sodiu 10,0 mg, oxid de magneziu ușor 3,5 g, acid citric 10,97 g.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Conține și potasiu (5 mmol sau 195 mg).  
Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Pulbere pentru soluție orală.

15,08 g

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE****Adulți cu vârsta de 18 ani sau peste:**

Tratamentul poate fi administrat într-unul din următoarele moduri:

- Un plic în seara dinaintea efectuării procedurii și al doilea plic în dimineața zilei în care se efectuează procedura.
- Un plic în după amiaza și al doilea în seara dinaintea efectuării procedurii. Această schemă este recomandată în cazul în care procedura se efectuează dimineața devreme sau
- Ambele plicuri în dimineața zilei în care se efectuează procedura. Această administrare este potrivită doar atunci când procedura este planificată după amiaza/seara.

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Citiți prospectul înainte de utilizare.

Administrare orală. A se utiliza imediat după reconstituire.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI INDEMANA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**

**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Casen Recordati, S.L.  
Autovía de Logroño, Km 13,300  
50180 Utebo - Zaragoza  
Spania

**12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

9349/2016/01 – ambalaj cu 2 plicuri

9349/2016/02 – parte dintr-un ambalaj multiplu cu 50 (25x2) plicuri

9349/2016/03 – parte dintr-un ambalaj multiplu cu 100 (50x2) plicuri

9349/2016/04 – parte dintr-un ambalaj multiplu cu 200 (100x2) plicuri

9349/2016/05 – parte dintr-un ambalaj multiplu cu 500 (250x2) plicuri

9349/2016/06 – parte dintr-un ambalaj cu 50 plicuri

9349/2016/07 – parte dintr-un ambalaj cu 100 plicuri

9349/2016/08 – parte dintr-un ambalaj cu 200 plicuri

9349/2016/09 – parte dintr-un ambalaj cu 500 plicuri 9349/2016/10 – parte dintr-un ambalaj cu 1000 plicuri

9349/2016/11 – parte a unui ambalaj pentru uz spitalicesc cu 50 plicuri

9349/2016/12 - parte a unui ambalaj pentru uz spitalicesc cu 50 (25X2) plicuri

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot:

**14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

**15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

**16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**