

**Maresyl 1 mg/ml spray nazal, soluție**  
Clorhidrat de xilometazolină

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**

Cutia de carton

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Maresyl 1 mg/ml spray nazal, soluție  
Clorhidrat de xilometazolină

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

1 ml de spray nasal conține clorhidrat de xilometazolină 1 mg.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Conține și apă de mare purificată, dihidrogenofosfat de potasiu, apă purificată.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Spray nazal, soluție  
1 x 10 ml

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Administrare nazală.  
Pentru adulți, și copii cu vârsta de cel puțin 10 ani.  
A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:  
Flacon deschis: a se utiliza în decurs de 3 luni.

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare. A nu se congela.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL****11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Dr. Reddy's Laboratories Romania SRL  
Str. Daniel Danielopolu, nr. 30-32, etaj 5, spațiul 1, sector 1, București, România

**12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

9370/2016/01

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot:

**14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

**15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Maresyl este utilizat pentru tratamentul simptomatic al congestiei nazale.  
1 - 2 pulverizări în fiecare nară, la interval de 10-12 ore. Dacă este necesar, medicamentul poate fi utilizat de cel mult 3 ori pe zi.  
Pentru detalii suplimentare, citiți prospectul înainte de utilizare.

**16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

Maresyl 1 mg/ml spray nazal, soluție

**17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

<Nu este cazul.>

**18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

<Nu este cazul.>

**Maresyl 1 mg/ml spray nazal soluție**  
Clorhidrat de xilometazolină**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI****Flacon****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Maresyl 1 mg/ml spray nazal, soluție  
Clorhidrat de xilometazolină  
Administrare nazală

**2. MODUL DE ADMINISTRARE**

1 - 2 pulverizări în fiecare nară, la interval de 10-12 ore. Dacă este necesar, medicamentul poate fi utilizat de cel mult 3 ori pe zi.  
Pentru detalii suplimentare, citiți prospectul înainte de utilizare.

**3. DATA DE EXPIRARE**

EXP:  
Flacon deschis: a se utiliza în decurs de 3 luni.

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot:

**5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ**

10 ml

**6. ALTE INFORMAȚII**

Maresyl este utilizat pentru tratamentul simptomatic al congestiei nazale.

1 ml de spray nasal conține clorhidrat de xilometazolină 1 mg.

Pentru adulți, și copii cu vârsta de cel puțin 10 ani.