

Cexidal 3 mg/ml + 0,25 mg/ml picături auriculare, soluție
Ciprofloxacină/Fluocinolon acetamid

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**CUTIE****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Cexidal 3 mg/ml + 0,25 mg/ml picături auriculare, soluție
Ciprofloxacină/Fluocinolon acetamid

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI ACTIVE

1 ml de soluție conține ciprofloxacină 3 mg (sub formă de clorhidrat) și fluocinolon acetamid 0,25 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Parahidroxibenzoat de metil (E 218), parahidroxibenzoat de propil (E 216), povidonă K90 F, dietilenglicol monoetileter, compus al glicerinei cu etilenoxid (glycereth-26), acid clorhidric 1N și/sau hidroxid de sodiu 1N și apă purificată.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Picături auriculare, soluție
10 ml

5. MODUL ȘI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare auriculară
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A se nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Perioada de valabilitate după prima deschidere: 1 lună

8. DATA DE EXPIRARE

EXP.:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 30°C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL.

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Laboratorios SALVAT, S.A.
C/ Gall, 30-36. 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Spania

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

9556/2016/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripție medicală PRF

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

cexidal

Cexidal 3 mg/ml + 0,25 mg/ml picături auriculare, soluție
Ciprofloxacină/Fluocinolon acetonid**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI****FLACON****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**Cexidal 3 mg/ml + 0,25 mg/ml picături auriculare, soluție
Ciprofloxacină/Fluocinolon acetonid

Administrare auriculară

2. MODUL DE ADMINISTRARE**3. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

10 ml

6. ALTE INFORMAȚII

ciprofloxacină 3 mg (sub formă de clorhidrat) și fluocinolon acetonid 0,25 mg, parahidroxibenzoat de metil (E 218), parahidroxibenzoat de propil (E 216), povidonă K 90F, dietilenglicol monoetileter, compus al glicerinei cu etilenoxid (glycereth-26), acid clorhidric 1 N și/sau hidroxid de sodiu 1 N și apă purificată