

Codamin P comprimate

Paracetamol, cafeină anhidră, fosfat de codeină hemihidrat

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**CUTIE****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI****Codamin P comprimate**

Paracetamol

Cafeină anhidră

Fosfat de codeină hemihidrat

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Un comprimat conține paracetamol 400mg, cafeină anhidră 23mg și fosfat de codeină hemihidrat 15mg

3. LISTA EXCIPIENȚILOR**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Comprimate

20 comprimate

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare orală.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Pictograma (triunghi conform Ordinului MS nr. 759/2003).

(vezi prospectul pentru informații suplimentare)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Terapia SA
Str. Fabricii nr. 124, Cluj Napoca, România

{Sigla Terapia – a SUN PHARMA company}
{Sigla SUN PHARMA}

12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

9561/2016/01 - pentru cutia cu 2 blistere Al/PVC
9561/2016/02 - pentru cutia cu 2 blistere Al/PVC-PVDC

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Codamin P este indicat pentru tratamentul durerilor de intensitate ușoară până la moderată, cum sunt durerile de cap de tip migrenă, durerile de cap cu caracter constrictiv, dureri dentare, dureri la nivelul sinusurilor, dureri la nivelul urechii, nevralgii și dismenoree. Codamin P este indicat și pentru tratamentul stărilor febrile, al durerilor de gât, precum și pentru ameliorarea simptomelor din răceală și gripă.
Codeina poate fi utilizată o perioadă scurtă de timp la adolescenți cu vârsta peste 12 ani, pentru ameliorarea durerilor moderate, care nu sunt ameliorate de alte analgezice, cum sunt paracetamolul sau ibuprofenul administrate singure.

Nu utilizați Codamin P dacă sunteți alergic la substanțele active sau la oricare dintre celelalte componente, dacă aveți insuficiență hepatică severă, insuficiență respiratorie, hipersecreție traheo-bronșică, criză de astm bronșic sau ați suferit recent intervenții chirurgicale la nivelul căilor biliare. Nu se utilizează Codamin P

pentru ameliorarea durerii la copii și adolescenți (cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani) după îndepărtarea amigdalelor sau a vegetațiilor adenoide (polipilor) pentru tratamentul sindromului de apnee obstructivă în somn sau dacă știți că metabolizați foarte repede codeina la morfină. Codamin P nu trebuie utilizat la copii sub 12 ani sau în timpul sarcinii sau alăptării. Nu trebuie să consumați alcool etilic în timpul tratamentului cu Codamin P.

Întrebați medicul înainte de a utiliza Codamin P dacă aveți insuficiență renală severă, hipotiroidism, creștere în volum a prostatei sau obstrucție la nivelul căilor de eliminare a urinii, ați fost diagnosticat cu hipertensiune intracraniană, abdomen acut sau traumatism cranian, dacă sunteți în vârstă.

Doza uzuală este de 1 – 2 comprimate Codamin P; dacă este necesar, doza se poate repeta la intervale de 4 – 6 ore. Nu trebuie depășită doza maximă zilnică de 7 comprimate Codamin P.

Nu luați Codamin P mai mult de 3 zile fără acordul medicului dumneavoastră. Dacă simptomele persistă sau se agravează adresați-vă medicului.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Codamin P

1. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

2. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

Codamin P comprimate
Paracetamol, cafeină anhidră, fosfat de codeină hemihidrat

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER

BLISTER din PVC/Al

BLISTER din PVC-PVDC/Al

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Codamin P comprimate

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

{Sigla Terapia – a SUN PHARMA company}

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

5. ALTE INFORMAȚII