

**cemolPLUS 500 mg/3 mg comprimate**  
Paracetamol/maleat de clorfeniramină**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****CUTIE****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

cemolPLUS 500 mg/3 mg comprimate  
paracetamol/maleat de clorfeniramină

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Fiecare comprimat conține paracetamol 500 mg și maleat de clorfeniramină 3 mg

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Comprimat

20 comprimate

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Administrare orală

A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)****8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**

**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

SANOSAN S.R.L.  
Str. Carpaților, nr. 83-85  
Municipiul Brașov, județul Brașov, cod poștal 500269, România

**12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

9563/2016/01

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Serie:

**14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

**15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

*cemolPLUS* se utilizează în tratamentul rinitelor alergice și vasomotorii, în tratamentul simptomatic al răcelii comune și gripei-ameliorarea strănutului, rinoreei, congestiei nazale și sinusale, febrei, cefaleei și durerilor musculare.

Nu luați *cemolPLUS* dacă:

- aveți hipersensibilitate la paracetamol, fenacetină sau alte antiinflamatoare (risc crescut de reacții alergice);
- aveți hipersensibilitate la clorfeniramină sau alte antihistaminice;
- aveți hipersensibilitate la oricare dintre excipienții produsului.
- ați avut sau aveți deficit de glucozo-6-fosfat dehidrogenază.
- aveți glaucom cu unghi închis sau predispoziție la glaucom cu unghi închis; glaucom cu unghi deschis.
- aveți insuficiență hepatocelulară.
- utilizați împreună cu inhibitori de monoaminoxidaza (IMAO) non-selective.
- copii au vârsta sub 12 ani.

Utilizați dacă sunteți adult 1-2 comprimate *cemolPLUS* de 3 ori pe zi (nu se vor administra mai mult de 6 comprimate / zi și mai mult de 2 comprimate / priză).

În caz de insuficiență renală cu clearance-ul creatininei < 10 ml/min, intervalul între 2 doze trebuie să fie de cel puțin 8 ore.

Pentru copii între 12-15 ani luați 2-3 comprimate cemolPLUS pe zi (nu se vor administra mai mult de 3 comprimate / zi și mai mult de 1 comprimat/ priză).

A nu se depăși dozele recomandate.

## **16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

cemolPLUS

**cemolPLUS 500 mg/3 mg comprimate**  
Paracetamol/maleat de clorfeniramină

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE  
TERMOSUDATĂ**

**BLISTER**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

cemolPLUS 500 mg/3 mg comprimate  
Paracetamol/maleat de clorfeniramină

**2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

SANOSAN S.R.L.

**3. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Serie:

**5. ALTE INFORMAȚII**