

**OROFAR 2 mg +1,5 mg/ml spray bucofaringian, soluție**  
Clorură de benzoxoniu/Clorhidrat de lidocaină

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**

Cutie

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

OROFAR 2 mg + 1,5 mg/ml spray bucofaringian, soluție  
Clorură de benzoxoniu/Clorhidrat de lidocaină

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Un ml soluție conține clorură de benzoxoniu 2 mg și clorhidrat de lidocaină 1,5 mg.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Conține și etanol 96%, glicerol, acid clorhidric 0,1N, ulei de mentă, mentol, apă purificată.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Spray bucofaringian, soluție  
30 ml

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Administrare bucofaringiană.  
A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A se păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original.  
A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL****11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

STADA M&D SRL  
Strada Sfântul Elefterie, nr. 18, Parte A, Etaj 1  
Sector 5, București, România

{Sigla STADA M&D}

**12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

9619/2017/01

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Serie:

**14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

**15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Tratament simptomatic în cazul infecțiilor orofaringiene: dureri în gât asociate cu răceli, faringite sau laringite, stomatite, afte, gingivite. Adjuvant în tratamentul amigdalitelor.

**Doze**

*Adulți și copii peste 12 ani*

Se aplică în interiorul gurii sau în gât de 3-6 ori pe zi.

Se ține flaconul în poziție verticală și se pulverizează de 2-4 ori la fiecare aplicare.

*Copii între 4 și 11 ani*

Se pulverizează numai de 2-3 ori la fiecare aplicare.

**16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

Orofar spray bucofaringian soluție

**OROFAR 2 mg +1,5 mg/ml spray bucofaringian, soluție**  
Clorură de benzoxoniu/clorhidrat de lidocaină

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ AMBALAJE PRIMARE MICI**

Etichetă de flacon

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI SI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE**

OROFAR 2 mg +1,5 mg/ml spray bucofaringian, soluție  
Clorură de benzoxoniu/Clorhidrat de lidocaină

Administrare bucofaringiană.

**2. MODUL DE ADMINISTRARE**

A se citi prospectul înainte de utilizare.

**3. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Serie:

**5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ**

30 ml

**6. ALTE INFORMAȚII**

STADA M&D SRL

{Sigla STADA M&D}