

**Coldrex Junior HotRem 300 mg + 20 mg + 5 mg pulbere pentru suspensie orală**  
Paracetamol/Acid ascorbic/Clorhidrat de fenilefrină

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****CUTIE****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Coldrex Junior HotRem 300 mg + 20 mg + 5 mg pulbere pentru suspensie orală  
Paracetamol, acid ascorbic (vitamina C), clorhidrat de fenilefrină

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Fiecare plic a 3 g pulbere pentru suspensie orală conține paracetamol 300 mg, acid ascorbic 20 mg și clorhidrat de fenilefrină 5 mg.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Conține și zahăr (vezi prospectul pentru informații suplimentare).

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Pulbere pentru suspensie orală.

5 plicuri a câte 3 g pulbere pentru suspensie orală.

10 plicuri a câte 3 g pulbere pentru suspensie orală.

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Administrare orală

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Goliți conținutul unui plic într-o cană. Adăugați apă caldă, amestecați bine.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**

**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Perrigo România S.R.L.  
Str. Av. Popișteanu, Nr. 54 A, Expo Business Park  
Clădirea 2, Unitatea 3, Etaj 4, Sector 1, București, România

{Sigla Perrigo}

**12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

9664/2017/01- cutie cu 5 plicuri din hârtie/PEJD/AI/PEJD a câte 3 g pulbere pentru suspensie orală  
9664/2017/02 - cutie cu 10 plicuri din hârtie/PEJD/AI/PEJD a câte 3 g pulbere pentru suspensie orală  
9664/2017/03 - cutie cu 5 plicuri din hârtie/PEJD/AI/Surlyn a câte 3 g pulbere pentru suspensie orală  
9664/2017/04- cutie cu 10 plicuri din hârtie/PEJD/AI/Surlyn a câte 3 g pulbere pentru suspensie orală

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot:

**14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

**15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

- Febră

- Nas înfundat
- Dureri de cap
- Dureri în gât
- Sinuzită

Coldrex Junior HotRem asigură copilului dumneavoastră ameliorarea rapidă și eficientă a simptomelor din răceală și gripă inclusiv febră, frison, nas înfundat, dureri de cap, disconfort și dureri musculare, dureri în gât, sinuzită și dureri asociate.

Doza recomandată pentru copii cu vârsta între 6-12 ani:

Se administrează un plic la fiecare 4-6 ore. Nu se administrează mai mult de 4 plicuri în 24 de ore. Nu se administrează mai frecvent de 4 ore.

Medicamentul nu trebuie utilizat mai mult de 3 zile fără recomandarea medicului.

Nu se administrează copiilor cu vârsta sub 6 ani.

A nu se depăși doza recomandată.

În cazul unui supradozaj, trebuie să vă adresați imediat medicului, chiar dacă copilul se simte bine.

Nu produce somnolență.

A nu se lua împreună cu alte medicamente pentru gripă, răceală sau decongestionante.

Conține paracetamol. A nu se lua împreună cu alte medicamente care conțin paracetamol.

<b>16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE</b>
----------------------------------

Coldrex Junior HotRem

**Coldrex Junior HotRem 300 mg + 20 mg + 5 mg pulbere pentru suspensie orală**  
Paracetamol/Acid ascorbic/Clorhidrat de fenilefrină

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI****PLIC****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Coldrex Junior HotRem 300 mg + 20 mg + 5 mg pulbere pentru suspensie orală  
Paracetamol, acid ascorbic (vitamina C), clorhidrat de fenilefrină

Administrare orală.

**2. MODUL DE ADMINISTRARE**

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Goliți conținutul unui plic într-o cană. Adăugați apă caldă, amestecați bine.

**3. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot:

**5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ**

5 plicuri a câte 3 g pulbere pentru suspensie orală  
10 plicuri a câte 3 g pulbere pentru suspensie orală

**6. ALTE INFORMAȚII**

{Sigla Perrigo}

- Febră
- Nas înfundat
- Dureri de cap
- Dureri în gât
- Sinuzită

Coldrex Junior HotRem asigură copilului dumneavoastră ameliorarea rapidă și eficientă a simptomelor din răceală și gripă inclusiv febră, frison, nas înfundat, dureri de cap, disconfort și dureri musculare , dureri în gât, sinuzită și dureri asociate.

Doza recomandată pentru copii cu vârsta între 6-12 ani:

Se administrează un plic la fiecare 4-6 ore. Nu se administrează mai mult de 4 plicuri în 24 de ore.  
Nu se administrează mai frecvent de 4 ore.

Nu se administrează copiilor cu vârsta sub 6 ani.

A nu se depăși doza recomandată.  
Nu produce somnolență.

Conține zahăr  
Conține paracetamol.  
A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.