

ARNIGEL 70 mg/g gel
Arnica montana TM

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR
CUTIE**

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ARNIGEL 70 mg/g gel
Arnica montana TM

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Un gram de gel conține 70 mg de Arnica montana TM.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Vezi prospectul pentru informații suplimentare.
Excipienți: carbomer 980, hidroxid de sodiu sol. 10 %, etanol 96 % (v/v), apă purificată.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Gel.
Cutie cu un tub a 45 g gel
Cutie cu un tub a 120 g gel

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare cutanată.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

Doze și mod de administrare
Se aplică de îndată ce este posibil un strat subțire de gel pe zona cutanată corespunzătoare regiunii dureroase și se masează ușor până la penetrarea completă a gelului în piele. Se aplică din nou o dată sau de două ori pe zi.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE
PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy
Franța
{BOIRON}

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

9829/2017/01-02

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Traumatologia benignă în absența plăgilor
Echimoze, contuzii, oboseală musculară

Indicații terapeutice

Medicament homeopatic utilizat în mod tradițional în tratamentul local al traumatologiei benigne în absența plăgilor (echimoze, contuzii, oboseală musculară) la adulți și copii cu vârsta de peste 1 an.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

ARNIGEL

ARNIGEL 70 mg/g gel
Arnica montana TM**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR
TUB DIN AL****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

ARNIGEL 70mg/g gel
Arnica montana TM

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Un gram de gel conține 70 mg de Arnica montana TM.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Vezi prospectul pentru informații suplimentare.
Excipienți: carbomer 980, hidroxid de sodiu sol. 10 %, etanol 96 % (v/v), apă purificată.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Gel.
45 g gel
120 g gel

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare cutanată.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

Doze și mod de administrare
Se aplică de îndată ce este posibil un strat subțire de gel pe zona cutanată corespunzătoare regiunii dureroase și se masează ușor până la penetrarea completă a gelului în piele. Se aplică din nou o dată sau de două ori pe zi.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE
PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

{LL/AAAA}

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy
Franța
{BOIRON}

12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

9829/2017/01-02

13. SERIA DE FABRICAȚIE

{număr de lot}

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Traumatologia benignă în absența plăgilor
Echimoze, contuzii, oboseală musculară

Indicații terapeutice

Medicament homeopatic utilizat în mod tradițional în tratamentul local al traumatologiei benigne în absența plăgilor (echimoze, contuzii, oboseală musculară) la adulți și copii cu vârsta de peste 1 an.