

**PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR****Vicks AntiGrip Complex 500 mg/200 mg/10 mg pulbere pentru soluție orală**  
paracetamol/guaifenezină/clorhidrat de fenilefrină

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 3 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați medicului dumneavoastră.

**Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Vicks AntiGrip Complex și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Vicks AntiGrip Complex
3. Cum să utilizați Vicks AntiGrip Complex
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Vicks AntiGrip Complex
6. Conținutul ambalajului și alte informații

**1. CE ESTE VICKS ANTIGRIP COMPLEX ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ**

Vicks AntiGrip Complex este destinat ameliorării simptomelor de răceală și gripă.

Acesta conține trei substanțe active:

- Paracetamolul este bine cunoscut pentru acțiunea sa împotriva durerii (analgic). Este eficient împotriva durerii, inclusiv dureri de cap și dureri în gât și de asemenea, poate reduce febra (antipiretic).
- Guaifenezina (un expectorant) fluidifică secrețiile respiratorii și ameliorează tusea productivă.
- Clorhidratul de fenilefrină (un medicament ce desfundă nasul) reduce inflamația de la nivelul nasului, astfel desfundă nasul înfundat.

Trebuie să luați Vicks AntiGrip Complex numai dacă aveți durere sau febră, nas înfundat și tuse productivă.

Dacă după 3 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați medicului dumneavoastră.

**2. CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI VICKS ANTIGRIP COMPLEX**

**Nu luați Vicks AntiGrip Complex:**

- dacă sunteți alergic la paracetamol, guaifenezină, clorhidrat de fenilefrină sau la oricare dintre celelalte componente (vezi pct. 6)
- dacă aveți o boală de inimă
- dacă aveți tensiune arterială mare (hipertensiune arterială)
- dacă aveți o afecțiune a ficatului sau insuficiență renală severă
- dacă aveți glanda tiroidă foarte activă
- dacă aveți diabet zaharat
- dacă aveți glaucom cu unghi închis (presiune mare la nivelul ochilor)
- dacă aveți porfirie, o afecțiune ereditară caracterizată prin cantități excesive de pigmenți în urină
- dacă urmați tratament cu antidepressive triciclice
- dacă urmați tratament cu beta blocante
- dacă urmați tratament cu inhibitori de monoaminoxidază (IMAO) – utilizați în tratamentul depresiei sau a bolii Parkinson – sau ați urmat tratament cu aceștia în ultimele 14 zile
- dacă luați medicamente pentru scăderea tensiunii arteriale sau pentru tratamentul senzației de apăsare în piept.

### Atenționări și precauții

Important: conține paracetamol. Nu utilizați împreună cu orice alte medicamente care conțin paracetamol. În caz de supradozaj, trebuie solicitată imediat asistență medicală, chiar dacă vă simțiți bine, din cauza riscului de apariție întârziată a leziunilor grave ale ficatului. Nu utilizați împreună cu orice alt medicament pentru gripă, răceală sau cu produse ce desfundă nasul.

Înainte să luați Vicks AntiGrip Complex, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului:

- dacă aveți o problemă cu funcționarea ficatului
- dacă sunteți de sex masculin și aveți prostata mărită, deoarece este posibil să aveți o dificultate mai mare la urinare
- dacă aveți o problemă cu circulația sângelui (inclusiv sindromul Raynaud)
- dacă aveți tuse persistentă sau cronică, cum este tusea cauzată de fumat, astm bronșic, bronșită cronică sau emfizem pulmonar
- dacă aveți anemie hemolitică severă, deficit de glucozo-6-fosfat dehidrogenază, malnutriție cronică sau sunteți deshidratat.

### Copii și adolescenți

Nu administrați Vicks AntiGrip Complex la copii cu vârsta sub 12 ani.

### Vicks AntiGrip Complex împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului înainte să luați Vicks AntiGrip Complex dacă utilizați:

- medicamente care conțin **paracetamol sau alte medicamente care desfundă nasul pentru răceală și gripă**. Dacă luați acestea, nu utilizați Vicks AntiGrip Complex.
- flucloxacilină (antibiotic), din cauza unui risc grav de anomalie a sângelui și a lichidelor (acidoză metabolică cu decalaj anionic ridicat) care necesită tratament de urgență și care poate apărea în special în caz de insuficiență renală severă, septicemie (atunci când bacteriile și toxinele acestora circulă în sânge, ducând la deteriorarea organelor), malnutriție, alcoolism cronic și dacă se utilizează dozele maxime zilnice de paracetamol.
- **inhibitori de monoaminoxidază (IMAO)**, utilizați în tratamentul **depresiei** sau bolii Parkinson.

**Nu luați** Vicks AntiGrip Complex dacă ați luat IMAO în ultimele 14 zile.

- **antidepresive tricyclice** pentru **depresie**, cum sunt amitriptilină sau imipramină.
- medicamente pentru **tensiune arterială mare** (antihipertensive), inclusiv beta-blocante, sau medicamente pentru îmbunătățirea funcției inimii sau pentru corectarea ritmului neobișnuit de bătaie al inimii (digoxină, lanoxină, digitoxină).
- fenotiazine (care sunt utilizate fie ca medicamente antipsihotice pentru tratamentul unor boli, cum sunt schizofrenia sau paranoia, fie pentru a preveni greața și vărsăturile).
- medicamente pentru **greață și vărsături** (cum este metoclopramidă sau domperidonă)
- medicamente pentru **subțierea sângelui** (anticoagulante), cum este warfarină sau alte anticoagulante cumarinice
- medicamente pentru tratamentul **valorilor mari ale colesterolului** în sânge (cum este colestiramină)
- sedative (barbiturice)
- probenecid sau AZT (zidovudină)
- izoniazidă (utilizată în tratamentul sau prevenția tuberculozei)

### **Vicks AntiGrip Complex împreună cu alimente și băuturi**

Nu luați acest medicament cu băuturi alcoolice.

### **Sarcina, alăptarea și fertilitatea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Vicks AntiGrip Complex poate fi utilizat în timpul sarcinii doar dacă este necesar și numai dacă este recomandat de un medic sau farmacist.

Trebuie să luați cea mai mică doză posibilă care vă reduce durerea și/sau febra și să o utilizați pentru cel mai scurt timp posibil. Contactați medicul dumneavoastră dacă durerea și/sau febra nu se reduc sau dacă trebuie să luați medicamentul mai des.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Acest medicament poate provoca amețeală sau stare de confuzie. Nu conduceți vehicule și nu folosiți utilaje dacă sunteți afectați.

### **Vicks AntiGrip Complex conține aspartam, zahăr și sodiu:**

- Aspartam (E951). Acest medicament conține aspartam 6 mg în fiecare plic. Aspartam este o sursă de fenilalanină. Acesta poate fi dăunător dacă aveți fenilcetonurie (FCU), o tulburare genetică rară în care fenilalanina se acumulează din cauză că organismul nu o poate elimina în mod corespunzător.
- Zahăr. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.
- Sodiu: acest medicament conține sodiu 157 mg (componenta principală din sarea de gătit/sarea de masă) în fiecare plic. Aceasta este echivalentă cu 7,85% din doza maximă zilnică recomandată de sodiu pentru un adult. Discutați cu medicul dumneavoastră sau farmacistul dacă aveți nevoie de 3 sau mai multe plicuri pe zi, pentru o perioadă prelungită, mai ales dacă vi s-a recomandat să urmați o dietă cu conținut redus de sare (sodiu).

## **3. CUM SĂ UTILIZAȚI VICKS ANTIGRIP COMPLEX**

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

### **Doza recomandată este:**

Adulți și copii cu vârsta peste 12 ani:

1 plic la fiecare 4-6 ore, după cum este necesar. Nu luați mai mult de 4 plicuri într-un interval de 24 ore.

A nu se depăși doza recomandată.

Nu utilizați acest medicament cu băuturi alcoolice.

### **Copii și adolescenți**

Nu se administrează copiilor cu vârsta sub 12 ani.

### **Mod de administrare**

Acest medicament este o pulbere care trebuie dizolvată în apă și administrată ca o băutură fierbinte. Se toarnă pulberea dintr-un plic într-o cană de dimensiune standard și se umple cu apă caldă, dar nu fierbinte (aproximativ 250 ml). Se lasă să se răcească până la o temperatură la care poate fi băută și se bea soluția galbenă opalescentă cu miros și gust de citrice/mentol.

### **Durata tratamentului**

Nu este recomandată utilizarea pe termen lung a acestui medicament.

Dacă simptomele persistă pentru mai mult de 3 zile sau se înrăutățesc, adresați-vă medicului dumneavoastră.

### **Dacă luați mai mult Vicks AntiGrip Complex decât trebuie**

**Solicitați imediat asistență medicală** în cazul în care ați luat accidental mai mult decât trebuie sau dacă i s-a administrat unui copil mai mult decât este recomandat, **chiar dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră vă simțiți bine, din cauza riscului de apariție întârziată a leziunilor grave la nivelul ficatului.**

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă farmacistului.

### **Dacă uitați să utilizați Vicks AntiGrip Complex**

Nu luați o doză dublă pentru a compensa plicul uitat.

## **4. REACȚII ADVERSE POSIBILE**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Dacă prezentați oricare dintre următoarele reacții adverse grave, opriți imediat administrarea medicamentului și adresați-vă de urgență unui specialist.

- Au fost raportate cazuri foarte rare de reacții grave la nivelul pielii. Pot să apară foarte rar, reacții alergice severe (anafilaxie), respirație șuierătoare sau dificultăți la respirație. (Rare: afectează mai puțin de 1 din 1000 persoane, dar mai mult de 1 din 10000 persoane; Foarte rare: afectează mai puțin de 1 din 10000 persoane).

- Legate de paracetamol, pot să apară foarte rar anumite modificări ale celulelor din sânge și pancreatită (inflamație a pancreasului) (afectează mai puțin 1 din 10000 persoane)

### Alte reacții adverse

Frecvența	Reacția adversă
Frecvente (afectează mai puțin de 1 din 10 persoane, dar mai mult de 1 din 100 persoane).	Pierdere a poftei de mâncare, greață sau vărsături
Rare (afectează mai puțin de 1 din 1000 persoane, dar mai mult de 1 din 10000 persoane).	Reacții alergice ușoare (cum sunt erupții trecătoare pe piele sau urticarie) Dureri de stomac, diaree Dureri de cap, amețeli Bătăi rapide ale inimii (palpitații) Tensiune arterială mare Probleme cu somnul (insomnie), nervozitate, tremurături (tremor), iritabilitate, neliniște, confuzie sau anxietate. Valori anormale ale testelor de sânge care investighează funcția ficatului

### Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct la

Agencia Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478- RO

e-mail: [adr@anm.ro](mailto:adr@anm.ro)

Website: [www.anm.ro](http://www.anm.ro)

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

## 5. CUM SE PĂSTREAZĂ VICKS ANTIGRIP COMPLEX

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe plic sau pe cutie. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Durata de păstrare după reconstituire: Soluția reconstituită este stabilă timp de 90 minute.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

## 6. CONȚINUTUL AMBALAJULUI ȘI ALTE INFORMAȚII

### **Ce conține Vicks AntiGrip Complex**

Substanțele active sunt paracetamol, guaifenezină și clorhidrat de fenilefrină. Fiecare plic din acest medicament oferă o singură doză care conține **substanțele active**: paracetamol 500 mg, guaifenezină 200 mg și clorhidrat de fenilefrină 10 mg.

Celelalte componente sunt: zahăr, acid citric, acid tartric, ciclamat de sodiu, citrat de sodiu, aspartam (E 951), acesulfam de potasiu, mentol pulverizat, aromă de lămâie, aromă de suc de lămâie, galben de chinolină (E104). A se vedea sfârșitul punctului 2.

### **Cum arată Vicks AntiGrip Complex și conținutul ambalajului**

Vicks AntiGrip Complex este o pulbere de culoare aproape albă, ambalată în plicuri laminate, în cutie. Medicamentul este disponibil în cutii cu 5 și 10 plicuri.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

### **Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul**

#### **Deținătorul autorizației de punere pe piață**

Wicks Pharma, Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH  
Sulzbacher Straße 40  
65824 Schwalbach am Taunus  
Germania

#### **Fabricantul**

Procter & Gamble Manufacturing GmbH  
Procter & Gamble Strasse 1  
64521 Gross-Gerau, Hessen  
Germania

### **Acest medicament este autorizat în Statele Membre ale Spațiului Economic European sub următoarele denumiri comerciale:**

Bulgaria - Vicks SymptoMed Complete 500 mg/200 mg/10 mg powder for oral solution

Estonia - Paracetamol /Guaifenesin /Phenylephrine Wick

Republica Croația - Vicks SymptoMed Complete 500 mg +200 mg + 10 mg prašak za oralnu otopinu

Lituania - Paracetamol /Guaifenesin /Phenylephrine Wick 500 mg/ 200 mg/ 10 mg milteliai geriamajam tirpalui

Letonia - Paracetamol /Guaifenesin /Phenylephrine Wick 500 mg/ 200 mg/ 10 mg pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai

România - Vicks AntiGrip Complex 500 mg/200 mg/10 mg pulbere pentru soluție orală

Republica Slovacă - Vicks Chrípka a Prechladnutie Horúci nápoj

Spania - IlviGrip Expertorante polvo para solución oral

**Acest prospect a fost revizuit în noiembrie 2023.**