

**Prospect: Informații pentru pacient****Soluție Ringer Vioser soluție perfuzabilă**

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.

**Ce găsiți în acest prospect :**

1. Ce este Soluție Ringer Vioser și pentru ce se administrează
2. Înainte să vi se administreze Soluție Ringer Vioser
3. Cum se administrează Soluție Ringer Vioser
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Soluție Ringer Vioser
6. Conținutul ambalajului și alte informații

**1. Ce este Soluție Ringer Vioser și pentru ce se utilizează**

Soluție Ringer Vioser este o soluție electrolitică (soluție sterilă pentru administrare intravenoasă) aparținând unui grup de medicamente implicate în echilibrul hidroelectrolitic din organism.

Soluție Ringer Vioser este utilizat:

- pentru aport de apă și electroliți (calciu, potasiu, sodiu, clor);
- ca soluție pentru amestec cu alte medicamente pentru administrare intravenoasă (i.v.) compatibile.

**2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Soluție Ringer Vioser****Nu utilizați Soluție Ringer Vioser**

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la clorură de potasiu, clorură de calciu dihidrat sau clorură de sodiu sau la oricare dintre celelalte componente ale Soluție Ringer Vioser.

Anunțați medicul dumneavoastră sau persoana care vă supraveghează tratamentul dacă una din următoarele situații este valabilă pentru dumneavoastră:

- dacă aveți hiperhidratare (prea multă apă în organism)
- soluția nu trebuie administrată simultan cu sângele în acelaș set de perfuzie datorită posibilității apariției coagulării.

**Atenționări și precauții**

Spuneți medicului dumneavoastră despre problemele dumneavoastră medicale, în special despre:

- probleme cu inima
- probleme cu rinichii
- concentrații crescute de potasiu în sânge (hiperkaliemie)

- concentrații crescute de sodiu în sânge (hipernatriemie)
- concentrații crescute de clor în sânge (hipercloremie)
- umflături (edeme)
- alergii (la alimente și în special la medicamente)

#### **Soluție Ringer Vioser împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală în special:

- comprimate pentru eliminarea apei (exemplu furosemid, hidroclorotiazidă), comprimate pentru eliminarea apei care economisesc potasiul (amilorid, spironolactonă, triamteren)
- digoxină.

Nu începeți să utilizați și nu opriți tratamentul cu oricare medicament fără aprobarea medicului dumneavoastră.

#### **Sarcina, alăptarea și fertilitatea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Nu se cunosc restricții de utilizare în timpul sarcinii și alăptării dacă balanța hidro-electrolitică este monitorizată corect și frecvent, iar dozele sunt adaptate necesităților fiziologice.

#### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Nu sunt cunoscute efecte asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

### **3. Cum să vi se administreze Soluție Ringer Vioser**

Medicul dumneavoastră va decide doza și modul de administrare. Doza, concentrația soluției și viteza de administrare variază în funcție de necesarul de lichide și electroliți al organismului dumneavoastră..

Soluție Ringer Vioser se administrează de obicei sub formă de perfuzie în cabinetul medicului dumneavoastră sau în spital.

Teste de laborator incluzând concentrația de electroliți în sânge, pot fi efectuate pentru monitorizarea evoluției stării dumneavoastră sau pentru a verifica reacțiile adverse.

Pentru unică utilizare. Flaconul cu soluție neutilizată trebuie îndepărtat imediat după utilizare. Toate amestecurile trebuie făcute în condiții de asepsie, imediat înainte de începerea perfuziei.

Informația din acest prospect este restrânsă. Nu conține toate informațiile despre Soluție Ringer Vioser soluție perfuzabilă.

#### **Dacă vi s-a administrat mai mult Soluție Ringer Vioser decât trebuie**

Dacă suspectați un supradozaj anunțați imediat aceasta la camera de gardă. Simptomele supradozajului includ tulburări de respirație sau umflături (edeme).

#### **Dacă s-a omis să vi se administreze Soluție Ringer Vioser**

Dacă administrarea dozei dumneavoastră s-a întrerupt sau oprit în mod accidental, adresați-vă medicului dumneavoastră.

#### **Dacă încetați să utilizați Soluție Ringer Vioser**

Nu întrerupeți niciun tratament fără aprobarea medicului dumneavoastră.

Dacă simptomele dumneavoastră nu se ameliorează sau se agravează, discutați cu medicul dumneavoastră.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

#### **4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

În general, nu apar reacții adverse dacă administrarea medicamentului este adaptată corect scopului propus.

Spuneți imediat medicului dumneavoastră dacă apare oricare din următoarele reacții adverse: frison, greață, vărsături.

#### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

#### **5. Cum se păstrează Soluție Ringer Vioser**

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie și etichetă după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

#### **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

##### **Ce conține Soluție Ringer Vioser**

- Substanțele active sunt
  - Clorură de potasiu
  - Clorură de calciu dihidrat
  - Clorură de sodiu1000 ml soluție perfuzabilă conțin clorură de potasiu 0,3 g, clorură de calciu dihidrat 0,33 g și clorură de sodiu 8,6 g.
- Celelalte componente sunt acid clorhidric 25%, hidroxid de sodiu, apă pentru preparate injectabile.

##### **Cum arată Soluție Ringer Vioser și conținutul ambalajului**

Soluție Ringer Vioser soluție perfuzabilă este o soluție limpede incoloră.

Cutie cu 10 flacoane din PE conținând 1000 ml soluție perfuzabilă

Cutie cu 10 flacoane din PE conținând 500 ml soluție perfuzabilă

**Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul**

Vioser S.A.  
9<sup>th</sup>km Trikala-Larissa Nt. Rd., 42 100 Trikala, Grecia

telefon: +30 24310 83441  
fax: +30 24310 83550

**Acest prospect a fost revizuit în noiembrie 2018.**

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>