

Prospect: Informații pentru pacient**Sorbitol 50g/l soluție perfuzabilă**

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.

Ce găsiți în acest prospect :

1. Ce este Sorbitol 50g/l perfuzabilă și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să vi se administreze Sorbitol 50g/l soluție perfuzabilă
3. Cum se administrează Sorbitol 50g/l soluție perfuzabilă
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Sorbitol 50g/l soluție perfuzabilă
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Sorbitol 50g/l soluție perfuzabilă și pentru ce se utilizează

Sorbitol 50g/l soluție perfuzabilă se utilizează pentru :

Aport caloric glucidic, singur sau asociat cu soluții perfuzabile de aminoacizi, în cadrul nutriției parenterale, la bolnavii la care ingestia alimentelor nu este posibilă (intervenții chirurgicale etc.). Aportul caloric este de 400 kcal pentru 100 g sorbitol.

Prevenirea deshidratării intra- și extracelulare.

Profilaxia și tratamentul cetozei din stările de denutriție, diaree sau vărsături.

Vehicul pentru aportul terapeutic în perioada pre și postoperatorie imediată.

Rehidratare în cazul în care exista o pierdere de apă mai mare decât pierderea de clorură de sodiu și alți electroliți.

2. Ce trebuie să știți înainte să vi se administreze Sorbitol 50g/l soluție perfuzabilă**Nu vi se va administra Sorbitol 50g/l soluție perfuzabilă**

- dacă sunteți alergic la sorbitol sau la oricare dintre celelalte componente ale Sorbitol 50g/l soluție perfuzabilă;
- dacă prezentați hiperhidratare sau intoleranță la fructoză.

Atenționări și precauții

Medicamentul se administrează cu prudență în caz de diabet zaharat, malnutriție severă, intoleranță la carbohidrați, deficit de tiamină, hipofosfatemie, hemodiluție, sepsis, traumatisme.

Medicamentul se suplimentează, eventual, cu insulină și potasiu în funcție de nivelul prezenta glucozei în urina (glicozuriei) prezenta acetonei în urina(, acetonuriei) și nivelul glicemiei.

La diabetici sau la pacienți cu intoleranță la hidrați de carbon, în funcție de nivelul glicemiei, se ajustează doza de insulină și se supraveghează clinic și paraclinic.

Sorbitol 50g/l soluție perfuzabilă împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală în special.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Nu exista date in literatura de specialitate cu privire la administrarea produsului in timpul sarcinii si alaptarii. Dacă totuși se impune administrarea, se recomandă evaluarea raportului beneficiu/risc.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Medicamentul nu influențează capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

3. Cum să vi se administreze Sorbitol 50g/l soluție perfuzabilă

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Dozajul se va ajusta în funcție de vârsta pacientului, greutatea corporală și severitatea stării clinice. Doza optimă recomandată este de 1g sorbitol/kg și oră.

Dacă vi s-a administrat mai mult Sorbitol 50g/l soluție perfuzabilă decât trebuie

Nu au fost raportate cazuri de supradozaj.

Dacă s-a omis să vi se administreze Sorbitol 50g/l soluție perfuzabilă

Dacă administrarea dozei dumneavoastră s-a întrerupt sau oprit în mod accidental, adresați-vă medicului dumneavoastră.

Dacă încetați să utilizați Sorbitol 50g/l soluție perfuzabilă

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Daca soluția este administrată conform recomandărilor, nu apar reacții adverse.

Pot sa apara:cresterea nivelului glucozei in sange (hiperglicemie) , cresterea cantitatii de urina (poliurie), hiperosmolaritate, cresterea acidului lactic in sange (acidoza lactic) si cresterea valorilor acidului uric in sange(hiperuricemie).

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Sorbitol 50g/l soluție perfuzabilă

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie și etichetă după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original
Nu utilizați acest medicament dacă observați semne vizibile de deteriorare.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Sorbitol 50g/l soluție perfuzabilă

- Substanța activă este sorbitolul. 1000 ml soluție perfuzabilă conțin: Sorbitol 50 g.
- Celălalt component este reprezentat de apă pentru preparate injectabile.

Cum arată Sorbitolo 50g/l soluție perfuzabilă și conținutul ambalajului

Sorbitol 50g/l soluție perfuzabilă este o soluție limpede, incoloră, fără particule vizibile în suspensie.

Ambalaj

Cutie cu 20 pungi din PVC cu un tub conector a câte 500 ml soluție perfuzabilă

Cutie cu 4 pungi din PVC cu un tub conector a câte 2000 ml soluție perfuzabilă

Cutie cu 7 pungi din PVC cu un tub conector a câte 2000 ml soluție perfuzabilă

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

INFOMED FLUIDS S.R.L.

B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, 032266, București, România

Tel : 021 345 02 22

Fax: 021 345 31 85

E-mail: office@infomedfluids.ro

Acest prospect a fost revizuit în aprilie 2019.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>