

Prospect: Informații pentru utilizator**Tyrosur 1 mg/g gel**
Tirotricină

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Tyrosur gel și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Tyrosur gel
3. Cum să utilizați Tyrosur gel
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Tyrosur gel
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Tyrosur gel și pentru ce se utilizează

Tyrosur gel este un antibiotic local.

Tyrosur gel este utilizat pentru tratamentul rănilor de dimensiuni mici, superficiale, care supurează ușor, suprainfectate bacterian de agenți patogeni sensibili la tirotricină. Dacă după 7 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Tyrosur gel**Nu utilizați Tyrosur gel:**

- Dacă sunteți alergic (hipersensibil) la tirotricină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la punctul 6).

Nu este indicat pentru aplicarea pe mucoasa nazală. Studiile demonstrează că aplicarea în această zonă ar putea duce la alterarea mirosului.

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați Tyrosur gel, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului deoarece:

- în cazul aplicării în regiunea ochilor (se poate percepe o senzație de arsură).

Tyrosur gel împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Sarcina

Nu există date care să ateste acțiunea Tyrosur gel la femeile gravide.

Nu este cunoscut riscul potențial pentru ființele umane. Din această cauză este recomandat ca Tyrosur gel să nu se folosească în timpul sarcinii.

Alăptarea

Nu este cunoscut dacă clorura de cetilpiridiniu sau tirotricina se excretă în laptele matern. De aceea se recomandă ca Tyrosur gel să nu se folosească în timpul alăptării.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Medicamentul nu influențează negativ capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Tyrosur gel conține propilenglicol

Tyrosur gel 1mg/g conține propilenglicol care poate provoca iritație cutanată.

3. Cum să utilizați Tyrosur gel

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Tyrosur gel se aplică pe piele.

Se aplică Tyrosur gel de 2-3 ori pe zi în cantitate adecvată în așa fel încât gelul să acopere părțile afectate ale pielii. Pentru răni minore sau inflamații ale pielii pe suprafețe neacoperite ale corpului, nu este necesar nici un bandaj. Pentru răni mai mari sau care supurează se recomandă aplicarea unui bandaj protector, care trebuie schimbat după 1 – 2 zile conform recomandării medicului.

Perioada de tratament depinde de simptomatologia clinică. În cazul în care după o săptămână de tratament nu se observă nici o ameliorare, tratamentul va trebui reevaluat. Dacă există posibilitatea identificării agenților patogeni se recomandă efectuarea testelor necesare.

Dacă utilizați mai mult Tyrosur gel decât trebuie

Dacă ați folosit la o administrare o cantitate prea mare de Tyrosur gel, continuați tratamentul conform indicațiilor de dozare. Dacă observați apariția unor simptome neobișnuite, contactați imediat medicul.

Dacă uitați să utilizați Tyrosur gel

În cazul în care uitați să aplicați o dată Tyrosur gel, continuați administrarea conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului.

Dacă încetați să utilizați Tyrosur gel

Durata tratamentului depinde de severitatea și evoluția simptomatologiei clinice. Dacă întrerupeți tratamentul cu Tyrosur gel prea repede, nu puteți beneficia de efectul dorit.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Afecțiuni cutanate și ale țesutului subcutanat: în cazuri foarte rare (<1/10 000) pot apărea reacții de sensibilizare, respectiv senzația de arsură a pielii.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Tyrosur gel

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Produsul se poate utiliza în decurs de cel mult 3 luni după prima deschidere a tubului.

A se păstra la temperaturi sub 25° C, în ambalajul original.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Tyrosur gel

Substanța activă este tirotricina. 1 g gel conține 1 mg tirotricină

Celelalte componente sunt: etanol - 96%, clorură de cetilpiridiniu, propilenglicol, carbomer (Synthalen K), trometamol, apă purificată

Cum arată Tyrosur gel și conținutul ambalajului

Gel incolor, opalescent.

Ambalaje

Cutie cu un tub din Al a 5 g gel

Cutie cu un tub din Al a 25 g gel

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

ENGELHARD ARZNEIMITTEL GmbH & Co. KG
Herzbergstraße 3, 61138 Niederdorfelden, Germania
{Sigla ENGELHARD Arzneimittel}

Pentru orice informații referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a deținătorului autorizației de punere pe piață:

Vedra International – Reprezentanța România
Str. Dr. Ion Ghiulamila nr. 19, Sector 5, București, România
Tel: + 40 314 243 033
{Sigla VEDRA INTERNATIONAL}

Acest prospect a fost revizuit în iunie 2019.