

**Prospect: Informații pentru utilizator****BROMHEXIN FARMACOM 8 mg comprimate**  
Clorhidrat de bromhexin

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 3 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

**Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este BROMHEXIN FARMACOM și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați BROMHEXIN FARMACOM
3. Cum să utilizați BROMHEXIN FARMACOM
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează BROMHEXIN FARMACOM
6. Conținutul ambalajului și alte informații

**1. CE ESTE BROMHEXIN FARMACOM ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ**

BROMHEXIN FARMACOM acționează prin scăderea vâscozității mucusului de la nivelul tractului respirator, rezultând un efect de eliberare a căilor respiratorii superioare și fluidificare a secrețiilor bronșice.

BROMHEXIN FARMACOM se utilizează în tratamentul simptomelor care însoțesc afecțiunile acute și cronice ale căilor respiratorii, însoțite de secreții vâscoase.

BROMHEXIN FARMACOM este destinat administrării la adulți și copii cu vârsta peste 10 ani.

**2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI BROMHEXIN FARMACOM****Nu utilizați BROMHEXIN FARMACOM**

- dacă sunteți alergic la bromhexin sau la oricare dintre celelalte componente ale medicamentului;
- dacă aveți insuficiență renală severă;
- dacă aveți o afecțiune bronșică rară cu acumulare masivă de secreții (cum ar fi sindromul cililor imobili).

**Atenționări și precauții**

- dacă aveți o afecțiune renală sau insuficiență hepatică severă;
- dacă aveți ulcer gastric sau duodenal, datorită acțiunii iritante gastrice a medicamentului;

- dacă nu puteți expectora eficient, deoarece poate crește riscul obstrucției bronșice prin acumulare de secreții.

### **BROMHEXIN FARMACOM împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

În timpul tratamentului cu BROMHEXIN FARMACOM nu trebuie să luați medicamente antitusive (cum este codeina), sau medicamente cu efect iritant la nivelul stomacului. În cazul administrării concomitente de antibiotice (amoxicilină, ampicilină, eritromicină, cefuroximă, doxiciclină, oxitetraciclină), distribuția acestora la nivel pulmonar este îmbunătățită.

### **Utilizarea BROMHEXIN FARMACOM cu alimente și băuturi**

Utilizarea de alcool etilic în timpul tratamentului cu bromhexin crește riscul de apariție a efectelor toxice.

### **Sarcina și alăptarea**

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a utiliza orice medicament.

Nu se recomandă administrarea BROMHEXIN FARMACOM în timpul sarcinii și alăptării.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

BROMHEXIN FARMACOM nu are nicio influență asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

**BROMHEXIN FARMACOM conține lactoză.** Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat ca aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

## **3. CUM SĂ UTILIZAȚI BROMHEXIN FARMACOM**

Adulți: se administrează oral 1-2 comprimate de BROMHEXIN FARMACOM 8 mg (8–16 mg clorhidrat de bromhexin) de trei ori pe zi.

Copii (cu vârsta peste 10 ani) și adolescenți: se administrează oral 1 comprimat de BROMHEXIN FARMACOM 8 mg (8 mg clorhidrat de bromhexin) de trei ori pe zi.

Copii cu vârsta sub 10 ani: se recomandă concentrații și forme farmaceutice adecvate vârstei.

### **Dacă utilizați mai mult decât trebuie din BROMHEXIN FARMACOM**

Dacă luați mai mult decât trebuie din BROMHEXIN FARMACOM, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră sau farmacistului sau mergeți la cel mai apropiat spital.

### **Dacă uitați să utilizați BROMHEXIN FARMACOM**

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

## **4. REACȚII ADVERSE POSIBILE**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

- tulburări gastro-intestinale: greață, vărsături, diaree, dureri la nivelul porțiunii superioare a stomacului;
- reacții alergice: erupții trecătoare pe piele, urticarie.
- hipersecreție bronșică.

La pacienții incapabili să expectoreze eficient, există riscul de obstrucție bronșică.

#### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România  
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1  
București 011478-RO  
Tel: + 4 0757 117 259  
Fax: +4 0213 163 497  
e-mail: adr@anm.ro  
Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

### **5. CUM SE PĂSTREAZĂ BROMHEXIN FARMACOM**

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

### **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

#### **Ce conține BROMHEXIN FARMACOM**

- Substanța activă este clorhidratul de bromhexin. Un comprimat conține clorhidrat de bromhexin 8 mg.
- Celelalte componente sunt: amidon de porumb, lactoză monohidrat, povidonă K 30, gelatină, talc, stearat de magneziu.

#### **Cum arată BROMHEXIN FARMACOM și conținutul ambalajului**

BROMHEXIN FARMACOM se prezintă sub formă de comprimate rotunde, de culoare albă, cu suprafața plană.

Este disponibil în cutii cu 2 blistere din folie transparent de PVC/Al a câte 10 comprimate fiecare.

#### **Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul**

##### **Deținătorul autorizației de punere pe piață**

S.C. Farmacom S.A.  
Str. Zizinului nr. 112, Brașov,  
România  
Tel: +4 0268 331 114 fax: +4 0268 330 864  
e-mail: office@farmacom.ro

**Fabricantul**

S.C. Farmacom Producție S.R.L.  
Str. Zizinului nr. 112, Brașov,  
România

**Acest prospect a fost revizuit în august 2019.**