

Prospect: Informații pentru utilizator**Strepsils Eucalipt pastile**

Amilmetacrezol/alcool 2,4 diclorbenzilic

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 5 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect

1. Ce este Strepsils Eucalipt și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Strepsils Eucalipt
3. Cum să utilizați Strepsils Eucalipt
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Strepsils Eucalipt
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Strepsils Eucalipt și pentru ce se utilizează

Strepsils Eucalipt aparține unei grupe de medicamente denumite antiseptice.

Strepsils Eucalipt se utilizează ca adjuvant în tratamentul infecțiilor oro-faringiene, favorizând ameliorarea simptomelor provocate de acestea.

Calmare rapidă (în 5 minute) și de lungă durată (de până la 2 ore) a durerii în gât.

Efect antibacterian, antifungic și antiviral.

Dacă după 5 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Strepsils Eucalipt**Nu utilizați Strepsils Eucalipt:**

- dacă sunteți alergic la amilmetacrezol și alcool 2,4-diclorbenzilic sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la pct. 6).

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați Strepsils Eucalipt, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

Strepsils Eucalipt împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Nu se cunosc interacțiuni cu alte medicamente.

Strepsils Eucalipt împreună cu alimente, băuturi și alcool

Strepsils Eucalipt nu se administrează concomitent cu alimente sau băuturi, ci între mese.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Strepsils Eucalipt nu are nicio influență asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

Strepsils Eucalipt conține glucoză și zahăr. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament. Strepsils Eucalipt conține 1378 mg zahăr și 1102 mg glucoză/pastilă.

Acest lucru trebuie avut în vedere la pacienții cu diabet zaharat.

3. Cum să utilizați Strepsils Eucalipt

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Adulți și copii cu vârsta peste 6 ani

Doza recomandată este de o pastilă Strepsils Eucalipt la 2-3 ore; pastilele se țin în cavitatea bucală până la dizolvare; nu se mestecă și nici nu se înghit întregi; se administrează între mese.

La fel ca în cazul altor pastile, pentru a evita riscul apariției iritațiilor locale, trebuie să schimbați poziția pastilei în gură până la dizolvare.

Pentru a evita pericolul de sufocare, Strepsils Eucalipt va fi administrat numai copiilor care pot păstra pastila în gură până când aceasta se dizolvă lent, fără a fi supravegheați.

Vâstnici

Nu este necesară ajustarea dozei la această categorie de pacienți.

Durata tratamentului nu trebuie să depășească 5 zile deoarece pot apărea dezechilibre ale florei microbiene de la nivelul cavității bucale cu risc de producere a unor infecții bacteriene sau fungice.

Dacă utilizați mai mult Strepsils Eucalipt decât trebuie

Poate apărea disconfort gastro-intestinal; se întrerupe tratamentul și se iau măsurile de tratament simptomatice- pentru aceasta adresați-vă medicului dumneavoastră sau departamentului de primire urgențe.

Dacă uitați să utilizați Strepsils Eucalipt

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Strepsils Eucalipt

Întreruperea prematură a tratamentului nu vă afectează.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Pot apărea reacții alergice, tulburări digestive sau diaree.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România <http://www.anm.ro/>.

Agencia Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478- RO

Tel: + 4 0757 117 259

Fax: +4 0213 163 497

e-mail: adr@anm.ro

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Strepsils Eucalipt

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Strepsils Eucalipt

- Substanțele active sunt amilmetacrezol și alcool 2,4-diclorbenzolic. Fiecare pastilă conține amilmetacrezol 0,6 mg și alcool 2,4 diclorbenzolic 1,2 mg.
- Celelalte componente sunt: xilitol, Aroma de mentă răcoritoare, levomentol, Aroma Spearmint, ulei de eucalipt, zahăr, glucoză.

Cum arată Strepsils Eucalipt și conținutul ambalajului

Pastile rotunde, de culoare albă până la slab gălbui, translucide, cu gust caracteristic de mentă și logo S ștanțat pe ambele fețe.

Ambalaj

Cutie cu un blister din PVC-PVDC/Al a 12 pastile

Cutie cu 2 blistere din PVC-PVDC/Al a câte 12 pastile

Cutie cu 3 blistere din PVC-PVDC/Al a câte 12 pastile

Cutie cu 2 blistere din PVC-PVDC/Al a câte 8 pastile

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

Deținătorul autorizației de punere pe piață

RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) SRL

Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr. 48, Clădirea Crystal Tower, Etaj 11

Sectorul 1, București, România

Fabricantul

RB NL Brands B.V.

Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, Olanda

Acest prospect a fost revizuit în Mai, 2022.

Alte surse de informații

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România <http://www.anm.ro/>.