

**Prospect: Informații pentru utilizator****Okitask 25 mg comprimate filmate**  
ketoprofen

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect, sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau sfaturi.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Trebuie să discutați cu medicul dacă simptomele dumneavoastră se nu se îmbunătățesc după 3 zile pentru febră și după 5 zile pentru durere.

**Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Okitask 25 mg comprimate filmate și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Okitask 25 mg comprimate filmate
3. Cum să luați Okitask 25 mg comprimate filmate
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Okitask 25 mg comprimate filmate
6. Conținutul ambalajului și alte informații

**1. Ce este Okitask 25 mg comprimate filmate și pentru ce se utilizează**

Substanța activă din acest medicament este ketoprofenul lizinat, care aparține unui grup de medicamente numite „antiinflamatoare nesteroidiene” (AINS). Aceste medicamente au acțiune de scurtă durată în ameliorarea durerii prin modificarea modului în care organismul răspunde la durere, inflamație și febră. Ketoprofen sare de lizină este o sare a ketoprofenului care se absoarbe rapid și complet din organism. Este utilizat pentru ameliorarea durerii de intensitate ușoară până la moderată, cum este durerea musculară și articulară, durerea de cap, durerea în gât, durerea de dinți, durerea menstruală și febra la adulți cu vârsta de 18 ani și peste.

**Trebuie să discutați cu un medic dacă nu vă simțiți mai bine sau dacă vă simțiți mai rău după 3 zile pentru febră și după 5 zile pentru durere.**

**2. Ce trebuie să știți înainte să luați Okitask 25 mg comprimate filmate****Nu luați Okitask 25 mg comprimate filmate:**

- dacă sunteți **alergic** (hipersensibil) la ketoprofen sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la pct. 6).
- dacă suferiți de **astm bronșic** sau aveți antecedente de reacții **alergice** (hipersensibilitate) la AINS (de exemplu acid acetilsalicilic, ibuprofen)
- în timpul celui de-al **treilea trimestru de sarcină** (începând cu săptămâna 29). Vezi pct. 2 „Sarcina și alăptarea”
- dacă aveți **o afecțiune severă a inimii**, în care inima dumneavoastră nu funcționează așa cum trebuie
- dacă suferiți în prezent sau ați avut în trecut **probleme legate de intestin**, cum sunt:

- ulcer peptic activ
- ulcere la nivelul stomacului sau intestinului
- sângerare intestinală
- perforații la nivelul stomacului sau intestinului (perforație gastro-intestinală)
- digestie dureroasă sau tulburări digestive, care pot include greață, vărsături, senzație de arsură în capul pieptului, balonare și disconfort gastric (dispepsie cronică)
- inflamație a mucoasei care căptușește stomacul (gastrită)
- Dacă aveți **număr scăzut de celule sanguine** (leucocitopenie sau trombocitopenie), **sângerare activă** sau **tendință la sângerare** în timpul tratamentului cu medicamente care previn coagularea sângelui (anticoagulante)
- dacă aveți probleme de **rinichi** sau **ficat** severe

### Atenționări și precauții

Dacă observați orice semne de erupții trecătoare pe piele, roșeață sau dureri ale pielii în jurul orificiilor corpului (membranelor mucoase) sau reacții alergice după ce ați luat Okitask 25 mg comprimate filmate, încetați să luați acest medicament și spuneți imediat medicului dumneavoastră.

Dacă observați orice semne de sângerare la nivelul stomacului sau intestinului (de exemplu scaune de culoare roșu intens, scaune negre ca smoala, vărsături cu sânge sau cu particule de culoare închisă care seamănă cu zațul de cafea), încetați să luați acest medicament și spuneți imediat medicului dumneavoastră.

Dacă observați orice semne de ulcerare sau perforație (simptomele pot include: durere de stomac severă, frisoane, greață, vărsături, senzație de arsură în capul pieptului) după ce ați luat Okitask 25 mg comprimate filmate, încetați să luați acest medicament și spuneți imediat medicului dumneavoastră.

Persoanele vârstnice pot prezenta mai multe reacții adverse în cazul administrării AINS; în special reacții adverse la nivelul stomacului și intestinului, care pot fi letale. Dacă sunteți un pacient în vârstă, trebuie să utilizați acest medicament cu atenție.

Reacțiile adverse pot fi reduse la minimum dacă luați doza cea mai mică pentru intervalul de timp minim necesar ameliorării simptomelor.

Medicamentele antiinflamatorii/calmante ale durerii, cum este ketoprofenul, pot fi asociate cu un risc ușor crescut de atac de cord sau accident vascular cerebral, în special atunci când se administrează în doze crescute și pentru perioade de timp prelungite. Nu depășiți doza recomandată sau durata tratamentului.

Administrarea Okitask 25 mg comprimate filmate împreună cu alte medicamente care conțin AINS (de exemplu ibuprofen, acid acetilsalicilic, celecoxib) trebuie evitată.

Încetați să luați acest medicament dacă aveți probleme de vedere, de exemplu vedere încețoșată.

Întrucât Okitask 25 mg comprimate filmate este utilizat pentru tratamentul simptomelor cum este febra, poate masca o afecțiune preexistentă mai gravă. Dacă simptomele persistă, spuneți medicului dumneavoastră.

Administrarea unui calmant pentru dureri de cap prea mult timp poate duce la agravarea acestor dureri.

Înainte să luați Okitask 25 mg comprimate filmate, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Dacă sunteți **gravidă, încercați să rămâneți gravidă** sau **alăptați** (vezi pct. 2 „Sarcina și alăptarea”)
- Dacă aveți **retenție de lichide și umflături**
- Dacă aveți **presiune arterială crescută, inimă slăbită**, boală arterială și/sau probleme cu vasele de sânge care transportă sângele la creier
- Dacă aveți o boală de ficat

- Dacă aveți o boală de rinichi
- Dacă aveți alergii (de ex. febra fânului)
- Dacă aveți boală pulmonară obstructivă cronică (BPOC)
- Dacă aveți porfirie hepatică (o boală de sânge rară caracterizată prin alterări ale activității unei enzime hepatice) deoarece medicamentul poate declanșa un atac.
- Dacă aveți o infecție - vezi paragraful „Infecții” de mai jos.

### **Infecții**

Okitask 25 mg comprimate filmate poate ascunde semne de infecții, cum sunt febra și durerea. Ca urmare este posibil ca Okitask 25 mg comprimate filmate să întârzie tratamentul adecvat al infecției, ceea ce poate duce la un risc crescut de complicații. Acest lucru a fost observat în cazul pneumoniilor provocate de bacterii și în infecții bacteriene la nivelul pielii, legate de vărsatul de vânt. Dacă luați acest medicament în timp ce aveți o infecție și simptomele dumneavoastră persistă sau se agravează, adresați-vă imediat medicului.

### **Copii și adolescenți**

Nu administrați Okitask 25 mg comprimate filmate la copii cu vârsta sub 18 ani.

### **Okitask 25 mg comprimate filmate împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente. Acestea includ medicamentele eliberate fără prescripție medicală sau medicamentele pe bază de plante medicinale.

Trebuie să spuneți **medicului dumneavoastră sau farmacistului** dacă luați oricare dintre următoarele medicamente:

- medicamente care **îmbunătățesc fluxul de sânge** cum sunt anticoagulante (acid acetilsalicilic, warfarină, heparină, ticlopidină, dabigatran sau clopidogrel), trombolitice (reteplase, streptokinase), vasodilatatoare periferice (pentoxifilina), prasugrel, cumarine
- anumite **antibiotice** (de exemplu chinolone, sulfonamide)
- medicamente utilizate după un **transplant de organ** pentru a ajuta la prevenirea rejektului (de ex. ciclosporină, tacrolimus)
- medicamente utilizate pentru anumite **afecțiuni psihice și depresie** (de ex. litiu, venlafaxină și inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei (ISRS))
- **alte AINS** (de ex. acid acetilsalicilic, ibuprofen) sau paracetamol
- **diuretice** (comprimate pentru eliminarea apei) cum este bendroflumetiazidă
- **glucocorticosteroizi** (hormoni steroidieni cum sunt hidrocortizonul sau prednisolonul)
- medicamente anti-retrovirale utilizate pentru tratamentul infecțiilor cu **HIV** (de exemplu ritonavir, zidovudina)
- medicamente pentru **tratamentul presiunii arteriale crescute** (de ex. ramipril, captopril, enalapril, losartan, irbesartan)
- **relaxante musculare** cum este baclofen
- medicamente utilizate pentru tratamentul **insuficienței cardiace** și pentru a **controla frecvența bătăilor inimii** (de ex. digoxină, digitoxină)
- medicamente pentru tratamentul **diabetului** (de ex. gliclazidă)
- medicamente pentru tratamentul **cancerului** (de ex. erlotinib, pemetrexed, metotrexat)
- medicamente pentru tratamentul **gutei** (de ex. probenecid)
- **difenilhidantoină** – un medicament antiepileptic
- **penicilamină** – un medicament utilizat pentru tratamentul artritei reumatoide

### **Okitask 25 mg comprimate filmate împreună cu alcoolul etilic**

Alcoolul poate cauza iritație la nivelul gâtului, stomacului și intestinului, prin urmare poate crește riscul de sângerare și ulcerare; acest risc este crescut în cazul în care AINS se administrează în același timp.

### **Sarcina și alăptarea**

Nu luați acest medicament dacă sunteți în ultimele 3 luni de sarcină, deoarece ar putea să dăuneze fătului dumneavoastră sau ar putea cauza probleme la naștere. Acesta poate cauza probleme renale și cardiace fătului dumneavoastră. Poate afecta tendința dumneavoastră și a copilului dumneavoastră de a sângera și poate face ca travaliul să fie întârziat sau să dureze mai mult decât se așteaptă. Nu trebuie să luați ketoprofen în timpul primelor 6 luni de sarcină, decât dacă este absolut necesar și recomandat de medicul dumneavoastră. Dacă aveți nevoie de tratament în această perioadă sau în perioada în care încercați să rămâneți gravidă, trebuie utilizată cea mai mică doză, pentru cea mai scurtă durată de timp. Dacă este administrat pentru mai mult de câteva zile, începând cu săptămâna 20 de sarcină, ketoprofenul poate cauza probleme renale fătului dumneavoastră, care pot avea ca rezultat niveluri scăzute ale lichidului amniotic care înconjoară copilul (oligohidroamnios) sau îngustarea unui vas de sânge (ductul arterial) la nivelul inimii copilului. Dacă aveți nevoie de tratament pentru mai mult de câteva zile, medicul dumneavoastră vă poate recomanda monitorizare suplimentară.

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Dacă, după ce ați luat Okitask 25 mg comprimate filmate, aveți senzație de somnolență, amețeli, vedere încețoșată sau convulsii, nu conduceți vehicule, nu folosiți utilaje sau nu efectuați activități care necesită un nivel crescut de vigilență psihică (vezi pct. 4 „Reacții adverse posibile”).

### **3. Cum să luați Okitask 25 mg comprimate filmate**

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect, sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Trebuie utilizată doza minimă eficientă pentru cea mai scurtă perioadă de timp necesară pentru a ameliora simptomele. Dacă aveți o infecție, adresați-vă imediat medicului dacă simptomele (cum sunt febră și durere) persistă sau se agravează (vezi pct. 2).

Doza recomandată este de 1 comprimat de cel mult 3 ori pe zi, după cum este necesar.

Așteptați cel puțin patru ore înainte de a lua un alt comprimat.

#### **A nu se depăși doza recomandată.**

Înghițiți comprimatul întreg, cu apă.

Linia mediană nu este destinată pentru ruperea comprimatului.

Dacă simptomele persistă sau se agravează, sau dacă aveți orice simptome noi, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

#### **Utilizarea la copii**

Okitask 25 mg comprimate filmate nu trebuie administrat la copii și adolescenți cu vârsta sub 18 ani.

#### **Utilizarea la vârstnici**

Nu luați mai mult de 1 comprimat de Okitask 25 mg comprimate filmate în interval de 24 ore.

#### **Mod de administrare**

Okitask 25 mg comprimate filmate se administrează pe cale orală.

#### **Dacă luați mai mult Okitask 25 mg comprimate filmate decât trebuie**

Dacă luați accidental mai mult Okitask 25 mg comprimate filmate decât este recomandat, vă puteți simți somnolent sau puteți avea senzație de greață. Trebuie să solicitați imediat asistență medicală, chiar dacă vă simțiți bine.

### **Dacă uitați să luați Okitask 25 mg comprimate filmate**

#### **Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.**

Dacă ați uitat să luați Okitask 25 mg comprimate filmate, luați-l imediat ce vă aduceți aminte. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată - asigurați-vă că lăsați cel puțin 4 ore între doze și nu depășiți maximum 3 comprimate pe zi.

### **Dacă încetați să luați Okitask 25 mg comprimate filmate**

Trebuie să încetați să luați acest medicament imediat ce vă simțiți mai bine. Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului sau farmacistului.

## **4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. Reacțiile adverse pot fi reduse la minimum dacă luați doza cea mai mică pentru intervalul de timp minim necesar ameliorării simptomelor.

**Încetați să luați Okitask 25 mg comprimate filmate și solicitați imediat asistență medicală** dacă în orice moment în timpul tratamentului cu Okitask 25 mg comprimate filmate manifestați:

- **semne de sângerare intestinală, cum sunt:** scaune (materii fecale) de culoare roșu intens, scaune negre ca smoala, vărsături cu sânge sau particule închise la culoare care arată ca zațul de cafea
- **semne de erupții trecătoare pe piele, reacții ale pielii severe și formarea de vezicule la nivelul pielii, gurii și ochilor** (de ex. sindrom Steven-Johnson, necroliză epidermică toxică)
- **semne de reacție alergică gravă** cum sunt:
  - dificultăți respiratorii sau respirație șuierătoare inexplicabilă,
  - amețeli sau bătăi ale inimii rapide
  - umflare a buzelor, feței, gâtului sau limbii
- agravare a **bolii Crohn** și **colitei** (boală inflamatorie cronică a intestinului cu simptome de durere abdominală, diaree, febră și pierdere în greutate)

### **Spuneți medicului dumneavoastră dacă prezentați:**

- febră, durere în gât, ulcerații la nivelul gurii, durere de cap, vărsături, sângerare și vânătăi inexplicabile, epuizare rapidă
- indigestie, durere la nivelul stomacului sau abdomenului, constipație, diaree, flatulență sau, în cazul în care nu vă simțiți bine, durere la nivelul toracelui sau bătăi ale inimii neregulate, rapide
- probleme cu ficatul sau rinichii asociate cu umflare la nivelul brațelor și picioarelor.

### **Reacțiile adverse cu Okitask 25 mg comprimate filmate pot include:**

#### **Frecvente** (pot afecta până la 1 din 10 persoane):

- probleme de digestie (dispepsie), greață, durere abdominală, vărsături

#### **Mai puțin frecvente** (pot afecta până la 1 din 100 persoane)

- durere de cap, amețeli, somnolență
- constipație, diaree, flatulență (vânturi), inflamație a mucoasei care căptușește stomacul
- umflare ca urmare a acumulării de lichide
- mâncărime și erupție trecătoare pe piele
- oboseală

#### **Rare** (pot afecta cel mult 1 din 1000 persoane)

- deficit de fier (anemie) provocat de sângerare
- amorțeală, înțepături la nivelul pielii
- vedere încețoșată
- țiuțuri în ureche (tinitus)

- astm bronșic
- inflamație a mucoasei bucale
- ulcer gastric
- inflamație la nivelul ficatului (hepatită), creșteri ale enzimelor hepatice, îngălbenirea pielii sau a albului ochilor (icter)
- creștere în greutate

**Cu frecvență necunoscută** (care nu poate fi estimată din datele disponibile)

- modificări ale numărului de celule sanguine și trombocite
- reacții alergice (anafilaxie)
- insuficiența glandelor localizate deasupra rinichilor (glande suprarenale)
- tensiune arterială crescută, înroșirea feței (vasodilatație)
- insuficiență cardiacă
- insuficiență renală, inflamație a rinichilor, rezultate anormale ale testelor renale
- colită
- agravarea condițiilor gastro-intestinale
- scaune de culoare închisă sau neagră
- vărsături cu sânge
- nas înfundat sau curgere a nasului (rinită)
- umflare a gâtului
- umflare a straturilor profunde ale pielii, provocată de excesul de lichide (de ex. fața, mâinile)
- respirație dificilă (bronhospasm)
- durere de cap
- detresă respiratorie provocată de îngustarea căilor aeriene
- contracții musculare necontrolate (convulsii)
- sensibilitate la lumina soarelui sau a lămpilor ultraviolete
- tulburări ale gustului
- modificări ale dispoziției
- modificări ale comportamentului
- căderea părului
- erupții ale pielii care provoacă mâncărime
- sângerare la nivelul stomacului și/sau intestinului, simptomele pot include durere de stomac severă, frisoane, greață, vărsături, sânge sau particule închise la culoare care arată ca zațul de cafea, senzație de arsură în capul pieptului, scaune de culoare roșu intens sau negre ca smoala

**Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea puteți raporta reacțiile adverse direct la

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478- RO

e-mail: [adr@anm.ro](mailto:adr@anm.ro).

Website: [www.anm.ro](http://www.anm.ro)

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

**5. Cum se păstrează Okitask 25 mg comprimate filmate**

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra în ambalajul original a fi protejat de lumină și umiditate. Acest medicament nu necesită condiții de temperatură speciale de păstrare.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

## **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

### **Ce conține Okitask 25 mg comprimate filmate**

- Substanța activă este ketoprofen. Fiecare comprimat conține ketoprofen 25 (sub formă de ketoprofen lizinat).
- Celelalte ingrediente sunt: manitol (E421), crospovidonă, laurilsulfat de sodiu, siliciu coloidal anhidru (E551), stearilfumarat de sodiu (E485), alcool polivinilic (E1203), macrogol 4000 (E1521), dioxid de titan (E171), talc (E553B), albastru strălucitor (E133), lac de aluminiu galben de chinolină (E104).

### **Cum arată Okitask 25 mg comprimate filmate și conținutul ambalajului**

Okitask 25 mg comprimate filmate se prezintă sub formă de comprimate filmate rotunde, de culoare albastră, cu o linie mediană pe o parte. Comprimatele sunt furnizate în ambalaje de 8, 10, 15, comprimate. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

### **Deținătorul autorizației de punere pe piață**

Dompé farmaceutici S.p.A.  
Via San Martino, 12  
20122 Miláno  
Italia

### **Fabricantul**

Abiogen Pharma S.p.A.  
Via Meucci, 36  
56121 Ospedaletto  
Pisa  
Italia

### **Acest medicament este autorizat în Statele Membre ale Spațiului Economic European sub următoarele denumiri comerciale:**

Bulgaria	Okitask 25 mg film-coated tablets
Franța	Okitask 25 mg comprimé pelliculé
Finlanda	Okitask 25 mg kalvopäällysteiset tabletit
Ungaria	Okitask 25 mg filmtabletta
Letonia	Okitask 25 mg apvalkotās tabletes
Lituania	Okitask 25 mg plėvele dengtos tabletės
Țările de Jos	Okitask 25 mg filmomhulde tablet
Polonia	Okitask, 25 mg, tabletki powlekane
Portugalia	Okiact 25 mg comprimidos revestidos
Spania	Okidol 25 mg comprimidos recubiertos con película
Croația	Okitask 25 mg filmom obložene tablete
Slovenia	Okitask 25 mg filmsko obložene tablete

Grecia	Okitask 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
România	Okitask 25 mg comprimate filmate

**Acest prospect a fost revizuit în octombrie 2023.**