

PIRITINOL ARENA 100 mg
Drajeuri, 100 mg**Compoziție**

Un drajeu conține 100 mg diclorhidrat de piritinol monohidrat și excipienți: lactoză monohidrat, amidon de porumb, polividonă, stearat de magneziu, talc, zahăr, carbonat de calciu, gumă arabică desenzimată, dioxid de titan (E 171), macrogol 6000, tartrazină (E 102), ceară carnauba.

Grupa farmacoterapeutică: alte psihostimulante și nootrope.

Indicații terapeutice

Tratament simptomatic al tulburărilor neurosenzoriale și neuropsihice din insuficiența cerebro-vasculară cronică, sindroame posttraumatice cerebrale, accidente vasculare cerebrale, encefalite, intoxicații, astenie psihică, tendința la depresie, întârziere psihomotorie, tulburări de comportament la copii.

Tratament de fond adjuvant în poliartrita reumatoidă.

Contraindicații

Hipersensibilitate la piritinol, piridoxină, penicilamină (structurile chimice sunt înrudite) sau la oricare dintre excipienții produsului;

Insuficiență renală, nefropatii cu proteinurie și hematurie;

Insuficiență hepatică;

Tulburări hematologice;

Lupus eritematos diseminat;

Miastenie;

Dermatoze grave.

Precauții

Ocazional produsul determină stare de agitație cu insomnie; fenomenele de excitație centrală, mai frecvente la copii, fac necesare reducerea dozei și evitarea administrării înainte de culcare.

Interacțiuni

Preparatele antireumatice, penicilamina, sărurile de aur și sulfasalazina pot exacerba reacțiile adverse.

Atenționări speciale

Sarcina și alăptarea

Nu se recomandă administrarea produsului în timpul sarcinii și alăptării.

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Produsul nu influențează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Doze și mod de administrare

Adulți: Doza recomandată este de 200 mg piritinol (2 drajeuri *PIRITINOL ARENA 100 mg*) de 3 ori pe zi, timp de mai multe săptămâni. În poliartrita reumatoidă doza recomandată este de 400 –

600 mg piritinol (4-6 drajeuri *PIRITINOL ARENA 100 mg*) repartizată în 3 prize, în tratamentul de lungă durată.

Copii: 50-300 mg piritinol (1/2 – 3 drajeuri *PIRITINOL ARENA 100 mg*) pe zi.

Reacții adverse

Rareori au fost raportate iritabilitate, anxietate, insomnie, cefalee, disconfort epigastric, greață, erupții cutanate; în condițiile folosirii îndelungate (în poliartrita reumatoidă) au fost semnalate: proteinurie (valori peste 1g/24 ore impun oprirea medicației), erupții buloase (se întrerupe tratamentul), polimiozită, miastenie (imune), trombocitopenie, leucopenie, agranulocitoză.

Supradozaj

Simptome: Supradozajul poate duce la o exacerbare a reacțiilor adverse.

Tratament: Se recomandă tratament simptomatic și de susținere a funcțiilor vitale.

Păstrare

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Ambalaj

Cutie cu 3 blistere a câte 10 drajeuri.

Producător

S.C. ARENA GROUP S.A.

B-dul Dunării nr. 54

Comuna Voluntari, Jud. Ilfov

Deținătorul Autorizației de punere pe piață

S.C. ARENA GROUP S.A.

Str. Ștefan Mihăileanu nr. 31,

Sector 2, București, România

Data ultimei verificări a prospectului

Aprilie, 2007