

Prospect: Informații pentru utilizator

Fluconazol Slavia 50 mg capsule

Fluconazol Slavia 150 mg capsule

Fluconazol

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Fluconazol Slavia și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Fluconazol Slavia
3. Cum să luați Fluconazol Slavia
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Fluconazol Slavia
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Fluconazol Slavia și pentru ce se utilizează

Fluconazol Slavia aparține unui grup de medicamente denumite „antifungice”. Substanța activă este fluconazolul.

Fluconazol Slavia capsule este utilizat la adulți pentru tratarea infecțiilor produse de funghi și poate fi folosit și pentru prevenirea infecțiilor candidozice. Majoritatea infecțiilor fungice sunt produse de o levură denumită *Candida*.

Adulți

Medicul vă poate recomanda medicamentul pentru tratarea următoarelor infecții fungice:

- meningită criptococică – infecție fungică la nivelul creierului;
- coccidiomicoză – o afecțiune a sistemului bronhopulmonar;
- infecțiile produse de *Candida* localizate în sânge, organe interne (inimă, plămâni) sau căile urinare;
- candidoză a mucoaselor – infecții ale mucoasei gurii, gâtului și stomatita asociată protezei dentare;
- candidoză genitală - infecția vaginului sau a penisului;

- infecții fungice ale pielii - de exemplu, „piciorul de atlet”, dermatofitiile, micozele unghiilor.

Tratamentul cu **Fluconazol Slavia** vă poate fi recomandat și pentru:

- prevenirea reapariției meningitei criptococice;
- prevenirea reapariției candidozei mucoaselor;
- scăderea incidenței candidozei vaginale;
- prevenirea infecțiilor cu *Candida* (dacă sistemul imun este deficitar).

Copii și adolescenți (cu vârsta cuprinsă între 0 și 17 ani)

Medicul poate recomanda medicamentul pentru tratarea următoarelor infecții fungice:

- candidoză a mucoaselor - infecții ale mucoasei gurii, gâtului;
- infecții produse de *Candida* și localizate în sânge, organe interne (inimă, plămâni) sau căile urinare;
- meningită criptococică – infecție fungică la nivelul creierului.

Tratamentul cu **Fluconazol Slavia** poate fi recomandat și pentru:

- prevenirea infecțiilor cu *Candida* (dacă sistemul imun este deficitar);
- prevenirea reapariției meningitei criptococice.

2. Ce trebuie să știți înainte să luați Fluconazol Slavia

Nu luați Fluconazol Slavia:

- dacă sunteți alergic la fluconazol, la alte medicamente pe care le-ați luat pentru tratarea infecțiilor cu fungi sau la oricare dintre excipienții enumerați la pct. 6. Simptomele pot fi senzație de mâncărime, înroșire a pielii sau dificultăți de respirație;
- dacă luați astemizol sau terfenadină (medicamente antihistaminice pentru tratamentul alergiilor);
- dacă luați cisapridă (un medicament folosit pentru afecțiuni ale stomacului);
- dacă luați pimozidă (un medicament folosit pentru afecțiuni mintale);
- dacă luați chinidină (un medicament folosit pentru tulburări de ritm cardiac);
- dacă luați eritromicină (antibiotic folosit pentru tratarea infecțiilor).

Atenționări și precauții

Înainte să luați **Fluconazol Slavia** adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale:

- dacă suferiți de boli de ficat sau de rinichi;
- dacă suferiți de boli de inimă, inclusiv tulburări de ritm cardiac;
- dacă aveți valori anormale ale concentrației de potasiu, calciu sau magneziu în sânge;
- dacă apar reacții cutanate severe (senzație de mâncărime, înroșire a pielii) sau dificultăți de respirație;
- dacă ați prezentat vreodată o erupție trecătoare severă pe piele sau descuamare a pielii, formarea de vezicule și/sau inflamații ale gurii după ce ați utilizat **Fluconazol Slavia**;
- dacă infecția fungică nu se ameliorează, deoarece poate să fie necesară o terapie antifungică alternativă;
- dacă vă apar semne de „insuficiență corticosuprarenaliană” (oboseală cronică sau de lungă durată, slăbiciune a mușchilor, pierdere a poftei de mâncare, scădere în greutate, dureri abdominale), în care glandele corticosuprarenale nu produc cantități suficiente din anumiți hormoni steroidieni cum este cortizolul.

Au fost raportate reacții grave la nivelul pielii, inclusiv reacție la medicament cu eozinofilie și simptome sistemice (DRESS) în asociere cu tratamentul cu **Fluconazol Slavia**. Întrerupeți

utilizarea **Fluconazol Slavia** și solicitați imediat îngrijiri medicale dacă observați oricare dintre simptomele legate de aceste reacții grave la nivelul pielii descrise la pct. 4.

Fluconazol Slavia împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente.

Informați **imediat** medicul dumneavoastră dacă luați astemizol, terfenadină (medicamente antihistaminice pentru tratamentul alergiilor), cisapridă (un medicament folosit pentru afecțiuni ale stomacului), pimozidă (un medicament folosit pentru afecțiuni mintale), chinidină (un medicament folosit pentru tulburări de ritm cardiac) sau eritromicină (antibiotic folosit pentru tratarea infecțiilor) deoarece aceste medicamente nu trebuie luate împreună cu **Fluconazol Slavia** (vezi secțiunea „Nu luați Fluconazol Slavia”).

Unele medicamente pot interacționa cu **Fluconazol Slavia**. Informați medicul dumneavoastră dacă luați oricare dintre următoarele medicamente:

- rifampicină sau rifabutină (antibiotice folosite pentru tratarea infecțiilor);
- alfentanil, fentanil (utilizate pentru anestezie);
- amitriptilină, nortriptilină (utilizate pentru tratarea depresiei);
- amfotericină B, voriconazol (utilizate pentru tratarea infecțiilor fungice);
- medicamente care fluidifică sângele și previn formarea cheagurilor de sânge (warfarină sau alte medicamente asemănătoare);
- benzodiazepine (midazolam, triazolam sau medicamente asemănătoare) utilizate pentru a vă ajuta să dormiți sau pentru a vă liniști;
- carbamazepină, fenitoină (folosite în tratamentul epilepsiei);
- nifedipină, isradipină, amlodipină, verapamil, felodipină și losartan (pentru tratarea hipertensiunii arteriale – presiune mare a sângelui);
- olaparib (utilizat în tratamentul cancerului de ovar);
- ciclosporină, everolimus, sirolimus sau tacrolimus (folosite la pacienții cu transplant pentru a preveni respingerea acestuia);
- ciclofosamidă, alcaloizi din Vinca (vincristină, vinblastină sau medicamente asemănătoare) utilizate pentru tratamentul cancerului;
- halofantrină (utilizată pentru tratamentul malariei);
- statine (atorvastatină, simvastatină și fluvastatină sau medicamente asemănătoare) utilizate pentru scăderea concentrațiilor mari de colesterol;
- metadonă (utilizată în durere);
- celecoxib, flurbiprofen, naproxen, ibuprofen, lornoxicam, meloxicam, diclofenac (medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS));
- contraceptive orale;
- prednison (medicament steroidian);
- zidovudină, cunoscută și sub denumirea de AZT; saquinavir (utilizate în infecția cu HIV)
- medicamente utilizate pentru tratarea diabetului zaharat, precum clorpropamidă, glibenclamidă, glipizidă sau tolbutamidă;
- teofilină (folosită în tratamentul astmului bronșic);
- tofacitinib (utilizat în tratamentul artritei reumatoide);
- vitamina A (supliment alimentar);
- ivacaftor (utilizat în tratamentul fibrozei chistice);
- amiodaronă (folosită pentru tratarea bătăilor neregulate ale inimii - „aritmii”);
- hidroclorotiazidă (un diuretic);
- ibrutinib (utilizat în tratamentul cancerului de sânge).

Fluconazol Slavia împreună cu alimente și băuturi

Acest medicament poate fi luat cu sau fără alimente.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Nu trebuie să luați **Fluconazol Slavia** dacă sunteți gravidă, credeți că ați putea fi gravidă, încercați să rămâneți gravidă sau alăptați, cu excepția cazului în care medicul dumneavoastră v-a spus să o faceți.

Fluconazolul luat în timpul primului trimestru de sarcină poate crește riscul de avort spontan. Fluconazolul luat în doze reduse în timpul primului trimestru de sarcină poate crește ușor riscul ca un copil să se nască având defecte congenitale care afectează oasele și/sau mușchii. Puteți continua să alăptați după ce ați luat o singură doză de **Fluconazol Slavia**, de 150 mg. Nu trebuie să alăptați dacă luați o doză repetată de **Fluconazol Slavia**.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

În cazul în care conduceți vehicule sau folosiți utilaje trebuie să aveți în vedere faptul că pot apărea ocazional amețeli sau convulsii.

Fluconazol Slavia conține p-hidroxibenzoat de metil (E 218) și p-hidroxibenzoat de propil (E 216)

Pot provoca reacții alergice (chiar întârziate).

Fluconazol Slavia conține Ponceau 4R (E 124) și Sunset Yellow (E 110)

Pot provoca reacții alergice.

3. Cum să luați Fluconazol Slavia

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Înghițiți capsula întregă, împreună cu un pahar cu apă. Se recomandă să luați capsulele în același moment în fiecare zi.

Dozele recomandate ale acestui medicament în diferite tipuri de infecție sunt prezentate mai jos:

Adulți

| Afecțiune | Doză |
|--|---|
| Tratamentul meningitei criptococice | 400 mg în prima zi, apoi 200 până la 400 mg, o dată pe zi, timp de 6 până la 8 săptămâni sau mai mult dacă este necesar. Există cazuri în care dozele pot fi crescute până la 800 mg. |
| Prevenirea recidivei meningitei criptococice | 200 mg, o dată pe zi, până când vi se recomandă întreruperea tratamentului. |
| Tratamentul coccidiomicozelor | 200 până la 400 mg, o dată pe zi, timp de 11 până la 24 de luni sau mai mult dacă este necesar. Există cazuri în care dozele pot fi crescute până la 800 mg. |
| Infecții fungice interne produse de <i>Candida</i> | 800 mg în prima zi, apoi 400 mg, o dată pe zi, până când vi se recomandă întreruperea tratamentului. |

| | |
|--|--|
| Tratamentul infecțiilor la nivelul mucoasei gurii, gâtului și stomatitei datorate protezei dentare | 200 până la 400 mg în prima zi, apoi 100 până la 200 mg, o dată pe zi, până când vi se recomandă întreruperea tratamentului. |
| Tratamentul candidozei mucoaselor – dozele depind de localizarea infecției | 50 până la 400 mg, o dată pe zi, timp de 7 până la 30 de zile, până când vi se recomandă întreruperea tratamentului. |
| Oprirea reparației infecțiilor la nivelul mucoasei gurii, gâtului | 100 până la 200 mg, o dată pe zi, sau 200 mg de 3 ori pe săptămână, cât timp există risc de infectare. |
| Tratamentul candidozei genitale | 150 mg ca doză unică. |
| Reducerea reparației candidozei genitale | 150 mg la fiecare a treia zi, în total 3 doze (ziua 1, 4 și 7) și apoi o dată pe săptămână cât timp există risc de infectare. |
| Tratamentul infecțiilor fungice ale pielii și unghiilor | În funcție de localizarea infecției 50 mg, o dată pe zi, 150 mg, o dată pe săptămână, o doză unică de 300 mg până la 400 mg sau 300 mg, o dată pe săptămână, timp de 2 până la 4 săptămâni (în „piciorul de atlet” tratamentul se poate prelungi până la 6 săptămâni, în infecțiile unghiilor, tratamentul va fi prelungit până când unghia infectată este înlocuită). |
| Prevenirea infecțiilor cu <i>Candida</i> (dacă sistemul imun este deficitar) | 200 până la 400 mg, o dată pe zi, cât timp există risc de infectare. |

Adolescenți cu vârsta cuprinsă între 12 și 17 ani

Respectați doza recomandată de către medicul dumneavoastră (doza recomandată fie pentru adult, fie pentru copil).

Copii cu vârsta mai mică de 11 ani

Doza maximă recomandată copiilor este de 400 mg, o dată pe zi. Doza va fi recomandată funcție de greutatea copilului în kg:

| Afecțiune | Doză zilnică |
|---|---|
| Candidoza mucoaselor și infecții la nivelul gâtului produse de <i>Candida</i> – doza și durata tratamentului depind de severitatea și localizarea infecției | 3 mg/kg corp, o dată pe zi (se pot administra 6 mg/kg corp în prima zi) |
| Meningita criptococică sau infecții fungice interne produse de <i>Candida</i> | 6 mg până la 12 mg/kg corp, o dată pe zi |
| Prevenirea reparației meningitei criptococice | 6 mg/kg corp, o dată pe zi |
| Prevenirea infecției produse de <i>Candida</i> la copii (dacă sistemul imun este deficitar) | 3 mg până la 12 mg/kg corp, o dată pe zi |

Administrarea la copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 4 săptămâni

Administrarea la copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 4 săptămâni:

Se recomandă dozele de mai sus dar administrate la fiecare 2 zile. Doza maximă este 12 mg/kg corp la fiecare 48 de ore.

Administrarea la copii cu vârsta mai mică de 2 săptămâni:

Se recomandă dozele de mai sus dar administrate la fiecare 3 zile. Doza maximă este 12 mg/kg corp la fiecare 72 de ore.

Vârstnici

Dacă nu aveți probleme cu rinichii, se recomandă aceleași doze ca și la adult.

Pacienți cu probleme renale

Medicul dumneavoastră vă poate ajusta doza, în funcție de starea rinichilor.

Dacă luați mai mult Fluconazol Slavia decât trebuie

Dacă luați prea multe capsule odată este posibil să vă simțiți rău. În acest caz, contactați imediat medicul dumneavoastră sau cea mai apropiată unitate medicală. În cazul unui posibil supradozaj, puteți auzi, vedea, simți sau gândi lucruri care nu sunt reale (halucinații și comportament paranoid). Poate fi necesară instituirea unui tratament simptomatic (măsurile de susținere și, dacă este necesar, lavaj gastric).

Dacă uitați să luați Fluconazol Slavia

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Dacă uitați să luați o doză, luați-o imediat ce vă amintiți. Dacă se apropie momentul la care trebuie să luați doza următoare, nu mai luați doza uitată.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Puține persoane pot să manifeste **reacții alergice** la medicament deși reacțiile alergice grave sunt rare. Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

- respirație șuierătoare brusc instalată, respirație dificilă sau senzație de apăsare în piept;
- umflarea pleoapelor, feței sau buzelor;
- mâncărime generalizată, înroșirea pielii sau apariția de pete roșii însoțită de mâncărime;
- erupții cutanate;
- reacții cutanate severe, cum sunt erupțiile care produc vezicule (la nivelul gurii și limbii).

Întrerupeți administrarea **Fluconazol Slavia** și solicitați imediat îngrijiri medicale dacă observați oricare dintre următoarele simptome:

- erupție extinsă trecătoare pe piele, temperatură corporală ridicată și ganglioni limfatici măriți de volum (sindromul DRESS sau sindromul de hipersensibilitate la medicament).

Fluconazol Slavia vă poate afecta ficatul. Simptomele problemelor cu ficatul includ:

- oboseală;
- pierderea poftei de mâncare;
- vărsături;
- îngălbenirea pielii sau a ochilor (icter).

Dacă manifestați unul dintre simptomele de mai sus, **spuneți imediat medicului dumneavoastră.**

Alte reacții adverse:

În plus, dacă vreuna dintre următoarele reacții adverse devine gravă sau dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect, vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Reacții adverse frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane):

- dureri de cap;
- disconfort stomacal, diaree, greață (senzație de rău), vărsături;
- creșterea valorilor la testele sanguine hepatice;
- erupții trecătoare pe piele.

Reacții adverse mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 persoane):

- scăderea numărului de celule roșii din sânge, care poate determina paloare a pielii și slăbiciune sau dificultăți în respirație;
- scăderea poftei de mâncare;
- dificultate în a dormi, somnolență;
- convulsii, amețeli, senzație de învârtire (vertij), furnicături, înțepături sau amorțeală, modificări în perceperea gustului;
- constipație, digestie îngreunată, gaze, gură uscată;
- dureri musculare;
- afectarea funcției ficatului și îngălbenirea pielii și a ochilor (icter);
- papule, vezicule (urticarie), mâncărime, transpirație abundentă;
- oboseală, stare generală de rău, febră.

Reacții adverse rare (pot afecta până la 1 din 1000 persoane):

- scăderea din sânge a numărului de celule albe care luptă împotriva infecțiilor și scăderea din sânge a numărului de celule cu rol în oprirea sângerării;
- modificări ale testelor de laborator (creșterea concentrației de colesterol sau grăsimi);
- scăderea concentrației potasiului din sânge;
- tremurături;
- modificări ale electrocardiografei (EKG), modificări ale frecvenței și ritmului inimii;
- insuficiență hepatică;
- reacții alergice (uneori severe), incluzând erupții veziculare generalizate și exfolierea pielii, reacții cutanate severe, umflarea buzelor sau a feței;
- cădere a părului.

Cu frecvență necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile):

- reacție de hipersensibilizare cu erupție trecătoare pe piele, febră, glande umflate, creșterea unuia dintre tipurile de celule albe din sânge (eozinofilie) și inflamația organelor interne (ficat, plămâni, inimă, rinichi și intestinul gros) (reacție la medicament asociată cu eozinofilie și simptome sistemice (DRESS)).

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România <http://www.anm.ro/>.

Agencia Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1
București 011478- RO
e-mail: adr@anm.ro.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Fluconazol Slavia

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte

informații Ce conține Fluconazol Slavia

- Substanța activă este fluconazolul. Fiecare capsulă conține fluconazol 50 mg, **150 mg**.
- Celelalte componente sunt:

Conținutul capsulei: celuloză microcristalină, talc, stearat de magneziu.

Învelișul capsulei:

- [Capsule 50 mg]:
- **capac:** gelatină, dioxid de titan (E171), Brilliant Blue (E133), Eritrozină (E127), p- hidroxibenzoat de metil (E218), p-hidroxibenzoat de n-propil (E216).
 - **corp:** gelatină, dioxid de titan (E171), Eritrozină (E127), p- hidroxibenzoat de metil (E218), p-hidroxibenzoat de n-propil (E216).

- [Capsule 150 mg]:
- **capac:** gelatină, dioxid de titan (E171), Eritrozină (E127), Brilliant Blue (E133), p- hidroxibenzoat de metil (E218), p-hidroxibenzoat de n-propil (E216).
 - **corp:** gelatină, dioxid de titan (E171), Ponceau 4R (E124), Sunset Yellow (E110), p- hidroxibenzoat de metil (E218), p-hidroxibenzoat de n-propil (E216).

Cum arată Fluconazol Slavia și conținutul ambalajului

Fluconazol Slavia 50 mg capsule prezintă corp roz opac și capac albastru opac.

Fluconazol Slavia 150 mg capsule prezintă corp portocaliu opac și capac albastru opac.

Fluconazol Slavia 50 mg este disponibil sub formă de cutii cu un blister din PVC/Al conținând 7 capsule.

Fluconazol Slavia 150 mg este disponibil sub formă de cutii cu un blister din PVC/Al conținând o capsulă.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

S.C. Slavia Pharm S.R.L.

B-dul Theodor Pallady nr. 44C

cod 032266, București, România

Acest prospect a fost revizuit în Martie 2024.

Alte surse de informații

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România <http://www.anm.ro/>.