

**Prospect: informații pentru utilizator****Naldorex 275 mg comprimate filmate**  
naproxen sodic

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.

**Ce găsiți în acest prospect**

1. Ce este Naldorex și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Naldorex
3. Cum să luați Naldorex
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Naldorex
6. Conținutul ambalajului și alte informații

**1. Ce este Naldorex și pentru ce se utilizează**

Naldorex este un medicament care ameliorează simptomele durerii și inflamației și scade febra. Acesta acționează prin inhibarea formării de prostaglandine.

Naldorex este utilizat pentru tratamentul simptomelor din:

- poliatrită reumatoidă, artroză (artrită degenerativă), spondilită anchilozantă, artrită juvenilă idiopatică
- afecțiuni acute musculoscheletice (cum sunt entorse și deformații, traumatisme directe, dureri lombosacrate, tenosinovite și bursite)
- atac de gută
- dureri periodice lunare (denumite și dureri menstruale sau dismenoree)
- dureri postoperatorii acute și stări inflamatorii (de exemplu după intervenții chirurgicale, extracții dentare).

**2. Ce trebuie să știți înainte să luați Naldorex****Nu luați Naldorex**

- dacă sunteți alergic la naproxen sodic sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament, enumerate la pct. 6;
- dacă ați avut vreodată dificultăți în respirație (astm bronșic), blânde (urticarie) sau inflamația mucoasei nasului (rinită) la administrarea acidului acetilsalicilic și a altor medicamente antiinflamatorii nesteroidiene (AINS, medicamente antireumatice nesteroidiene);
- dacă ați avut sau aveți ulcer al stomacului sau intestinului subțire (ulcer gastro-intestinal) sau alte probleme gastro-intestinale;

- dacă ați avut sângerare sau perforație gastro-intestinală la administrarea AINS.
- dacă ați avut insuficiență severă a ficatului sau insuficiență a rinichilor;
- dacă aveți insuficiență a inimii;
- dacă sunteți gravidă în ultimul trimestru de sarcină.

### **Atenționări și precauții**

Înainte să luați Naldorex, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului

- dacă aveți sau ați avut în trecut sângerare, ulcer sau perforație intestinală, trebuie să fiți monitorizat cu atenție de medicul dumneavoastră; o precauție deosebită este necesară în colita ulceroasă și boala Crohn, deoarece afecțiunea poate reapărea sau se poate agrava. Pot apărea reacții adverse gastro-intestinale grave cu sau fără vreo problemă anterioară; este posibilă sângerarea și perforația intestinală (o gaură în peretele intestinal);
- dacă aveți insuficiență a ficatului sau rinichilor;
- dacă aveți insuficiență a inimii;
- dacă aveți tensiune arterială crescută.

Tratamentul cu Naldorex poate pune probleme în cazul în care vreți să rămâneți gravidă. Trebuie să vă informați medicul dacă doriți să deveniți gravidă sau aveți probleme să rămâneți gravidă.

Utilizarea medicamentelor similare Naldorex poate fi asociată cu o creștere ușoară a riscului atacului de inimă (infarct miocardic) sau accident vascular cerebral. Riscurile sunt mai mari în cazul dozelor mari și tratamentului prelungit. Nu depășiți doza recomandată sau durata tratamentului.

Similar altor medicamente administrate pacienților vârstnici, naproxenul sodic trebuie utilizat în cea mai mică doză ce asigură eficacitate.

### **Naldorex împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente.

Ca rezultat al interacțiunii cu alte medicamente, efectele Naldorex sau ale acestor medicamente pot fi crescute sau scăzute. Acest lucru apare în cazul utilizării concomitente a:

- altor medicamente contra durerii (acid acetilsalicilic și alte medicamente antiinflamatorii nesteroidiene),
- medicamente utilizate pentru prevenirea coagulării sângelui (warfarină),
- medicamente utilizate pentru a preveni formarea cheagurilor de sânge (Aspirină/acid acetilsalicilic),
- medicamente utilizate în tratamentul diabetului zaharat (sulfoniluree),
- medicamente utilizate în tratamentul epilepsiei (derivați de hidantoină),
- medicamente utilizate în tratamentul tensiunii arteriale crescute,
- medicamente care cresc cantitatea de urină eliminată (furosemid),
- medicamente utilizate în tratamentul bolilor psihice (litiu),
- medicamente care determină eliminarea acidului uric din organism și previn atacurile de gută (probenecid),
- medicamente care inhibă sistemul imunitar (ciclosporină),
- medicamente utilizate în tratamentul bolilor maligne (metotrexat),
- medicamente utilizate în tratamentul SIDA (zidovudină)
- medicamente utilizate în tratamentul durerilor și inflamațiilor articulațiilor (corticosteroizi).

### **Naldorex împreună cu alimente și băuturi**

Luăți comprimatele cu o cantitate suficientă de lichid și, de preferat, împreună cu alimente.

### **Sarcina, alăptarea și fertilitatea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Utilizarea naproxenului sodic nu este recomandată în timpul sarcinii. Medicul va determina dacă beneficiul administrării medicamentului la gravidă este mai mare decât riscul posibil asupra fătului.

De aceea, în timpul sarcinii, trebuie să luați acest medicament numai la indicația medicului dumneavoastră.

Nu trebuie să luați acest medicament în ultimul trimestru de sarcină.

În timpul tratamentului cu Naldorex nu este recomandată alăptarea.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Naldorex nu prezintă sau are o influență neglijabilă asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. La utilizarea AINS, pot apare amețeli, somnolență, oboseală și tulburări ale vederii. În cazul apariției acestor reacții adverse, pacienții nu trebuie să conducă sau să folosească utilaje.

### **Naldorex conține sodiu**

Acest medicament conține sodiu 25.00 mg (principalul component din sarea de masă) per comprimat. Acesta este echivalent cu 1,25% din doza maximă zilnică de sodiu recomandată pentru un adult.

## **3. Cum să luați Naldorex**

Luati întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Luati comprimatele cu o cantitate suficientă de lichid și, de preferat, împreună cu alimente.

### Adulți și adolescenți cu vârsta peste 16 ani

Poliartrită reumatoidă, artroză, spondilită anchilozantă

Doza zilnică inițială recomandată este de 550 până la 1100 mg naproxen sodic, divizată în două prize.

Doza de naproxen sodic de menținere poate fi mai mare sau mai mică, în funcție de răspunsul pacientului la tratament. Nu trebuie depășită doza unică de 1100 mg.

Afecțiuni acute musculoscheletice

Doza zilnică inițială recomandată este de 550 mg naproxen sodic, urmată de 550 mg naproxen sodic la interval de 12 ore sau 275 mg naproxen sodic la interval de 6 – 8 ore.

Atac de gută

Doza zilnică inițială recomandată este de 825 mg naproxen sodic, urmată de 275 mg naproxen sodic la interval de 8 ore.

Dureri periodice lunare

Doza zilnică inițială recomandată este de 550 mg naproxen sodic, urmată de 550 mg naproxen sodic la interval de 12 ore sau 275 mg naproxen sodic la interval de 6 – 8 ore, dacă este necesar.

Durere acută postoperatorie

Doza zilnică inițială recomandată este de 550 mg naproxen sodic, urmată de 550 mg naproxen sodic la interval de 12 ore sau 275 mg naproxen sodic la interval de 6 – 8 ore.

Artrită juvenilă idiopatică

La adolescenții cu vârsta de 16 ani și greutatea corporală de 50 kg sau mai mult, doza zilnică inițială recomandată este de 550 până la 825 mg naproxen sodic, divizată în două prize.

### Utilizarea la copii și adolescenți cu vârsta sub 16 ani

Naldorex nu este recomandat la copii și adolescenți cu vârsta sub 16 ani.

### Vârstnici

Naldorex se recomandă a se utiliza în cea mai mică doză eficace.

### Pacienți cu insuficiență renală

Naldorex trebuie administrat cu precauție la pacienții cu insuficiență renală. Doza administrată trebuie redusă. Nu luați Naldorex dacă aveți insuficiență renală severă (vezi „Nu luați Naldorex”).

#### Pacienți cu insuficiență hepatică

Naldorex trebuie administrat cu precauție la pacienții cu insuficiență hepatică. Trebuie utilizată o doză redusă. Nu luați Naldorex dacă aveți insuficiență hepatică severă (vezi „Nu luați Naldorex”).

Dacă aveți impresia că efectul Naldorex este prea puternic sau prea slab, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

#### **Dacă luați mai mult Naldorex decât trebuie**

Supradozajul poate determina durere abdominală, greață, vărsături, amețeli, sunete în urechi, iritabilitate și, în cazuri mai severe, vărsături cu sânge (hematemeză), sânge în scaun (melenă), tulburări ale conștienței, tulburări ale respirației, convulsii și insuficiență a rinichilor.

În cazul unei supradoze, medicul va lua măsurile adecvate de tratament.

#### **Dacă uitați să luați Naldorex**

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Luați medicamentul aproximativ în aceeași perioadă a zilei. Dacă uitați să luați medicamentul la ora stabilită, luați-l atunci când vă amintiți.

#### **Dacă încetați să luați Naldorex**

Dacă luați naproxen sodic pentru scurt timp, pentru ameliorarea durerii, puteți întrerupe tratamentul în siguranță atunci când nu mai aveți nevoie. Dacă vi s-a prescris un tratament pentru o perioadă îndelungată, înainte de a întrerupe tratamentul, adresați-vă medicului dumneavoastră.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

## **4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Întrerupeți imediat administrarea Naldorex și adresați-vă medicului dacă apare una dintre afecțiunile următoare, care pot fi semne posibile de reacții adverse severe:

- tulburări severe ale stomacului, arsuri și durere abdominală
- vărsături cu sânge sau cu aspect în zaț de cafea
- scaune de culoare neagră sau sânge în urină
- reacții ale pielii, cum sunt erupțiile cu mâncărime
- dificultăți în respirație și/sau umflături ale feței sau gâtului
- oboseală asociată cu pierderea poftei de mâncare
- durere în gât, asociată cu ulcere ale gurii, oboseală și febră
- sângerări ale nasului, sângerări ale pielii
- oboseală anormală, combinată cu scăderea cantității de urină
- umflături ale feței, picioarelor sau labei piciorului
- dureri în piept
- tulburări ale conștienței.

Apariția reacțiilor adverse este de obicei asociată cu utilizarea unor doze mari de medicament.

*Frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane):*

- constipație, durere abdominală, greață, dispepsie, diaree, stomatită,
- durere de cap, vertij, amețeli, somnolență,

- mâncărimi, erupție trecătoare pe piele, sângerare în piele sau mucoase (echimoze), puncte și pete mici, roșiatice pe piele, determinate de sângerări minore în sau sub piele (purpură),
- sunete în urechi (tinitus), tulburări ale auzului,
- tulburări ale vederii,
- edeme, bătăi frecvente și puternice ale inimii (palpitații),
- sete, transpirații,
- dificultăți ale respirației (dispnee).

*Mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 persoane):*

- sângerare gastro-intestinală și/sau perforație a stomacului, vărsături cu sânge din stomac sau esofag (hematemeză), sânge în scaun (melenă), vărsături,
- modificări ale valorilor concentrațiilor în sânge ale enzimelor ficatului, icter,
- depresie, vise anormale, imposibilitate de concentrare, insomnie, stare de rău,
- durere musculară și slăbiciune musculară,
- căderea părului (alopecie), dermatită fotosensibilă,
- tulburări ale auzului,
- insuficiență cardiacă congestivă (medicamentele similare Naldorex pot fi asociate cu creșterea ușoară a riscului de atac de inimă (infarct miocardic) sau accident vascular cerebral),
- reacții de hipersensibilitate,
- pirexie – tremurături și febră,
- tulburări ale menstruației,
- tulburări ale funcției rinichilor (nefrită glomerulară, hematurie, nefrită interstițială, sindrom nefrotic, insuficiență renală, necroză a papilelor renale),
- modificări ale numărului unor celule din sânge (eozonofilie, granulocitopenie, leucopenie, trombocitopenie),
- pneumonie (pneumonie eozinofilică).

Reacții adverse a căror relație cauzală cu naproxenul sodic este necunoscută:

- modificări ale numărului unor celule din sânge (anemie aplastică, anemie hemolitică),
- inflamarea învelișului sistemului nervos central (meningită aseptică), tulburări psihice (cognitive),
- reacții de hipersensibilitate a pielii (necroliză epidermică, eritem polimorf, reacții de fotosensibilitate similare cu porfiriya cutanată tardivă și epidermoliza buloasă, sindrom Stevens-Johnson, urticarie),
- inflamarea mucoasei gurii (stomatită ulceroasă),
- inflamarea vaselor de sânge (vasculită),
- reacții de hipersensibilitate (angioedem), creșterea cantității de zahăr din sânge (hiperglicemie), scăderea cantității de zahăr din sânge (hipoglicemie).

### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct la Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

Bucuresti 011478- RO

e-mail: [adr@anm.ro](mailto:adr@anm.ro)

Website: [www.anm.ro](http://www.anm.ro)

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

## **5. Cum se păstrează Naldorex**

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Păstrați blisterul în cutie, pentru a fi protejat de lumină.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

## **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

### **Ce conține Naldorex**

- Substanța activă este naproxenul sodic. Fiecare comprimat filmat conține naproxen sodic 275 mg, care este echivalent cu naproxen 250 mg. Celelalte componente sunt: povidonă K30, celuloză microcristalină (E460), talc (E553b) și stearat de magneziu (E470b) în nucleul comprimatului și hipromeloză (E464), dioxid de titan (E171), macrogol și indigotină (E132) în filmul comprimatului.

### **Cum arată Naldorex și conținutul ambalajului**

Comprimate filmate ovale, ușor biconvexe, de culoare albastru deschis.

Comprimatele filmate sunt disponibile în cutii cu 10, 20, 30, 40 și 60 comprimate în blistere.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

### **Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul**

KRKA, d.d., Novo mesto  
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto  
Slovenia

**Acest medicament este autorizat în Statele Membre ale Spațiului Economic European sub următoarele denumiri comerciale:**

<b>Numele Statului Membru</b>	<b>Denumirea comercială a medicamentului</b>
Portugalia	Naproxeno Krka
Ungaria, Letonia, Polonia	Nalgesin
România	Naldorex
Austria	Naproxen Krka

**Acest prospect a fost revizuit în martie 2023.**

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România <http://www.anm.ro>