

**REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Paracetamol Rapid Teva 500 mg, comprimat filmat

**2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ**

Un comprimat filmat conține paracetamol 500 mg.

**Excipienti cu efect cunoscut:**

Un comprimat filmat conține 12 µg de glucoză și sorbitol.

Pentru lista tuturor excipientilor, vezi pct. 6.1.

**3. FORMA FARMACEUTICĂ**

Comprimat filmat

Comprimat biconvex oval, de culoare albă sau aproape albă, cu linie mediană pe o față și neted pe cealaltă față. Comprimatul are o dimensiune aproximativă de 7,9 x 17,1 mm și o grosime de aproximativ 5,0-6,5 mm.

Comprimatul poate fi divizat în doze egale.

**4. DATE CLINICE****4.1 Indicații terapeutice**

Tratamentul simptomatic al durerilor și/sau al febrei ușoare și moderate.

Paracetamol Rapid Teva este indicat la adulți, adolescenți și copii cu vârstă de minimum 6 ani.

**4.2 Doze și mod de administrare****Doze**

Dozele se administrează conform informațiilor din tabelul de mai jos.

Doza depinde de vârstă și masă corporală; în general, doza unică este de 10 – 15 mg/kg masă corporală până la o doză zilnică totală de maximum 60 mg/kg masă corporală.

În fiecare caz, intervalul de dozare depinde de simptome și de doza zilnică totală maximă. Între doze trebuie să existe un interval de cel puțin 4 ore.

Pentru copiii cu vârstă sub 6 ani există forme farmaceutice mai potrivite.

Dacă simptomele persistă după 3 zile de tratament, este necesar să se consulte medicul.

Masă corporală (vârstă)	Doză unică (doză echivalentă de	Doză zilnică maximă (24 ore) (doză echivalentă de	Interval minim
-------------------------	---------------------------------	---	----------------

	<b>paracetamol) (număr de comprimate)</b>	<b>paracetamol) (număr de comprimate/doze)</b>	<b>între doze</b>
22 kg - 30 kg (copii cu vârstă de aproximativ 6 - 9 ani)	250 mg (jumătate de comprimat)	1000 – 1500 mg (maximum 2-3 comprimate/4-6 doze)	4 - 6 ore
30 kg- 40 kg (copii cu vârstă de aproximativ 9 - 12 ani)	500 mg (1 comprimat)	1500 - 2000 (maximum 3-4 comprimate/doze)	4 - 6 ore
40 kg - 55 kg (copii cu vârstă de aproximativ 12 - 15 ani)	500 mg (1 comprimat)	2000 – 3000 mg (maximum 4-6 comprimate/doze)	4 - 6 ore
> 55 kg (adulți și adolescenți cu vârstă de minimum 15 ani)	500 – 1000 mg (1-2 comprimate)	3000 mg (maximum 6 comprimate/3-6 doze)	4 - 6 ore

Doza zilnică maximă (24 de ore) indicată în tabel nu trebuie depășită sub nicio formă.

Se va utiliza cea mai mică doză necesară pentru a obține eficacitatea terapeutică.

Durata maximă de utilizare continuă fără recomandare medicală: 3 zile.

#### Pacienți vârstnici

Nu este necesară ajustarea dozei la vârstnici. Cu toate acestea, trebuie să se aibă în vedere că insuficiența renală și/sau hepatică sunt mai frecvente la vârstnici (vezi pct. 4.4).

#### Insuficiență renală

Paracetamolul trebuie utilizat cu precauție în prezența insuficienței renale și se recomandă un interval mai mare între doze în cazul insuficienței renale severe. În cazul în care clearance-ul creatininei este de 10-50 ml/minut, intervalul minim între administrări trebuie să fie de 6 ore. În cazul în care clearance-ul creatininei este sub 10 ml/minut, intervalul minim între două administrări trebuie să fie de 8 ore.

#### Insuficiență hepatică

Paracetamolul trebuie utilizat cu precauție în prezența insuficienței hepatice sau a sindromului Gilbert. Doza trebuie redusă sau intervalul de administrare trebuie prelungit.

Nu se va depăși o doză zilnică de 2000 mg la adulți fără recomandarea medicului.

În absența recomandării medicului, nu trebuie să se depășească o doză zilnică maximă de 60 mg/kg masă corporală (până la maximum 2000 mg/zi) în caz de:

- Masă corporală sub 50 kg
- Insuficiență hepatică
- Sindrom Gilbert (icter familial nefemolitic)
- Abuz cronic de alcool etilic
- Deshidratare
- Malnutriție cronică

Consumul cronic de alcool poate reduce pragul de toxicitate a paracetamolului. La acești pacienți, intervalul de timp dintre două doze trebuie să fie de minimum 8 ore.

#### Mod de administrare

Pentru administrare orală. Comprimatul trebuie înghițit cu un pahar de apă.

#### **4.3 Contraindicații**

Hipersensibilitate la substanța activă paracetamol sau la oricare dintre excipientii menționați la punctul 6.1.

#### **4.4 Atenționări și precauții speciale pentru utilizare**

Pentru a evita riscul de supradozaj, trebuie să se asigure că medicațiile administrate concomitent nu conțin paracetamol.

În următoarele cazuri, paracetamolul trebuie utilizat cu precauție deosebită, mai exact creșterea intervalului de administrare sau reducerea dozei (vezi pct. 4.2) și sub supraveghere medicală:

- Insuficiență hepatocelulară (scor Child-Pugh < 9)
- Abuz cronic de alcool etilic
- Insuficiență renală (clearance-ul creatininei < 10 ml/minut)
- Sindrom Gilbert (boala Meulengracht)
- Suferiți de o infecție severă, iar acest lucru poate crește riscul de acidoză metabolică. Semnele acidozei metabolice includ:
  - respirație profundă, rapidă, dificilă,
  - senzație de rău (greață), stare de rău (vârsături)
  - lipsa poftei de mâncare
- Hepatită acută
- Tratament concomitent cu medicamente care afectează funcția hepatică
- Deficit de glucozo-6-fosfat dehidrogenază
- Deficit de glutation
- Anemie hemolitică
- Deshidratare
- Malnutriție cronică
- Vârstnici

Precauții suplimentare (vezi pct. 4.2)

Nu este încurajată utilizarea prelungită sau frecventă. Pacienții trebuie informați să nu ia concomitent alte produse care conțin paracetamol. Administrarea dozelor zilnice multiple într-o singură ingerare poate afecta sever starea ficatului; în astfel de cazuri, nu survine pierderea cunoștinței.

Însă, în cazul supradozajului, chiar dacă pacientul se simte bine, trebuie solicitată imediat asistență medicală, deoarece există riscul de leziuni hepatice ireversibile (vezi pct. 4.9).

Utilizarea prelungită fără supraveghere medicală poate fi dăunătoare. La copii și adolescenți tratați cu 60 mg/kg pe zi de paracetamol, nu se justifică asocierea cu un alt antipiretic, exceptând cazul când nu este eficient tratamentul.

Nu trebuie consumat alcool pe durata tratamentului cu paracetamol.

Riscurile supradozajului sunt mai mari la persoanele cu boală hepatică alcoolică necrotică. Se recomandă precauție în cazurile de alcoholism cronic. La pacienții cu abuz de alcool, doza trebuie redusă (vezi pct. 4.2). În astfel de cazuri, doza zilnică nu trebuie să depășească 2 g.

S-au raportat cazuri de hepatotoxicitate indusă de paracetamol, inclusiv cazuri letale, la pacienții care iau paracetamol în doze din intervalul terapeutic.

Aceste cazuri au fost raportate la pacienți cu unu sau mai mulți factori de risc de hepatotoxicitate, inclusiv masa corporală mică (< 50 kg), insuficiență renală și hepatică, alcoholismul cronic, administrarea concomitentă a medicamentelor hepatotoxicice și malnutriția acută și cronică (rezerve mici de glutation hepatic). Paracetamolul trebuie administrat cu precauție la pacienții cu acești factori de risc. De asemenea, se recomandă prudență la pacienții aflați în tratament concomitent cu medicamente care induc enzimele hepatice și în afecțiuni care pot predispune la deficit de glutation (vezi pct. 4.2 și 4.9). Dozele de paracetamol trebuie revizuite la intervale adecvate din punct de vedere

clinic, iar pacienții trebuie monitorizați pentru apariția de noi factori de risc pentru hepatotoxicitate care ar putea justifica ajustarea dozei.

Pacienții cu o stare de nutriție alterată cauzată de abuzul de alcool, anorexie sau alimentație inadecvată sunt sfătuți să nu utilizeze pe intervale prelungite și să nu ia doze maxime din cauza riscului de reacții de toxicitate hepatică.

În caz de febră mare, semne de infecție secundară sau dacă simptomele persistă mai mult de 3 zile, trebuie consultat medicul.

În absența sfatului medicului sau al stomatologului, medicamentele care conțin paracetamol trebuie utilizate în general doar câteva zile și nu în doze mari.

În cazul utilizării incorecte prelungite, în doze mari, de analgezice, pot apărea dureri de cap care nu trebuie tratate cu doze crescute de medicament.

În general, consumul obișnuit de analgezice, în special în combinație cu mai multe substanțe analgezice, poate duce la leziuni renale permanente cu risc de insuficiență renală (nephropatie analgezică).

Durerile de cap, precum și oboseala, durerile musculare, nervozitatea și simptomele autonome, pot apărea la intreruperea bruscă a tratamentului după o utilizare incorectă, prelungită, în doze mari a analgezicelor. Simptomele de intrerupere se remit în câteva zile. Până la acel moment, aportul suplimentar de analgezice trebuie evitat și nu trebuie reluat fără sfatul medicului.

Se recomandă precauție când paracetamolul este administrat împreună cu flucloxacilină, deoarece există un risc ușor crescut de acidoză metabolică cu gaură anionică mare (HAGMA). Pacienții cu risc crescut de HAGMA includ pacienții cu insuficiență renală severă, sepsis sau malnutriție, mai ales dacă se utilizează dozele zilnice maxime de paracetamol.

După utilizarea concomitentă a paracetamolului și flucloxacilinelui, se recomandă monitorizarea atentă, inclusiv controlul 5-oxoprolinei în urină, pentru a detecta apariția tulburărilor acido-bazice, și anume HAGMA.

#### Paracetamol Rapid Teva conține zahăr:

Pacienții cu afecțiuni ereditare rare de malabsorbție la glucoză-galactoză nu trebuie să ia acest medicament.

#### Paracetamol Rapid Teva conține sorbitol:

Efectul aditiv al produselor administrate concomitent care conțin sorbitol (sau fructoză) și aportul nutrițional de sorbitol (fructoză) trebuie luate în considerare. Conținutul de sorbitol al medicamentelor de uz oral poate afecta biodisponibilitatea altor medicamente de uz oral administrate concomitent.

## **4.5 Interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiune**

- Administrarea probenecidului inhibă legarea paracetamolului la acid glucuronic, conducând la reducerea clearance-ului paracetamolului cu un factor de aproximativ 2. Dacă se ia concomitent probenecid, trebuie redusă doza de paracetamol.
- Se recomandă precauție când se administrează concomitent medicamente care induc enzimele, precum și substanțe cu potențial de toxicitate hepatică (vezi pct. 4.9). Metabolizarea paracetamolului este crescută la pacienții care iau medicamente inductoare de enzime, de exemplu fenitoină, carbamazepină, fenobarbital, primidonă și rifampicină. Rapoarte izolate descriu hepatotoxicitate neașteptată la pacienții care iau medicamente inductoare de enzime.
- În utilizarea concomitentă de paracetamol și AZT (zidovudină), susceptibilitatea la dezvoltarea neutropeniei și a hepatotoxicității este crescută. Utilizarea pe termen lung/a dozelor multiple de paracetamol la pacienții aflați în tratament cu zidovudină trebuie evitată și administrarea se va face numai la recomandarea medicului. Cu toate acestea, dacă este necesară administrarea paracetamolului

și a zidovudinei pe termen lung, hemoleucograma și testele funcției hepatice trebuie monitorizate în special la pacienții malnutriți.

- La administrarea concomitentă a substanțelor care încetinesc golirea gastrică, absorbția și debutul acțiunii paracetamolului ar putea fi întârziate.
- Administrarea concomitentă a substanțelor care accelerează golirea gastrică, de exemplu, metoclopramid și domperidonă, grăbește absorbția și debutul acțiunii paracetamolului.
- Colestiramina reduce absorbția paracetamolului. Când este necesară utilizarea concomitentă de paracetamol și colestiramină, paracetamolul trebuie luat cu cel puțin 1 oră înainte sau 4 ore după administrarea colestiraminei.
- Efectul anticoagulant al warfarinei și al altor cumarine poate fi potențiat de utilizarea regulată prelungită a paracetamolului, ducând la creșterea riscului de apariție a sângeărărilor; dozele ocazionale nu au efect semnificativ.
- Se recomandă precauție când utilizați paracetamol și flucloxacilină în același timp, deoarece administrarea simultană este asociată cu risc ușor crescut de acidoză metabolică cu gaură anionică, în special la pacienții cu factori de risc (vezi pct. 4.4).
- Antagoniști ai vitaminei K: poate surveni o intensificare a efectului antagoniștilor vitaminei K, în special la consumul regulat de doze mari de paracetamol. În acest caz, se recomandă o verificare regulată a raportului internațional normalizat (INR).
- Lamotrigină: paracetamolul poate scădea biodisponibilitatea lamotriginei, cu o posibilă reducere a efectelor acesteia, ca urmare a posibilei induceri a metabolizării acesteia în ficat.

#### *Efecte asupra rezultatelor la teste de laborator*

Administrarea paracetamolului poate influența testele de acid uric care utilizează acid fosfotungstic și testele de glicemie care utilizează glucoză oxidază-peroxidază.

#### **4.6 Fertilitatea, sarcina și alăptarea**

##### Sarcina

Un volum mare de date referitoare la femeile însărcinate nu indică nici toxicitate malformativă, nici toxicitate feto/neonatală.

Studiile epidemiologice asupra neurodezvoltării la copiii expuși la paracetamol în utero arată rezultate neconcluente. Dacă este necesar din punct de vedere clinic, paracetamolul poate fi utilizat în timpul sarcinii, cu toate acestea trebuie utilizat la cea mai mică doză eficientă pentru cel mai scurt timp posibil și la cea mai mică frecvență posibilă.

##### Alăptarea

Paracetamolul este excretat în laptele uman, dar nu într-o cantitate semnificativă clinic la dozele recomandate. Datele publicate disponibile nu precizează contraindicații la alăptare.

##### Fertilitatea

Nu sunt disponibile date clinice adecvate privind fertilitatea la bărbați sau femei.

#### **4.7 Efecte asupra capacitatei de a conduce vehicule și de a folosi utilaje**

Paracetamol Rapid Teva nu are nicio influență sau are influență neglijabilă asupra capacitatei de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

#### **4.8 Reacții adverse**

Reacțiile adverse sunt prezentate mai jos în funcție de clasificarea pe aparate, sisteme și organe și de frecvență. Frecvența este definită după cum urmează: *Foarte frecvente* ( $\geq 1/10$ ); *frecvente* ( $\geq 1/100$  și  $< 1/10$ ); *mai puțin frecvente* ( $\geq 1/1000$  și  $< 1/100$ ); *rare* ( $\geq 1/10000$  și  $< 1/1000$ ); *foarte rare* ( $< 1/10000$ ); *cu frecvență necunoscută* (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

Baza de date a clasificării pe aparate, sisteme și organe	Reacții adverse și frecvență
---	------------------------------

Tulburări hematologice și limfatiche	<i>Foarte rare:</i> trombocitopenie, leucopenie, pancitopenie, neutropenie, anemie hemolitică, agranulocitoză <i>Cu frecvență necunoscută:</i> anemie
Tulburări ale sistemului imunitar	<i>Foarte rare:</i> şoc anafilactic (impune întreruperea tratamentului), reacții de hipersensibilitate cutanată inclusiv, printre altele, erupție cutanată tranzitorie Au fost raportate cazuri foarte rare de reacții cutanate grave (sindrom Stevens-Johnson (SJS) induc medicamentos, necroliză epidermică toxică (TEN) și pustuloză exantematoasă generalizată acută (AGEP))
Tulburări respiratorii, toracice și mediastinale	<i>Foarte rare:</i> bronhospasm la pacienții sensibili la aspirină și alte AINS
Tulburări hepatobiliare	<i>Foarte rare:</i> toxicitate hepatică <i>Rare:</i> creșterea transaminazelor hepatice, disfuncție hepatică, insuficiență hepatică, necroza hepatică, icter <i>Cu frecvență necunoscută:</i> hepatită
Afecțiuni cutanate și ale țesutului subcutanat	<i>Rare:</i> prurit, erupții tranzitorii, transpirație, angioedem, urticarie <i>Cu frecvență necunoscută:</i> exantem
Tulburări ale sistemului nervos	<i>Rare:</i> cefalee
Tulburări gastrointestinale	<i>Rare:</i> durere abdominală, diaree, greață, vărsături și constipație
Tulburări renale și ale căilor urinare	<i>Foarte rare:</i> piurie sterilă (urină închisă la culoare) <i>Cu frecvență necunoscută:</i> nefropatii (nefrită intersticială, necroza tubulară) după utilizarea prelungită a dozelor mari
Tulburări generale	<i>Rare:</i> ameteală, stare generală de rău
Leziuni, intoxicații și complicații	<i>Rare:</i> supradozaj și intoxicație

#### Raportarea reacțiilor adverse suspectate

Raportarea reacțiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniștii din domeniul sănătății sunt rugați să raporteze orice reacție adversă suspectată prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

<http://www.anm.ro>.

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478- RO

e-mail: [adr@anm.ro](mailto:adr@anm.ro)

Website: [www.anm.ro](http://www.anm.ro)

#### **4.9 Supradozaj**

Supradozajul cu paracetamol poate provoca insuficiență hepatică care poate necesita transplant hepatic sau poate duce la deces.

Există riscul de intoxicație cu paracetamol în special la vârstnici, copii mici, pacienți cu afecțiuni hepatice, cazuri de alcoolism cronic și la pacienții cu malnutriție cronică, la pacienții care folosesc substanțe inductoare de enzime și la adulții cu greutatea sub 50 kg. Supradozajul poate fi letal în aceste cazuri.

Simptomele apar, în general, în primele 24 de ore și pot include: greață, vărsături, anorexie, paloare și dureri abdominale sau pacienții pot fi asimptomatici.

Supradozajul de paracetamol într-o singură administrare la adulți sau la copii poate determina necroza hepatică susceptibilă de a induce necroza completă și ireversibilă, care conduce la insuficiență hepatocelulară, acidoză metabolică și encefalopatie care poate cauza comă și deces. În același timp, se observă niveluri crescute ale transaminazelor hepatice (AST, ALT), lactat dehidrogenazei și bilirubinei împreună cu niveluri crescute de protrombină care pot apărea la 12 până la 48 de ore după administrare. Leziunile hepatice pot să apară la adulții care au depășit cantitățile de paracetamol recomandate. Datele arată că excesul de metabolit toxic (de obicei, detoxificat adecvat de glutation când sunt ingerate doze normale de paracetamol), se leagă ireversibil de țesutul hepatic.

Unii pacienți pot prezenta un risc crescut de afectare a făcătului din cauza toxicității paracetamolului.

Se poate dezvolta și insuficiență renală acută cu necroza tubulară acută.

De asemenea, au fost raportate aritmii cardiace și pancreatită.

Factorii de risc includ: Dacă pacientul:

- ia tratament de lungă durată cu carbamazepină, fenobarbitonă, fenitoină, primidonă, rifampicină, sunătoare sau alte medicamente care induc enzime hepatice
- consumă regulat alcool etilic în exces față de cantitățile recomandate
- prezintă risc de a avea deficit de glutation, de exemplu tulburări de alimentație, fibroză chistică, infecție cu HIV, infometare, cașexie

Factorii de risc menționați mai sus pot scădea pragul de toxicitate hepatică.

Procedură în situații de urgență:

Tratamentul imediat este esențial în gestionarea supradozajului cu paracetamol. Pacienții trebuie transferați de urgență la spital pentru asistență medicală imediată.

Administrarea cărbunelui activat trebuie luată în considerare dacă >150 mg/kg paracetamol a fost luat în mai puțin de 1 oră.

Concentrația plasmatică de paracetamol trebuie măsurată la 4 ore sau mai târziu după ingerare în cazul supradozajului acut unic. Este necesar să se preleveze probe de sânge pentru a determina concentrația plasmatică inițială de paracetamol.

Tratamentul cu N-acetilcisteină trebuie administrat cât mai curând posibil, în conformitate cu ghidurile naționale de tratament.

Trebuie implementat un tratament simptomatic.

## 5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

### 5.1 Proprietăți farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Analgezice; alte analgezice și antipiretice; anilide, codul ATC: N02BE01

Paracetamolul are acțiuni analgezice și antipiretice. Mecanismul de acțiune analgezic și antipiretic al paracetamolului nu a fost clar elucidat. Este probabilă o acțiune centrală și periferică. Inhibarea marcată a sintezei prostaglandinelor cerebrale a fost demonstrată, în timp ce sinteza periferică a prostaglandinelor este doar slab inhibată. Mai mult, paracetamolul inhibă efectul pirogenilor endogeni asupra reglării temperaturii hipotalamice.

### 5.2 Proprietăți farmacocinetice

Paracetamolul este absorbit rapid și în proporție aproape totală din tractul gastrointestinal.

Datele de farmacocinetica la om demonstrează că absorbția timpurie a paracetamolului (fracția de doză în primele 60 de minute) este cu 32% mai mare la Paracetamol Rapid Teva comparativ cu un comprimat standard de paracetamol ( $p<0,0001$ ) și o variabilitate mai mică între subiecți și la subiecți ( $p<0,0001$ ) în ceea ce privește absorbția timpurie a paracetamolului din Paracetamol Teva comparativ cu un comprimat standard de paracetamol.

Datele de farmacocinetica la om demonstrează că valoarea maximă a concentrației plasmaticice de paracetamol este atinsă cu cel puțin 25% mai repede pentru Paracetamol Rapid Teva, comparativ cu comprimatele standard de paracetamol, pe stomacul gol și după ingerarea de alimente ( $p<0,01$ ). Concentrația în plasmă atinge un vârf în 25 de minute.

Gradul total de absorbție a paracetamolului din Paracetamol Rapid Teva este echivalent cu cel al comprimatelor standard de paracetamol.

Într-un studiu BV s-au obținut următoarele rezultate în urma comparării cu produsul de referință Panadol comprimate filmate. \*Număr studiu: BE-1967-19):

Parametrii farmacocinetici	Produs de referință (R)			Produs testat (T)		
	Medie aritmetică	Abatere standard	CV (%)	Medie aritmetică	Abatere standard	CV (%)
*Tmax (h)	0,68	0,25-2,25		0,42	0,22-1,33	

\*mediană și interval raportate

Datele de scintigrafie la om demonstrează că Paracetamol Rapid Teva începe în general să se descompună la 5 minute după administrare. Datele farmacocinetice la om demonstrează că paracetamolul poate fi detectat în general în plasmă după 10 minute.

Legarea la proteinele plasmatici este variabilă. Timpul de înjumătățire plasmatică este de 1-4 ore. Concentrația plasmatică maximă a paracetamolului este atinsă mai repede pentru Paracetamol Rapid Teva comparativ cu un comprimat standard de paracetamol pe stomacul gol și după ingerarea de alimente ( $p < 0,01$ ).

Paracetamolul este distribuit relativ uniform în majoritatea fluidelor corporale.

Excreția este aproape exclusiv renală, sub formă de metaboliți conjugați.

### 5.3 Date preclinice de siguranță

Studiile ample nu au evidențiat dovezi de risc genotoxic relevant pentru paracetamol în intervalul de doze terapeutice, adică netoxic.

Studiile pe termen lung efectuate la şobolan și şoarece nu indică efecte tumorigene relevante la doze non-hepatotoxice de paracetamol.

Nu sunt disponibile studii convenționale care utilizează standardele acceptate în prezent pentru evaluarea toxicității asupra reproducерii și dezvoltării.

## 6. PROPRIETĂȚI FARMACEUTICE

### 6.1 Lista excipientilor

Nucleu:

Amidon, pregelatinizat (porumb)

Carbonat de calciu  
Povidonă (K-25)  
Crosppovidonă (tip B)  
Acid alginic  
Siliciu coloidal anhidru  
Stearat de magneziu

Film:

Hipromeloza  
Polidextroză (conține sorbitol și glucoză)  
Trigliceride cu lanț mediu  
Macrogol 3350  
Carbonat de calciu  
Lecitină din floarea soarelui deuleiată (E322)  
Macrogol 400

## **6.2 Incompatibilități**

Nu este cazul.

## **6.3 Perioada de valabilitate**

30 de luni.

## **6.4 Precauții speciale pentru păstrare**

Nu este necesar ca acest produs să fie păstrat în condiții speciale.

## **6.5 Natura și conținutul ambalajului**

Blistere din PVC-PVdC/Al și blister din OPA-Al-PVC/Al.  
Mărimi de ambalaje: 10 comprimate filmate.

Este posibil ca nu toate mărurile de ambalaj să fie comercializate.

## **6.6 Precauții speciale pentru eliminarea reziduurilor**

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

## **7. DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Teva Pharmaceuticals S.R.L.  
Str. Domnița Ruxandra nr.12, parter, sector 2, București  
România  
Telefon: 021 230 65 24

## **8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

14298/2022/01-02

## **9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI**

Data primei autorizări: Februarie 2022

**10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI**

Februarie 2022