

## REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

### 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă

### 2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

1 ml soluție injectabilă conține bortezomib 2,5 mg (sub formă de bortezomib manitol ester).

Fiecare flacon cu 1 ml soluție injectabilă conține 2,5 mg bortezomib (sub formă de bortezomib manitol ester).

Fiecare flacon cu 1,4 ml soluție injectabilă conține 3,5 mg bortezomib (sub formă de bortezomib manitol ester).

Pentru administrare subcutanată nu este necesară diluția.

1 ml soluție pentru administrare subcutanată conține bortezomib 2,5 mg.

Pentru administrare intravenoasă este necesară diluția.

După diluție, 1 ml soluție pentru administrare intravenoasă conține bortezomib 1 mg.

Pentru lista tuturor excipienților, vezi pct. 6.1.

### 3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluție injectabilă.

Soluție limpede, incoloră până la galben deschis cu un pH între 4,0 – 5,5.

### 4. DATE CLINICE

#### 4.1 Indicații terapeutice

Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă administrat în monoterapie sau în asociere cu doxorubicină lipozomală pegilată sau dexametazonă este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu progresiv la care s-a administrat anterior cel puțin un tratament și la care s-a efectuat un transplant de celule stem hematopoietice sau nu au indicație pentru un astfel de transplant.

Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă în asociere cu melfalan și prednison este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu netratați anterior, care nu sunt eligibili pentru chimioterapie în doze mari asociată cu transplant de celule stem hematopoietice.

Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă în asociere cu dexametazonă sau cu dexametazonă și talidomidă este indicat pentru inițierea tratamentului la pacienții adulți cu mielom

multiplu netratați anterior, care sunt eligibili pentru chimioterapie în doze mari asociată cu transplant de celule stem hematopoietice.

Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă în asociere cu rituximab, ciclofosamidă, doxorubicină și prednison este indicat în tratamentul pacienților adulți cu limfom cu celule de manta, netratați anterior și care nu sunt eligibili pentru transplant de celule stem hematopoietice.

#### 4.2 Doze și mod de administrare

Tratamentul cu Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă trebuie inițiat și administrat sub supravegherea unui medic specialist și cu experiență în utilizarea medicamentelor chimioterapice. Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă trebuie reconstituit de un profesionist în domeniul sănătății (vezi pct. 6.6).

#### Doze pentru tratamentul mielomului multiplu progresiv (pacienți tratați cu cel puțin o terapie anterioară)

##### *Monoterapie*

Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă se administrează prin injectare subcutanată sau - după diluare – prin injectare intravenoasă în doza recomandată de 1,3 mg/m<sup>2</sup> suprafață corporală, de două ori pe săptămână, timp de două săptămâni în zilele 1, 4, 8 și 11, ca parte a unui ciclu de tratament cu durata de 21 de zile. Această perioadă de 3 săptămâni este considerată un ciclu de tratament. Se recomandă ca la pacienți să se administreze 2 cicluri terapeutice de Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă după confirmarea unui răspuns complet. De asemenea, se recomandă ca la pacienții care răspund la tratament, dar la care nu se obține o remisiune completă, să se administreze un total de 8 cicluri terapeutice cu Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă. Între administrarea dozelor consecutive de Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă trebuie păstrat un interval de timp de cel puțin 72 ore.

##### *Ajustări ale dozei în timpul tratamentului și reinițierea tratamentului pentru monoterapie*

Tratamentul cu Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă trebuie întrerupt la apariția oricărui efect toxic non-hematologic de Gradul 3 sau hematologic de Gradul 4, excluzând neuropatia, după cum este prezentat mai jos (vezi și pct. 4.4). Imediat după remiterea simptomelor de toxicitate, tratamentul cu Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă poate fi reinițiat cu o doză scăzută cu 25% (de la 1,3 mg/m<sup>2</sup>, scăzută la 1,0 mg/m<sup>2</sup>; de la 1,0 mg/m<sup>2</sup>, scăzută la 0,7 mg/m<sup>2</sup>). Dacă efectele toxice nu se remit sau dacă reapar la cea mai mică doză, trebuie luată în considerare întreruperea tratamentului cu Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă, cu excepția cazului în care beneficiul tratamentului depășește clar riscul.

##### *Durerea neuropată și/sau neuropatia periferică*

Pacienții cu durere neuropată și/sau neuropatie periferică determinată de administrarea de bortezomib trebuie tratați după cum este prezentat în Tabelul 1 (vezi pct 4.4). Pacienții cu neuropatie severă preexistentă pot fi tratați cu Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă numai după o evaluare atentă a raportului risc/beneficiu.

*Tabelul 1: Modificări recomandate\* ale dozei la pacienții cu neuropatie determinată de bortezomib*

<b>Severitatea neuropatiei</b>	<b>Modificări ale dozei</b>
Grad 1 (asimptomatică; pierdere a reflexelor tendinoase profunde sau parestezie), fără dureri sau disfuncții	Nu se aplică

Grad 1 sau Grad 2 (simptome moderate; limitare a Activităților Cotidiene instrumentale (AC))	Reducere a dozei de Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă până la 1 mg/m <sup>2</sup> sau Schimbarea ritmului de administrare a Bortezomib EVER Pharma la 1,3 mg/m <sup>2</sup> o dată pe săptămână
Gradul 2 cu dureri sau gradul 3 (simptome severe; limitarea AC de autoîngrijire***)	Înteruperea tratamentului cu Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă până la remiterea simptomelor de toxicitate. Când efectele toxice s-au remis, se reinițiază tratamentul cu Bortezomib EVER Pharma, se scade doza la 0,7 mg/m <sup>2</sup> o dată pe
Gradul 4 (consecințe cu risc letal; se recomandă intervenție imediată) și/sau neuropatie vegetativă severă	Se întrerupe tratamentul cu Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă

\* Pe baza modificărilor dozelor în studiile de fază II și III la pacienți cu mielom multiplu și a experienței după punerea pe piață. Clasificare pe baza Criteriilor Comune de Toxicitate ale NCI, CTCAE v 4.0.

\*\* AC instrumentale: se referă la gătit, mersul la cumpărături după alimente sau haine, folosirea telefonului, gestionarea banilor, etc;

\*\*\* AC de autoîngrijire: se referă la spălat, îmbrăcat și dezbrăcat, hrănire, folosirea toaletei, administrarea medicamentelor, fără a fi imobilizat la pat.

#### *Asocierea terapeutică cu doxorubicina lipozomală pegilată*

Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă se administrează prin injectare subcutanată sau - după diluare – prin injectare intravenoasă în doza recomandată de 1,3 mg/m<sup>2</sup> suprafață corporală, de două ori pe săptămână, timp de două săptămâni în zilele 1, 4, 8 și 11, ca parte a unui ciclu de tratament cu durata de 21 de zile. Această perioadă de 3 săptămâni este considerată un ciclu de tratament. Intervalul de timp dintre dozele consecutive de Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă trebuie să fie de minim 72 de ore.

Doxorubicina lipozomală pegilată se administrează în doză de 30 mg/m<sup>2</sup> în ziua 4 a ciclului de tratament cu Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă, prin perfuzie intravenoasă cu durata de 1 oră, administrată după injectarea Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă. Pot fi administrate până la 8 cicluri din acest tratament asociat, atâta timp cât pacienții nu au prezentat progresie a bolii și tolerează tratamentul. Pacienții care au obținut un răspuns complet pot continua tratamentul pentru cel puțin 2 cicluri după prima dovadă a răspunsului complet, chiar dacă aceasta înseamnă tratament pentru mai mult de 8 cicluri. De asemenea, pot continua atâta timp cât tratamentul este tolerat și continuă să răspundă la acesta, pacienții a căror valori de paraproteină continuă să scadă după 8 cicluri.

Pentru informații suplimentare despre doxorubicina lipozomală pegilată, consultați Rezumatul caracteristicilor produsului pentru aceasta.

#### *Asocierea terapeutică cu dexametazonă*

Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă se administrează prin injectare subcutanată sau - după diluare – prin injectare intravenoasă în doza recomandată de 1,3 mg/m<sup>2</sup> suprafață corporală, de două ori pe săptămână, timp de două săptămâni în zilele 1, 4, 8 și 11, ca parte a unui ciclu de tratament cu durata de 21 de zile. Această perioadă de 3 săptămâni este considerată un ciclu de tratament. Intervalul de timp dintre dozele consecutive de Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă trebuie să fie de minim 72 de ore.

Dexametazona se administrează oral în doză de 20 mg în zilele 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 și 12 din ciclul de tratament cu Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă.

La pacienții care obțin un răspuns sau boala se stabilizează după 4 cicluri cu acest tratament asociat se poate continua administrarea aceleiași asociere pentru maxim 4 cicluri suplimentare.

Pentru informații suplimentare despre dexametazonă, vezi Rezumatul caracteristicilor produsului pentru aceasta.

*Ajustarea dozei în asocierea terapeutică la pacienți cu mielom multiplu progresiv*

Pentru ajustarea dozei de Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă în cazul utilizării asocierii terapeutice, urmați ghidurile de modificare a dozei descrise mai sus în cazul monoterapiei.

Doze la pacienții cu mielom multiplu netratați anterior care nu sunt eligibili pentru transplant de celule stem hematopoietice

*Asocierea terapeutică cu melfalan și prednison*

Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă este administrat prin injecție subcutanată sau - după diluție - prin injecție intravenoasă în asociere cu melfalan și prednison administrate pe cale orală, după cum este prezentat în Tabelul 2. O perioadă de 6 săptămâni este considerată a fi un ciclu de tratament. În cadrul Ciclurilor 1-4, Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă este administrat de două ori pe săptămână în zilele 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29 și 32. În cadrul ciclurilor 5-9, Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă este administrat o dată pe săptămână în zilele 1, 8, 22 și 29. Intervalul de timp dintre dozele consecutive de bortezomib trebuie să fie de minim 72 de ore.

Melfalan și prednison trebuie administrate oral în zilele 1, 2, 3 și 4 din prima săptămână a fiecărui ciclu de tratament cu Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă.

Se administrează nouă cicluri de tratament asociat.

*Tabelul 2: Doze recomandate pentru Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă, când este utilizat în asociere cu melfalan și prednison*

<b>Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă de două ori pe săptămână (ciclurile 1-4)</b>													
<b>Săptămâna</b>	<b>1</b>				<b>2</b>			<b>3</b>	<b>4</b>		<b>5</b>	<b>6</b>	
B (1,3mg/m <sup>2</sup> )	Ziua 1	--	--	Ziua 4	Ziua 8	Ziua 11	Pauză	Ziua 22	Ziua 25	Ziua 29	Ziua 32	Pauză	
M (9mg/m <sup>2</sup> ) P (60mg/m <sup>2</sup> )	Ziua 1	Ziua 2	Ziua 3	Ziua 4	--	--	Pauză	--	--	--	--	Pauză	

  

<b>Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă o dată pe săptămână(ciclurile 5-9)</b>													
<b>Săptămâna</b>	<b>1</b>				<b>2</b>			<b>3</b>	<b>4</b>		<b>5</b>		<b>6</b>
B(1,3mg/m <sup>2</sup> )	Ziua 1	--	--	--	Ziua 8			Pauză	Ziua 22		Ziua 29		Pauză
M (9mg/m <sup>2</sup> ) P (60mg/m <sup>2</sup> )	Ziua 1	Ziua 2	Ziua 3	Ziua 4	--			Pauză	--				Pauză

B= bortezomib, M= melfalan, P= prednison

*Ajustările dozei în timpul tratamentului și reinițierea tratamentului pentru terapia asociată cu melfalan și prednison*

Înainte de începerea unui nou ciclu de tratament:

- Numărul de trombocite trebuie să fie  $\geq 70 \times 10^9/l$  și numărul absolut de neutrofile trebuie să fie  $\geq 1,0 \times 10^9/l$
- Efectele toxice altele decât cele hematologice trebuie să se remită până la Gradul 1 sau valoarea inițială

Tabelul 3: Modificări ale dozei în timpul ciclurilor ulterioare ale terapiei cu Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă în asociere cu melfalan și prednison

Toxicitate	Modificare sau amânarea terapiei
<p><i>Toxicitate hematologică în timpul unui ciclu</i></p> <p>- Dacă în ciclul anterior se observă neutropenie sau trombocitopenie prelungită de Grad 4 sau trombocitopenie cu hemoragie</p>	<p>În următorul ciclu trebuie avută în vedere scăderea dozei de melfalan cu 25%.</p>
<p>- Dacă numărul de trombocite <math>\leq 30 \times 10^9/l</math> sau <math>NAN \leq 0,75 \times 10^9/l</math> într-o zi în care se administrează bortezomib (alta decât ziua 1)</p>	<p>Terapia cu Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă trebuie întreruptă</p>
<p>- Dacă nu sunt administrate mai multe doze de bortezomib dintr-un ciclu (<math>\geq 3</math> doze în timpul administrării de două ori pe săptămână sau <math>\geq 2</math> doze în timpul administrării o dată pe săptămână)</p>	<p>Doza de Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă trebuie scăzută cu un nivel (de la <math>1,3 \text{ mg/m}^2</math> la <math>1 \text{ mg/m}^2</math>, sau de la <math>1 \text{ mg/m}^2</math> la <math>0,7 \text{ mg/m}^2</math>)</p>
<p><i>Toxicitate de Grad <math>\geq 3</math>, alta decât cea hematologică</i></p>	<p>Tratamentul cu Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă trebuie întrerupt până când simptomele toxicității s-au remis la Gradul 1 sau valoarea inițială. Apoi, bortezomib poate fi reinițiat cu o scădere de un nivel a dozei (de la <math>1,3 \text{ mg/m}^2</math> la <math>1 \text{ mg/m}^2</math>, sau de la <math>1 \text{ mg/m}^2</math> la <math>0,7 \text{ mg/m}^2</math>). Pentru durere neuropatică și/sau neuropatie periferică asociate cu bortezomib, se menține și/sau se modifică Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă după cum este prezentat în Tabelul 1.</p>

Pentru informații suplimentare privind melfalan și prednison, citiți Rezumatul caracteristicilor produsului pentru aceste medicamente.

Doze la pacienții cu mielom multiplu netratați anterior care sunt eligibili pentru transplant de celule stem hematopoietice (terapie de inducție)

*Asocierea terapeutică cu dexametazonă*

Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă se administrează prin injecție subcutanată sau - după diluție - prin injecție intravenoasă în doza recomandată de  $1,3 \text{ mg/m}^2$  suprafață corporală, de două ori pe săptămână, timp de două săptămâni în zilele 1, 4, 8 și 11 ca parte a unui ciclu de tratament cu durata de 21 de zile. Această perioadă de 3 săptămâni este considerată un ciclu de tratament. Între administrarea dozelor consecutive de Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă trebuie păstrat un interval de timp de cel puțin 72 ore.

Dexametazona se administrează pe cale orală în doză de 40 mg în zilele 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 și 11 ale ciclului de tratament cu Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă.

Se administrează patru cicluri ale acestei asocieri terapeutice.

*Asocierea terapeutică cu dexametazonă și talidomidă*

Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă se administrează prin injecție subcutanată sau - după diluție - prin injecție intravenoasă în doza recomandată de  $1,3 \text{ mg/m}^2$  suprafață corporală, de două

ori pe săptămână, timp de două săptămâni în zilele 1, 4, 8 și 11 ca parte a unui ciclu de tratament cu durata de 28 de zile. Această perioadă de 4 săptămâni este considerată un ciclu de tratament. Între administrarea dozelor consecutive de Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă trebuie păstrat un interval de timp de cel puțin 72 ore.

Dexametazona se administrează pe cale orală în doza de 40 mg în zilele 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 și 11 ale ciclului de tratament cu Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă.

Talidomida se administrează pe cale orală în doza de 50 mg zilnic în zilele 1-14 și dacă este tolerată doza este crescută ulterior la 100 mg zilnic în zilele 15-28 și apoi, poate fi crescută la 200 mg zilnic începând cu ciclul 2 (a se vedea Tabelul 4).

Se administrează patru cicluri ale acestei asocieri terapeutice. Se recomandă administrarea a 2 cicluri suplimentare la pacienții care au cel puțin un răspuns parțial.

*Tabelul 4: Doze pentru asocierea terapeutică cu Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă la pacienții cu mielom multiplunetratați anterior care sunt eligibili pentru transplant de celule stem hematopoietice*

<b>B+Dx</b>	<b>Ciclurile 1 până la 4</b>				
	<b>Săptămâna</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
Bz (1,3 mg/m <sup>2</sup> )	Ziua 1, 4	Ziua 8, 11	Perioada de pauză		
Dx 40 mg	Ziua 1, 2, 3, 4	Ziua 8, 9, 10, 11	-		
<b>B+Dx+T</b>	<b>Ciclul 1</b>				
	<b>Săptămâna</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Bz (1,3 mg/m <sup>2</sup> )	Ziua 1, 4	Ziua 8, 11	Perioada de pauză	Perioada de pauză	
T 50 mg	Zilnic	Zilnic	-	-	
T 100 mg <sup>a</sup>	-	-	Zilnic	Zilnic	
Dx 40 mg	Ziua 1, 2, 3, 4	Ziua 8, 9, 10, 11	-	-	
	<b>Ciclurile 2 până la 4<sup>b</sup></b>				
Bz (1,3 mg/m <sup>2</sup> )	Ziua 1, 4	Ziua 8, 11	Perioada de pauză	Perioada de pauză	
T 200 mg <sup>a</sup>	Zilnic	Zilnic	Zilnic	Zilnic	
Dx 40 mg	Ziua 1, 2, 3, 4	Ziua 8, 9, 10, 11	-	-	

B=bortezomib; Dx=dexametazonă; T=talidomidă

<sup>a</sup>Doza de talidomidă este crescută la 100 mg începând cu săptămâna 3 a ciclului 1 doar dacă este tolerată doza de 50 mg și la 200 mg începând cu ciclul 2 în cazul în care doza de 100 mg este tolerată.

<sup>b</sup>Pacienților care obțin cel puțin un răspuns parțial după 4 cicluri li se pot administra 6 cicluri

#### *Ajustarea dozei la pacienții care sunt eligibili pentru transplant*

Pentru ajustările dozei de Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă, trebuie urmate recomandările privind monoterapia.

În plus, când Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă se administrează în asociere cu alte medicamente chimioterapice, trebuie avută în vedere reducerea corespunzătoare a dozelor acestora în cazul apariției toxicităților, în conformitate cu recomandările din Rezumatul caracteristicilor produsului.

#### Doze la pacienți cu limfom cu celule de manta (LCM) netratați anterior

##### *Asocierea terapeutică cu rituximab, ciclofosfamidă, doxorubicină și prednison (BR-CAP)*

Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă se administrează prin injecție subcutanată sau - după diluare - prin injecție intravenoasă la doza recomandată de 1,3 mg/m<sup>2</sup> suprafață corporală, de două ori pe săptămână, timp de două săptămâni, în zilele 1, 4, 8, și 11, urmată de o perioadă de pauză de 10 zile

în zilele 12-21. Această perioadă de 3 săptămâni este considerată un ciclu de tratament. Se recomandă administrarea a șase cicluri de Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă, deși în cazul pacienților care înregistrează răspuns pentru prima dată în ciclul 6, se pot administra încă două cicluri suplimentare de Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă. Trebuie să treacă cel puțin 72 de ore între dozele consecutive de Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă.

Următoarele medicamente se administrează în ziua 1 a fiecărui ciclu de tratament cu Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă cu durată de 3 săptămâni, prin perfuzie intravenoasă: rituximab la doza de 375 mg/m<sup>2</sup>, ciclofosfamidă la doza de 750 mg/m<sup>2</sup> și doxorubicină la doza de 50 mg/m<sup>2</sup>.

Prednisonul se administrează oral la doza de 100 mg/m<sup>2</sup> în zilele 1, 2, 3, 4 și 5 a fiecărui ciclu de tratament cu Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă.

#### *Ajustări ale dozei în timpul tratamentului administrat pacienților cu limfom cu celule de manta netratați anterior*

Înainte de inițierea unui nou ciclu de tratament:

- Numărul de trombocite trebuie să fie  $\geq 100000$  celule/ $\mu$ L, iar numărul absolut de neutrofile (NAN) trebuie să fie  $\geq 1500$  celule/ $\mu$ L
- Numărul de trombocite trebuie să fie  $\geq 75000$  celule/ $\mu$ L la pacienții cu infiltrații la nivelul măduvei osoase sau la cei cu sechestrare splenică
- Hemoglobina  $\geq 8$  g/dl
- Toxicitățile non-hematologice trebuie să se fi remis la Gradul 1 sau la nivelul inițial.

Tratamentul cu Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă trebuie întrerupt la apariția oricăror toxicități non-hematologice  $\geq$  grad 3 asociate tratamentului cu bortezomib (cu excepția neuropatiei) sau a toxicităților hematologice  $\geq$  grad 3 (vezi și pct. 4.4). Pentru ajustarea dozei vezi tabelul 5 de mai jos.

În cazul toxicităților hematologice se pot administra factori de stimulare a coloniilor de granulocite, conform practicii standard locale.

Trebuie avută în vedere administrarea profilactică a factorilor de stimulare a coloniilor de granulocite în cazul întârzierilor repetate în administrarea ciclului de tratament. Trebuie avută în vedere transfuzia de trombocite pentru tratamentul trombocitopeniei în cazurile în care este clinic indicată.

Tabelul 5: Ajustări ale dozei în timpul tratamentului la pacienți cu limfom cu celule de manta netratat anterior

Toxicitate	Modificare sau amânare a dozelor
<i>Toxicitate hematologică</i>	
- Neutropenie $\geq$ Grad 3 însoțită de febră, neutropenie de Grad 4 ce durează peste 7 zile, număr de trombocite $<$ 10000 celule/ $\mu$ l	Terapia cu Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă trebuie amânată timp de până la 2 săptămâni până când pacientul are NAN $\geq$ 750 celule/ $\mu$ l și un număr de trombocite $\geq$ 25000 celule/ $\mu$ l. - Dacă, după amânarea tratamentului cu Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă toxicitatea nu se remite, așa cum este definit mai sus, atunci tratamentul cu Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă trebuie întrerupt. - Dacă toxicitatea se remite, adică pacientul are NAN $\geq$ 750 celule/ $\mu$ l și număr de trombocite $\geq$ 25000 celule/ $\mu$ l, administrarea de bortezomib se poate reiniția la o doză scăzută cu o treaptă (de la 1,3 mg/m <sup>2</sup> la 1 mg/m <sup>2</sup> sau de la 1 mg/m <sup>2</sup> la 0,7 mg/m <sup>2</sup> ).
- Dacă numărul de trombocite $<$ 25000 celule/ $\mu$ l sau NAN $<$ 750 celule/ $\mu$ l în ziua de administrare a Bortezomib EVER Pharma (în afară de Ziua 1 a fiecărui ciclu)	Terapia cu Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă trebuie amânată
<i>Toxicități non-hematologice de Grad <math>\geq</math> 3 considerate ca fiind asociate cu Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă</i>	Terapia cu Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă trebuie amânată până la remisiunea simptomelor de toxicitate la gradul 2 sau mai bine. Apoi, tratamentul cu Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă se poate reiniția la o doză scăzută cu o treaptă (de la 1,3 mg/m <sup>2</sup> la 1 mg/m <sup>2</sup> sau de la 1 mg/m <sup>2</sup> la 0,7 mg/m <sup>2</sup> ). În cazul durerii neuropate și/sau neuropatiei periferice asociate terapiei cu Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă, aceasta trebuie amânată și/sau modificată după cum este prezentat în Tabelul 1.

În plus, dacă Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă se administrează în asociere cu alte medicamente chimioterapice, trebuie avută în vedere scăderea corespunzătoare a dozei acestor medicamente în cazul apariției toxicităților, conform recomandărilor din Rezumatul caracteristicilor produsului al respectivelor medicamente.

#### Grupe speciale de pacienți

##### *Pacienți vârstnici*

Nu există dovezi care să sugereze că sunt necesare ajustări ale dozelor la pacienții cu vârsta peste 65 de ani cu mielom multiplu sau limfom cu celule de manta.

Nu există studii privind utilizarea bortezomibului la pacienții vârstnici cu mielom multiplu netratați anterior care sunt eligibili pentru chimioterapie în doze mari asociată cu transplant de celule stem hematopoietice.



Prin urmare, la această categorie de pacienți nu se pot face recomandări privind doza.

Într-un studiu, la pacienții netratați anterior pentru limfom cu celule de manta, 42,9% și 10,4% dintre pacienții expuși la bortezumib au avut vârste cuprinse între 65-74 ani și respectiv  $\geq 75$  de ani. La pacienții cu vârsta  $\geq 75$  ani, ambele scheme terapeutice, BR-CAP, precum și R-CHOP, au fost mai puțin tolerate (vezi pct 4.8).

#### *Insuficiență hepatică*

Pacienții cu insuficiență hepatică ușoară nu necesită ajustarea dozei și trebuie tratați cu doza recomandată. La pacienții cu insuficiență hepatică moderată sau severă la care trebuie inițiat tratamentul cu bortezumib cu o doză scăzută de 0,7 mg/m<sup>2</sup> per administrare în cursul primului ciclu de tratament, poate fi luată în considerare creșterea ulterioară a dozei la 1,0 mg/m<sup>2</sup> sau scăderea ulterioară a dozei la 0,5 mg/m<sup>2</sup>, în funcție de tolerabilitatea pacientului (vezi tabelul 6 și pct. 4.4 și 5.2).

*Tabelul 6: Modificarea dozei inițiale recomandate de Bortezumib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă la pacienții cu insuficiență hepatică*

<b>Gradul de insuficiență hepatică*</b>	<b>Bilirubinemie</b>	<b>Valorile TGO (AST) serice</b>	<b>Modificare a dozei inițiale</b>
Ușoară	$\leq 1,0 \times$ LSVN	$> \text{ULN}$	Nu este cazul
	$> 1,0 \times - 1,5 \times$ LSVN	Oricare	Nu este cazul
Moderată	$> 1,5 \times - 3 \times$ LSVN	Oricare	Se reduce doza de bortezumib la 0,7 mg/m <sup>2</sup> în primul ciclu de tratament. Se va lua în considerare creșterea dozei la 1,0 mg/m <sup>2</sup> sau scăderea ulterioară a dozei la 0,5 mg/m <sup>2</sup> în următoarele cicluri terapeutice în funcție de tolerabilitatea pacientului.
Severă	$> 3 \times$ LSVN	Oricare	

*Abrevieri: TGO = transaminaza glutamil oxalacetică serică;*

*AST = aspartat aminotransferaza; LSVN = limita superioară a valorilor normale*

*\* Pe baza clasificării Grupului de Lucru privind Disfuncția de Organ din cadrul NCI pentru încadrarea tipului de insuficiență hepatică (ușoară, moderată, severă).*

#### *Insuficiență renală*

La pacienții cu disfuncție renală ușoară până la moderată [clearance-ul creatininei [Cl Cr]  $> 20$  ml/minut și 1,73 m<sup>2</sup>] farmacocinetica bortezumibului nu este influențată; prin urmare, la acești pacienți nu este necesară modificarea dozei. Nu se cunoaște dacă farmacocinetica bortezumibului este influențată la pacienții cu insuficiență renală severă care nu efectuează ședințe de dializă (ClCr  $< 20$  ml/minut și 1,73 m<sup>2</sup>). Deoarece dializa poate scădea concentrația plasmatică de bortezumib, Bortezumib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă trebuie administrat după dializă (vezi pct. 5.2).

#### *Copii și adolescenți*

Siguranța și eficacitatea utilizării Bortezumib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă nu au fost stabilite la copii și adolescenți cu vârsta sub 18 ani (vezi pct. 5.1 și 5.2). Datele disponibile momentan sunt descrise la pct. 5.1, însă nu pot fi făcute recomandări privind dozajul.

## Mod de administrare

Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă este destinat pentru administrare prin injecție subcutanată sau - după diluare – prin injecție intravenoasă.

Nu trebuie folosite alte căi de administrare pentru Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă. Administrarea intratecală a dus la deces.

### *Administrare intravenoasă*

Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă este diluat inițial la 1 mg/ml (vezi pct. 6.6) și după diluare se administrează sub formă de injecție intravenoasă în bolus, timp de 3-5 secunde, printr-un cateter intravenos plasat periferic sau central, urmată de spălare cu soluție injectabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%). Intervalul de timp dintre dozele consecutive de Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă trebuie să fie de minim 72 de ore.

### *Administrare subcutanată*

Soluția reconstituită de Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă se administrează sub formă de injecție subcutanată la nivelul coapsei (drepte sau stângi) sau la nivelul abdomenului (în partea dreaptă sau stângă). Soluția trebuie injectată subcutant, sub un unghi de 45-90°. Locul de injecție trebuie schimbat la administrări succesive.

Dacă după administrarea subcutanată a Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă apar reacții adverse locale, poate fi administrată o soluție cu concentrație mai mică (1 mg/ml în loc de 2,5 mg/ml), sau se poate trece la administrarea prin injecție intravenoasă.

Atunci când Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă se administrează în asociere cu alte medicamente, se va lua în considerare Rezumatul caracteristicilor produsului al respectivelor medicamente pentru instrucțiuni de administrare.

## **4.3 Contraindicații**

- Hipersensibilitate la substanța activă, la bor sau la oricare dintre excipienții enumerați la pct. 6.1.
- Infilturat pulmonar acut difuz și pericardită.

Atunci când Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă se administrează în asociere cu alt medicament, se va lua în considerare Rezumatul caracteristicilor produsului pentru aceste medicamente pentru contraindicații suplimentare.

## **4.4 Atenționări și precauții speciale pentru utilizare**

Atunci când Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă se administrează în asociere cu alte medicamente, trebuie luat în considerare Rezumatul caracteristicilor produsului pentru aceste medicamente, înainte de inițierea tratamentului cu Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă. Atunci când se utilizează talidomida, este necesară o atenție deosebită în vederea depistării sarcinii și a necesității prevenției acesteia (vezi pct. 4.6).

### Administrare intratecală

Au existat cazuri de deces ca urmare a administrării intratecale inadecvate a bortezomibului. Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă se administrează pe cale subcutanată sau intravenoasă. Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă a nu trebuie administrat pe cale intratecală.

### Toxicitate gastro-intestinală

Efectele toxice gastro-intestinale, incluzând greață, diaree, vărsături și constipație sunt foarte frecvente

în timpul tratamentului cu bortezumib. Mai puțin frecvent au fost raportate cazuri de ileus (vezi pct. 4.8). De aceea pacienții cu constipație trebuie atent monitorizați.

#### Toxicitate hematologică

Tratamentul cu bortezumib se asociază foarte frecvent cu efecte toxice hematologice (trombocitopenie, neutropenie și anemie). În studiile desfășurate la pacienți cu mielom multiplu recidivant care au fost tratați cu bortezumib și la pacienții cu LCM netratați anterior cărora li s-a administrat bortezumib în asociere cu rituximab, ciclofosfamidă, doxorubicină și prednison (BR-CAP), unul din cele mai frecvente efecte toxice hematologice a fost trombocitopenia tranzitorie. Valoarea trombocitelor era cea mai scăzută în ziua 11 a fiecărui ciclu de tratament cu bortezumib și de obicei revenea la valorile inițiale până la ciclul următor. Nu s-a evidențiat trombocitopenie cumulativă. Valoarea medie a numărului minim de trombocite determinat a fost de aproximativ 40% din valoarea inițială în studiile cu monoterapie în mielomul multiplu și de 50% în studiul pentru LCM. La pacienții cu mielom în stadiu avansat severitatea trombocitopeniei s-a corelat cu numărul de trombocite anterior tratamentului: la pacienții cu număr inițial de trombocite  $<75000/\mu\text{l}$ , 90% din 21 pacienți au prezentat în timpul studiului număr de trombocite  $\leq 25000/\mu\text{l}$ , inclusiv 14% cu  $<10000/\mu\text{l}$ ; spre deosebire, la pacienții cu un număr inițial de trombocite  $>75000/\mu\text{l}$ , numai 14% din 309 pacienți au prezentat în timpul studiului un număr de trombocite  $\leq 25000/\mu\text{l}$ .

La pacienții cu LCM (studiul LYM-3002), s-a observat o frecvență crescută (56,7% comparativ cu 5,8%) de apariție a trombocitopeniei de grad  $\geq 3$  la grupul de tratament cu bortezumib (BR-CAP) comparativ cu grupul de tratament fără bortezumib (rituximab, ciclofosfamidă, doxorubicină, vincristină și prednison [R-CHOP]). Cele două grupuri de tratament au fost similare în ceea ce privește incidența globală a evenimentelor hemoragice de toate gradele (6,3% în grupul de tratament BR-CAP și 5,0% în grupul R-CHOP) precum și a evenimentelor hemoragice de grad 3 și superior (BR-CAP: 4 pacienți [1,7%]; R-CHOP: 3 pacienți [1,2%]). În grupul de tratament cu BR-CAP, 22,5% dintre pacienți au primit transfuzii cu trombocite comparativ cu 2,9% din pacienții din grupul de tratament cu R-CHOP.

Hemoragiile gastrointestinale și intracerebrale au fost raportate în asociere cu terapia cu bortezumib. Prin urmare, numărul de trombocite trebuie monitorizat înainte de administrarea fiecărei doze de Bortezumib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă. Tratamentul cu Bortezumib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă trebuie întrerupt în cazul în care numărul de trombocite este  $<25000/\mu\text{l}$  sau în cazul asocierii cu melfalan și prednison, dacă numărul de trombocite este  $\leq 30000/\mu\text{l}$  (vezi pct. 4.2).

Beneficiul potențial al tratamentului trebuie evaluat atent comparativ cu riscurile, în special în cazul trombocitopeniei moderate până la severă și a factorilor de risc pentru hemoragie.

Hemoleucograma completă (HLG) inclusiv formula leucocitară și numărătoarea trombocitelor trebuie monitorizată frecvent în timpul tratamentului cu Bortezumib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă. Transfuzia de trombocite trebuie avută în vedere atunci când este clinic indicată (vezi pct. 4.2)

La pacienții cu LCM, s-a observat neutropenie tranzitorie reversibilă între ciclurile de tratament, fără dovezi de neutropenie cumulativă. Valoarea neutrofilelor era cea mai scăzută în Ziua 11 a fiecărui ciclu de tratament cu bortezumib și de obicei revenea la valorile inițiale până la ciclul următor. În studiul LYM-3002, s-au administrat factori de stimulare a coloniilor la 78% dintre pacienții din brațul de tratament cu BR-CAP și la 61% dintre pacienții din brațul de tratament cu R-CHOP. Deoarece pacienții cu neutropenie prezintă un risc crescut de infecții, aceștia trebuie monitorizați pentru apariția semnelor și simptomelor de infecție și trebuie tratați cu promptitudine. În cazul toxicităților hematologice se pot administra factori de stimulare a coloniilor de granulocite, conform practicii locale standard .

Trebuie avută în vedere administrarea profilactică a factorilor de stimulare a coloniilor de granulocite în cazul întârzierilor repetate în administrarea ciclului de tratament (vezi pct.4.2).

#### Reactivarea virusului Herpes zoster

Profilaxia antivirală este recomandată la pacienții tratați cu Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă.

Într-un studiu clinic de fază III efectuat la pacienți cu mielom multiplu netratat anterior, incidența globală a reactivării virusului *Herpes zoster* a fost mai frecventă la pacienții tratați cu bortezomib+melfalan+prednison comparativ cu cei tratați cu melfalan+prednison (14% comparativ cu 4%).

La pacienții cu LCM (studiul LYM-3002), incidența infecțiilor cu virusul *Herpes zoster* a fost de 6,7% în brațul de tratament cu BR-CAP și de 1,2% în brațul de tratament cu R-CHOP (vezi pct. 4.8).

#### Reactivarea și infecția cu virusul hepatitei B (VHB)

În cazurile când rituximab este utilizat în asociere cu Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă, înainte de inițierea tratamentului trebuie să se efectueze întotdeauna screening-ul pentru VHB la pacienții cu risc de infecție cu VHB. Purtătorii de hepatită B și pacienții cu antecedente de hepatită B trebuie monitorizați cu atenție pentru apariția semnelor clinice și de laborator de infecție activă cu VHB în timpul și după terapia de asociere cu rituximab și Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă. Trebuie avută în vedere profilaxia antivirală. Vezi Rezumatul caracteristicilor produsului pentru informații suplimentare.

#### Leucoencefalopatie multifocală progresivă (LMP)

Au fost raportate la pacienții în tratament cu bortezomib, cazuri foarte rare de cauză necunoscută de infecție cu virus John Cunningham (JC), determinând LMP și deces. Pacienților diagnosticați cu LMP li s-a administrat anterior sau concomitent tratament imunosupresor. Cele mai multe cazuri de LMP au fost diagnosticate nu mai târziu de 12 luni de la administrarea primei doze de bortezomib. Pacienții trebuie monitorizați la intervale regulate de timp pentru orice simptome sau semne neurologice noi sau agravate care ar putea sugera LMP ca parte a diagnosticului diferențial al problemelor de la nivel SNC. Dacă se suspectează un diagnostic de LMP, pacienții trebuie să se adreseze unui specialist în LMP și trebuie inițiate măsuri corespunzătoare de diagnostic pentru LMP. Se întrerupe tratamentul cu Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă în cazul în care LMP este diagnosticat.

#### Neuropatie periferică

Tratamentul cu bortezomib se asociază foarte frecvent cu neuropatie periferică predominant senzorială. Cu toate acestea, s-au raportat cazuri de neuropatie motorie severă cu sau fără neuropatie periferică senzorială. Incidența neuropatiei periferice crește la începutul tratamentului și s-a observat că este maximă în timpul ciclului 5 de tratament.

Se recomandă monitorizarea atentă a pacienților pentru simptome de neuropatie cum sunt senzație de arsură, hiperestezie, hipoestezie, parestezie, disconfort, durere neuropatică sau senzație de slăbiciune.

În cadrul fazei III a unui studiu care a comparat bortezomibul administrat intravenos cu acela administrat subcutanat, incidența evenimentelor de neuropatie periferică de Grad  $\geq 2$  a fost de 24% în grupul cu administrare subcutanată, respectiv 41% în grupul cu administrare intravenoasă ( $p = 0,0124$ ). Neuropatia periferică de Grad  $\geq 3$  a apărut la 6% dintre pacienții din grupul de tratament subcutanat, comparativ cu 16% dintre pacienții din grupul de tratament intravenos ( $p = 0,0264$ ). Incidența neuropatiei periferice de toate gradele, asociată administrării intravenoase de bortezomib, a fost mai scăzută în studiile anterioare cu bortezomib administrat intravenos decât în studiul MMY-3021.

Pacienții la care apare sau se agravează neuropatia periferică, trebuie supuși unei evaluări neurologice și pot necesita ajustarea dozei, sau a schemei terapeutice (vezi pct. 4.2). Neuropatia a fost tratată cu terapie de susținere și alte terapii.

La pacienții cărora li se administrează Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă în asociere cu medicamente cunoscute ca fiind asociate cu neuropatia (de exemplu talidomida) trebuie avută în vedere

monitorizarea precoce și regulată a simptomelor de neuropatie cauzată de tratament împreună cu o evaluare neurologică și trebuie luată în considerare o reducere corespunzătoare a dozei sau întreruperea permanentă a tratamentului.

În anumite cazuri există și o componentă de neuropatie vegetativă cu reacții adverse cum sunt hipotensiunea arterială ortostatică și constipația severă cu ileus, în plus față de neuropatia periferică. Informațiile despre neuropatia vegetativă și rolul acesteia la aceste reacții adverse sunt limitate.

### Convulsii

La pacienții fără antecedente de convulsii sau epilepsie s-au raportat mai puțin frecvent convulsiile. Când se tratează pacienți cu orice factori de risc pentru convulsii, sunt necesare precauții speciale.

### Hipotensiune arterială

Tratamentul cu bortezumib se asociază frecvent cu hipotensiune arterială ortostatică/posturală. Majoritatea reacțiilor adverse sunt ușoare până la moderate și apar în timpul tratamentului. La pacienții la care a apărut hipotensiune arterială ortostatică în timpul tratamentului cu bortezumib (injectare intravenoasă) nu s-a evidențiat existența hipotensiunii arteriale ortostatice anterior tratamentului cu bortezumib. La majoritatea pacienților a fost necesar un tratament pentru hipotensiunea arterială ortostatică. O mică parte dintre pacienții cu hipotensiune arterială ortostatică au prezentat episoade de sincopă. Hipotensiunea arterială ortostatică/posturală nu a avut o legătură strânsă cu administrarea în bolus a bortezumibului. Nu se cunoaște mecanismul acestui efect, deși o componentă poate fi datorată neuropatiei vegetative.

Neuropatia vegetativă poate avea legătură cu bortezumibul sau bortezumibul poate agrava o afecțiune preexistentă, cum este neuropatia diabetică sau amiloidă. Se recomandă prudență la pacienții cu antecedente de sincopă și la care se administrează medicamente cunoscute ca fiind asociate cu hipotensiunea arterială; sau la pacienții deshidratați din cauza diareei sau a vărsăturilor recurente. Tratamentul hipotensiunii arteriale ortostatice/posturale poate include ajustarea dozelor de antihipertensive, rehidratarea sau administrarea de mineralocorticoizi și/sau de simpatomimetice. Pacienții trebuie instruiți să se adreseze medicului dacă apar simptome de amețeală, confuzie sau leșin.

### Sindrom de encefalopatie posterioară reversibilă (SEPR)

Au fost raportate cazuri de SEPR la pacienții cărora li s-a administrat bortezumib. SEPR este o boală neurologică rară, cu evoluție rapidă, deseori reversibilă, care se manifestă prin crize convulsive, hipertensiune arterială, cefalee, letargie, confuzie, cecitate și alte tulburări neurologice și oculare. Imagistica cerebrală, de preferință imagistică prin rezonanță magnetică (IRM), este utilizată pentru a confirma diagnosticul. La pacienții care dezvoltă SEPR, tratamentul cu Bortezumib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă trebuie întrerupt.

### Insuficiență cardiacă

În timpul tratamentului cu bortezumib s-au raportat dezvoltarea în mod acut sau agravarea insuficienței cardiace congestive și/sau apariția scăderii fracției de ejecție a ventriculului stâng. Retenția lichidiană poate fi un factor predispozant pentru semnele și simptomele de insuficiență cardiacă. Pacienții cu factori de risc pentru cardiopatie sau cardiopatie prezentă trebuie monitorizați atent.

### Electrocardiogramă

În studii clinice s-au observat cazuri izolate de prelungire a intervalului QT, fără a fi stabilită cauza.

### Tulburări pulmonare

La pacienții tratați cu bortezumib -au raportat rar boli pulmonare infiltrative difuze acute de etiologie necunoscută precum pneumonie, pneumonie interstițială, infiltrat pulmonar și sindrom de detresă respiratorie acută (SDRA) (vezi pct. 4.8). Unele dintre aceste evenimente au fost letale. Se recomandă

efectuarea unei radiografii toracice înainte de inițierea tratamentului pentru a servi ca referință pentru eventuale modificări pulmonare post tratament.

În eventualitatea unor simptome pulmonare noi sau agravate (de exemplu tuse, dispnee) trebuie evaluat prompt diagnosticul și pacienții trebuie tratați corespunzător. Înainte de a continua terapia cu Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă trebuie luat în considerare raportul risc/beneficiu.

Într-un studiu clinic, doi pacienți (din doi) la care s-au administrat doze mari de citarabină (2 g/m<sup>2</sup> pe zi) în perfuzie continuă timp de 24 ore, în asociere cu daunorubicină și bortezomib, pentru leucemie mieloidă acută recidivată, au decedat prin SDRĂ la scurt timp de la debutul tratamentului și studiul a fost încheiat. De aceea, acest regim specific cu administrare concomitentă de citarabină în doze mari (2 g/m<sup>2</sup> pe zi) prin perfuzie continuă pe durata a 24 de ore, nu este recomandat.

#### Insuficiență renală

Complicațiile renale sunt frecvente la pacienții cu mielom multiplu. Pacienții cu disfuncție renală trebuie monitorizați atent (vezi pct. 4.2 și 5.2).

#### Insuficiență hepatică

Bortezomib este metabolizat de enzimele hepatice. Expunerea la bortezomib este crescută la pacienții cu disfuncție hepatică moderată sau severă; acești pacienți trebuie tratați cu doze scăzute de Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă și monitorizați atent pentru toxicitate (vezi pct. 4.2 și 5.2).

#### Reacții hepatice

S-au raportat cazuri rare de insuficiență hepatică la pacienții tratați cu bortezomib și cărora li s-au administrat concomitent medicamente și care aveau boli grave asociate. Alte reacții hepatice raportate includ creșteri ale valorilor enzimelor hepatice, hiperbilirubinemie și hepatită. Aceste modificări pot fi reversibile după întreruperea tratamentului cu bortezomib (vezi pct. 4.8).

#### Sindrom de liză tumorală

Deoarece bortezomib este o substanță citotoxică, poate distruge rapid celulele maligne plasmatice și celulele LCM și pot să apară complicațiile sindromului de liză tumorală. Pacienții cu impregnare neoplazică mare, anterior tratamentului sunt expuși riscului de sindrom de liză tumorală. Acești pacienți trebuie monitorizați atent și trebuie luate precauțiile adecvate.

#### Administrarea concomitentă de medicamente

Pacienții trebuie să fie monitorizați atent când li se administrează Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă în asociere cu inhibitori puternici ai CYP3A4. Se recomandă prudență când Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă se administrează în asociere cu substraturi ale enzimelor CYP3A4 sau CYP2C19 (vezi pct. 4.5).

La pacienții la care se administrează oral medicamente hipoglicemizante este necesară confirmarea unei funcții hepatice normale și trebuie manifestată prudență (vezi pct. 4.5).

#### Reacții potențial mediate prin complexe imune

S-au raportat, mai puțin frecvent, reacții potențial mediate prin complexe imune, cum ar fi reacții de tip boala serului, poliartrită cu erupții cutanate tranzitorii și glomerulonefrită proliferativă. Dacă apar reacții grave, tratamentul cu bortezomib trebuie întrerupt.

#### Excipienți

Acest medicament conține mai puțin de 1 mmol sodiu (23 mg) pe flacon, astfel că poate fi numit “fără sodiu”.

#### 4.5 Interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiune

Studiile *in vitro* demonstrează că borteomib este un inhibitor slab al izoenzimelor 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 și 3A4 ale citocromului P450 (CYP). Având ca argument contribuția limitată (7%) a CYP2D6 la metabolizarea borteomibului, nu se așteaptă ca fenotipul metabolizatorului slab al CYP2D6 să afecteze distribuția generală a borteomibului.

Un studiu de interacțiune medicamentoasă, care a evaluat efectul ketoconazolului, un inhibitor potent al CYP3A4 asupra farmacocineticii borteomib (administrat intravenos), a arătat o creștere medie a ASC pentru borteomib de 35% (ÎI90% [1,032 la 1,772], bazat pe datele de la 12 pacienți. De aceea, pacienții trebuie să fie atent monitorizați atunci când li se administrează borteomib concomitent cu inhibitori potenți ai CYP3A4 (de exemplu ketoconazol, ritonavir).

Într-un studiu de interacțiune medicamentoasă, care a evaluat efectul omeprazolului, un inhibitor potent al CYP2C19 asupra farmacocineticii borteomib (administrat intravenos), nu s-a evidențiat un efect semnificativ asupra farmacocineticii borteomibului, bazat pe datele obținute de la 17 pacienți.

Într-un studiu de interacțiune medicamentoasă, care a evaluat efectul rifampicinei, un inductor potent al CYP3A4 asupra farmacocineticii borteomib (administrat intravenos), a arătat o scădere medie a ASC pentru borteomib de 45%, bazat pe datele obținute de la 6 pacienți. De aceea, nu se recomandă utilizarea concomitentă a borteomib cu inductori potenți de CYP3A4 (de exemplu : rifampicină, carbamazepină, fenitoină, fenobarbital și sunătoare), din moment ce eficacitatea poate fi scăzută.

În același studiu de interacțiune medicamentoasă, de evaluare a efectului dexametazonei, un inductor mai slab al CYP3A4, asupra farmacocineticii borteomibului (administrat intravenos), nu s-a evidențiat niciun efect semnificativ asupra farmacocineticii borteomibului, bazat pe datele obținute de la 7 pacienți.

Un studiu de interacțiune medicamentoasă efectuat pentru evaluarea efectului melfalan-prednison asupra farmacocineticii borteomib (administrat intravenos) a demonstrat o creștere a ASC medie a borteomib de 17%, pe baza datelor obținute de la 21 pacienți. Aceasta nu este considerată relevantă din punct de vedere clinic.

În timpul studiilor clinice, la pacienții diabetici tratați cu medicamente antidiabetice orale s-au raportat mai puțin frecvent și frecvent hipoglicemie și hiperglicemie. Pacienții tratați cu antidiabetice orale și la care se administrează Borteomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă pot necesita monitorizarea atentă a glicemiei și ajustarea dozei de antidiabetice orale.

#### 4.6 Fertilitatea, sarcina și alăptarea

##### Contracepția la bărbați și femei

În timpul tratamentului și trei luni după tratament, pacienții bărbați și femei aflați la vârsta fertilă trebuie să utilizeze măsuri contraceptive eficiente.

##### Sarcina

Nu sunt disponibile date clinice privind expunerea la borteomib în timpul sarcinii. Potențialul teratogen al borteomibului nu a fost complet studiat.

În studiile preclinice, la cele mai mari doze tolerate de femelele gestante, borteomibul nu a prezentat efecte asupra dezvoltării embrionului /fetusului la șobolan și iepure. Nu s-au efectuat studii la animale pentru a determina efectele borteomib asupra parturii și dezvoltării postnatale (vezi pct. 5.3).

Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă nu trebuie administrat în timpul sarcinii, decât dacă starea clinică a femeii necesită tratament cu bortezomib.

Dacă Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă se utilizează în timpul sarcinii sau dacă pacienta rămâne gravidă în timpul tratamentului cu acest medicament, pacienta trebuie informată despre riscurile potențiale pentru făt.

Talidomida este o substanță activă cu efect teratogen cunoscut la om, care produce malformații congenitale care pun în pericol viața. Talidomida este contraindicată în timpul sarcinii și la femeile aflate la vârsta fertilă, cu excepția cazurilor în care sunt îndeplinite criteriile din programul de prevenire a sarcinii.

Pacienții la care se administrează Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă în asociere cu talidomida trebuie să participe la programul de prevenire a sarcinii în timpul utilizării talidomidei. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să luați în considerare Rezumatul caracteristicilor produsului pentru talidomidă.

#### Alăptarea

La om, nu se cunoaște dacă bortezomib se elimină în laptele matern. Din cauza potențialului de a determina reacții adverse grave la sugarii alăptați, alăptarea trebuie întreruptă pe perioada tratamentului cu Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă

#### Fertilitatea

Nu a fost efectuate studii cu bortezomib privind fertilitatea (vezi pct. 5.3).

### **4.7 Efecte asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje**

Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă poate avea o influență moderată asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă poate fi asociat foarte frecvent cu oboseală, frecvent cu amețeli, mai puțin frecvent cu sincopă și frecvent cu hipotensiune arterială ortostatică/posturală sau cu vedere încețoșată. În consecință, pacienții trebuie să fie prudenți când conduc vehicule sau folosesc utilaje (vezi pct. 4.8).

### **4.8 Reacții adverse**

#### Rezumatul profilului de siguranță

Reacțiile adverse grave mai puțin frecvente raportate în timpul tratamentului cu bortezomib includ insuficiența cardiacă, sindromul de liză tumorală, hipertensiunea pulmonară, sindromul de encefalopatie posterioară reversibilă, afecțiunile pulmonare infiltrative difuze acute și, rar, neuropatia vegetativă. Cele mai frecvente reacții adverse raportate în timpul tratamentului cu bortezomib sunt greața, diareea, constipația, vărsăturile, fatigabilitatea, febra, trombocitopenia, anemia, neutropenia, neuropatia periferică (inclusiv senzorială), cefaleea, parestezia, scăderea apetitului alimentar, dispneea, erupția cutanată tranzitorie, herpesul zoster și mialgia.

#### Rezumatul tabelar al reacțiilor adverse

##### *Mielom multiplu*

Reacțiile adverse menționate în Tabelul 7 au fost considerate de către investigatori a avea cel puțin o relație cauzală, posibilă sau probabilă cu bortezomib. Aceste reacții adverse au la bază un set integrat de date ce provin de la 5476 pacienți dintre care 3996 pacienți au fost tratați cu bortezomib în doză de 1,3 mg/m<sup>2</sup> și au fost incluși în Tabelul 7. La nivel global, bortezomib a fost administrat la 3974 de pacienți pentru tratamentul mielomului multiplu.



Reacțiile adverse sunt prezentate mai jos fiind clasificate pe aparate, sisteme și organe și în funcție de frecvență. Frecvențele sunt definite ca: foarte frecvente ( $\geq 1/10$ ); frecvente ( $\geq 1/100$ ,  $< 1/10$ ); mai puțin frecvente ( $\geq 1/1000$ ,  $< 1/100$ ); rare ( $\geq 1/10000$ ,  $< 1/1000$ ); foarte rare ( $< 1/10000$ ), cu frecvență necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile). În cadrul fiecărei grupe de frecvență reacțiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravității. Tabelul 7 a fost generat utilizând versiunea 14.1 MedDRA.

Reacțiile adverse apărute ulterior punerii pe piață și care nu au fost observate în studiile clinice sunt, de asemenea, incluse.

Tabelul 7: Reacții adverse la pacienți cu mielom multiplu tratați cu bortezomib în studii clinice și toate reacțiile adverse apărute după punerea pe piață, indiferent de indicație<sup>#</sup>

Aparate, sisteme și organe	Frecvență	Reacție adversă
Infecții și infestări	Frecvente	Herpes zoster (inclusiv difuz și oftalmic), pneumonie*, Herpes simplex*, infecție fungică*
	Mai puțin frecvente	Infecție*, infecții bacteriene*, infecții virale*, sepsis (inclusiv șoc septic)*, bronhopneumonie, infecție cu virusul herpetic*, meningoencefalită herpetică#, bacteremie (inclusiv stafilococică), hordeolum, gripă, celulită, infecții asociate dispozitivului, infecții cutanate*, infecție auriculară*, infecție stafilococică*, infecție dentară*
	Rare	Meningită (inclusiv bacteriană), infecție cu virus <i>Epstein-Barr</i> , herpes genital, amigdalită, mastoidită, sindrom de oboseală postvirală
Tumori benigne, maligne și nespecificate (incluzând chisturi și polipi)	Rare	Afecțiune neoplazică malignă, leucemie plasmocitară, carcinom renocelular, formațiune tumorală, micoză fungică, tumori benigne*
Tulburări hematologice și limfatice	Foarte frecvente	Trombocitopenie*, neutropenie*, anemie*
	Frecvente	Leucopenie*, limfopenie*
	Mai puțin frecvente	Pancitopenie*, neutropenie febrilă, coagulopatie*, leucocitoză*, limfadenopatie, anemie hemolitică#
	Rare	Coagulare intravasculară diseminată, trombocitoză*, sindrom de hipervâscozitate, tulburări trombocitare nespecificate, microangiopatie trombotică (inclusiv, purpură trombocitopenică)#, tulburări hematologice nespecificate, diateză hemoragică, infiltrat limfocitar
Tulburări ale sistemului imunitar	Mai puțin frecvente	angioedem#, hipersensibilitate*
	Rare	Șoc anafilactic, amiloidoză, reacții potențial mediate prin complexe imune de tip III
Tulburări endocrine	Mai puțin frecvente	Sindrom Cushing*, hipertiroidism*, secreție inadecvată de hormon antidiuretic
	Rare	Hipotiroidism
Tulburări metabolice și de nutriție	Foarte frecvente	Scăderea apetitului alimentar
	Frecvente	Deshidratare, hipokaliemie*, hiponatremie*, glicemie anormală*, hipocalcemie*, anomalii enzimatic*

<b>Aparate, sisteme și organe</b>	<b>Frecvență</b>	<b>Reacție adversă</b>
	Mai puțin frecvente	Sindrom de liză tumorală, dezvoltare insuficientă*, hipomagnezemie*, hipofosfatemie*, hiperkaliemie*, hipercalcemie*, hipernatremie*, anomalii ale acidului uric*, diabet zaharat*, retenție de lichide
	Rare	Hipermagnezemie*, acidoză, dezechilibru electrolitic*, hipervolemie, hipocloremie*, hipovolemie, hipercloremie*, hiperfosfatemie*, tulburări metabolice, deficit al complexului de vitamine B, deficit de vitamină B 12, gută, creșterea apetitului alimentar, intoleranță la alcool etilic
Tulburări psihice	Frecvente	Modificări și tulburări ale dispoziției*, tulburare de anxietate*, tulburări de somn și dereglări ale somnului*
	Mai puțin frecvente	Tulburări mentale*, halucinații*, tulburare psihotică*, confuzie*, neliniște
	Rare	Ideație suicidară*, tulburare de adaptare, delir, scăderea libidoului
Tulburări ale sistemului nervos	Foarte frecvente	Neuropatii*, neuropatie senzorială periferică, disestezie*, nevralgii*
	Frecvente	Neuropatie motorie*, pierderea conștienței (inclusiv sincopă), amețeli*, disgeuzie*, letargie, cefalee*
	Mai puțin frecvente	Tremor, neuropatie senzitivomotorie periferică, diskinezie*, tulburări de echilibru și de coordonare cerebeloasă*, pierderea memoriei (excepție demența)*, encefalopatie*, sindrom de encefalopatie posterioară reversibilă#, neurotoxicitate, convulsii*, nevralgie post herpetică, tulburări de vorbire*, sindromul picioarelor neliniștite, migrenă, lombosciatică, tulburări de atenție, anomalii ale reflexelor*, parosmie
	Rare	Hemoragie cerebrală*, hemoragie intracraniană (inclusive subarahnoidiană)*, edem cerebral, accident vascular cerebral ischemic tranzitoriu, comă, dezechilibru al sistemului nervos vegetativ, neuropatie vegetativă, paralizie a nervilor cranieni*, paralizie*, pareză*, presincopă, sindrom de trunchi cerebral, tulburare cerebrovasculară, leziune a rădăcinii nervoase, hiperactivitate psihomotorie, compresie medulară, tulburări cognitive nespecificate, disfuncții motorii, tulburări ale sistemului nervos nespecificate, radiculită, salivare, hipotonie, sindrom Guillain-Barré#, polineuropatie demielinizantă#
Tulburări oculare	Frecvente	Tumefacții oculare*, tulburări de vedere*, conjunctivită*
	Mai puțin frecvente	Hemoragii oculare*, infecții palpebrale*, șalazion#, blefarită#, inflamații oculare*, diplopie, xeroftalmie*, iritații oculare*, dureri oculare, creșterea secreției lacrimale, secreții oculare
	Rare	Leziuni ale corneei*, exoftalmie, retinită, scotom, tulburări oculare (inclusiv palpebrale) nespecificate, dacrioadenită dobândită, fotofobie, fotopsie, neuropatie optică, diferite grade ale scăderii acuității vizuale (mergând până la cecitate)*
Tulburări acustice și vestibulare	Frecvente	Vertij*
	Mai puțin frecvente	Disacuzie (inclusiv tinitus)*, deficit de auz (până la și inclusiv surditate), disconfort la nivelul urechii*
	Rare	Hemoragii auriculare, neuronită vestibulară, tulburări acustice nespecificate*

<b>Aparate, sisteme și organe</b>	<b>Frecvență</b>	<b>Reacție adversă</b>
Tulburări cardiace	Mai puțin frecvente	Tamponadă cardiacă#, stop cardiopulmonar*, fibrilație cardiacă (inclusiv atrială), insuficiență cardiacă (inclusiv insuficiență cardiacă ventriculară stângă și dreaptă)*, aritmii*, tahicardie*, palpitații, angină pectorală, pericardită (inclusiv efuzie pericardică)*, cardiomiopatie*, disfuncții ventriculare*, bradicardie
	Rare	Flutter atrial, infarct miocardic*, bloc atrioventricular*, afecțiuni cardiovasculare (inclusiv șoc cardiogen), torsada vârfurilor, angină pectorală instabilă, boli valvulare cardiace*, insuficiență coronariană, stop sinusal
Tulburări vasculare	Frecvente	Hipotensiune arterială*, hipotensiune arterială ortostatică, hipertensiune arterială*
	Mai puțin frecvente	Accident vascular cerebral#, tromboză venoasă profundă*, hemoragii, tromboflebită (inclusiv superficială), colaps circulator (inclusiv șoc hipovolemic), flebită, hiperemie facială*, hematoame (inclusiv perirenale)*, insuficiență circulatorie periferică*, vasculită, hiperemie (inclusiv oculară)*
	Rare	Embolie periferică, limfedem, paloare, eritromelalgie, vasodilatație, modificări de culoare la nivelul venelor, insuficiență venoasă
Tulburări respiratorii, toracice și mediastinale	Frecvente	Dispnee*, epistaxis, infecții ale căilor respiratorii superioare/inferioare*, tuse*
	Mai puțin frecvente	Embolie pulmonară, efuziuni pleurale, edem pulmonar (inclusiv acut), hemoragie pulmonară alveolară#, bronhospasm, boală pulmonară obstructivă cronică*, hipoxemie*, congestie a căilor respiratorii*, hipoxie, pleurezie*, sughit, rinoree, disfonie, wheezing
	Rare	Insuficiență respiratorie, sindrom de detresă respiratorie acută, apnee, pneumotorax, atelectazie, hipertensiune pulmonară, hemoptizie, hiperventilație, ortopnee, pneumonită, alcaloză respiratorie, tahipnee, fibroză pulmonară, afecțiuni bronșice*, hipocapnie*, boală pulmonară interstițială, infiltrație pulmonară, constricție la nivelul gâtului, senzație de uscăciune a gâtului, secreții crescute ale căilor respiratorii superioare, iritație a gâtului, sindromul tusigen al căilor respiratorii superioare
Tulburări gastrointestinale	Foarte frecvente	Simptome cum sunt greață și vărsături*, diaree*, constipație
	Frecvente	Hemoragii gastro-intestinale (inclusiv ale mucoaselor)*, dispepsie, stomatită*, distensie abdominală, dureri orofaringiene*, dureri abdominale (inclusiv dureri gastrointestinale și splenice)*, afecțiuni ale cavității bucale*, flatulență
	Mai puțin frecvente	Pancreatită (inclusiv cronică)*, hematemeză, inflamația buzelor*, obstrucție gastro-intestinală (inclusiv obstrucție a intestinului subțire, ileus)*, disconfort abdominal, ulcerații bucale*, enterită*, gastrită*, hemoragii gingivale, boală de reflux gastro-esofagian*, colită (inclusiv colită cu <i>Clostridium difficile</i> )*, colită ischemică#, inflamație gastro-intestinală*, disfagii, sindrom de colon iritabil, tulburări gastro-intestinale

Aparate, sisteme și organe	Frecvență	Reacție adversă
		nespecificate, limbă încărcată, tulburări de motilitate gastrointestinală*, tulburări ale glandelor salivare*
	Rare	Pancreatită acută, peritonită*, edem lingual*, ascită, esofagită, cheilită, incontinență fecală, atonia sfincterului anal, fecalom, ulceratie și perforație gastrointestinală*, hipertrofie gingivală, megacolon, secreții rectale, pustule orofaringiene*, dureri la nivelul buzelor, periodontită, fisuri anale, tulburări ale tranzitului intestinal, proctalgie, fecale anormale
Tulburări hepatobiliare	Frecvente	Valori anormale ale enzimelor hepatice*
	Mai puțin frecvente	Hepatotoxicitate (inclusiv afecțiuni hepatice), hepatită*, coleastă
	Rare	Insuficiență hepatică, hepatomegalie, sindrom Budd-Chiari, hepatită cu <i>Citomegalovirus</i> , hemoragie hepatică, colelitiază
Afecțiuni cutanate și ale țesutului subcutanat	Frecvente	Erupție cutanată tranzitorie*, prurit*, eritem, xerodermie
	Mai puțin frecvente	Eritem polimorf, urticarie, dermatoză acută neutrofilică febrilă, erupție cutanată toxică, necroliză epidermică toxică#, sindrom Stevens-Johnson#, dermatită*, afecțiuni ale părului*, peteșii, echimoze, leziuni cutanate, purpură, formațiune tumorală cutanată*, psoriazis, hiperhidroză, transpirații nocturne, ulcer de decubit#, acnee*, pustule*, tulburări de pigmentare*
	Rare	Reacție cutanată, infiltrație limfocitară Jessner, sindrom de eritrodisestezie palmo-plantară, hemoragii subcutanate, livedo reticularis, indurații cutanate, vezicule, reacții de fotosensibilizare, seboree, transpirații reci, afecțiuni cutanate nespecificate, eritroză, ulcer cutanat, boli ale unghiilor
Musculoskeletal and connective tissue disorders	Foarte frecvente	Dureri musculo-scheletice*
	Frecvente	Spasme musculare*, dureri la nivelul extremităților, slăbiciune musculară
	Mai puțin frecvente	Crampe musculare, tumefierea articulațiilor, artrită*, rigiditatea articulațiilor, miopatie*, senzație de greutate
	Rare	Rabdomioliză, sindromul articulației temporomandibulare, fistule, efuziune articulară, dureri la nivelul maxilarului, tulburări osoase, infecții și inflamații la nivelul țesutului musculoscheletic și conjunctiv*, chist sinovial
Tulburări renale și ale căilor urinare	Frecvente	Insuficiență renală*
	Mai puțin frecvente	Insuficiență renală acută, insuficiență renală cronică*, infecții ale căilor urinare*, semne și simptome ale căilor urinare*, hematurie*, retenție de urină, tulburări de micțiune*, proteinurie, azotemie, oligurie*, polakiurie
	Rare	Iritația vezicii urinare
Tulburări ale aparatului genital și sânului	Mai puțin frecvente	Hemoragii vaginale, dureri genitale*, disfuncții erectile
	Rare	Afecțiuni testiculare*, prostatită, tulburări ale sânului la femei, sensibilitate epididimală, epididimită, dureri pelvine, ulceratii vulvare
Afecțiuni congenitale,	Rare	Aplazie, malformații gastrointestinale, ihtioză

<b>Aparate, sisteme și organe</b>	<b>Frecvență</b>	<b>Reacție adversă</b>
familiale și genetice		
Tulburări generale și la nivelul locului de administrare	Foarte frecvente	Febră*, fatigabilitate, astenie
	Frecvente	Edeme (inclusiv periferice), frisoane, dureri*, stare generală de rău*
	Mai puțin frecvente	Deteriorare generală a sănătății fizice*, edem facial*, reacție la locul injectării*, afecțiuni ale mucoaselor*, dureri toracice, tulburări de mers, sindrom pseudogripal, extravazare*, complicații asociate cateterului*, modificări ale senzației de sete*, disconfort toracic, senzație de modificare a temperaturii corporale, dureri la locul injectării*
	Rare	Deces (inclusiv subit), insuficiență multiorgan, hemoragii la locul injectării*, hernie (inclusiv hiatală)*, tulburări de vindecare*, inflamație, flebită la locul administrării*, sensibilitate, ulceratii, iritabilitate, dureri toracice altele decât cele de origine cardiacă, dureri în zona cateterului, senzație de corp străin
Investigații diagnostice	Frecvente	Scădere ponderală
	Mai puțin frecvente	Hiperbilirubinemie*, valori anormale ale proteinelor plasmatică*, creștere ponderală, rezultate anormale la analizele de sânge*, proteina C reactivă crescută
	Rare	Valori anormale ale gazelor sanguine*, modificări pe electrocardiogramă (inclusiv prelungire a intervalului QT)*, valori anormale ale ratei normalizate internaționale*, scădere a pH-ului gastric, creștere a agregării plachetare, valori crescute ale concentrației plasmatică a troponinei I, modificări ale testelor de identificare virală și serologice*, valori anormale ale testelor de laborator ale urinei*
Leziuni, intoxicații și complicații legate de procedurile utilizate	Mai puțin frecvente	Căderi, contuzii
	Rare	Reacție la transfuzie, fracturi*, rigiditate*, leziuni faciale, leziuni ale articulațiilor*, arsuri, plăgi lacerate, dureri cauzate de procedurile utilizate, leziuni cauzate de radiație*
Proceduri medicale și chirurgicale	Rare	Activarea macrofagelor

\* Indică termenii unde este inclus mai mult de un termen preferat MedRA

# reacții adverse raportate ulterior punerii pe piață indiferent de indicație

#### *Limfom cu celule de manta (LCM)*

Profilul de siguranță al bortezumibului la 240 pacienți cu LCM tratați cu bortezumib la doza recomandată de 1,3 mg/m<sup>2</sup> în asociere cu rituximab, ciclofosamidă, doxorubicină și prednison (BR-CAP) comparativ cu 242 pacienți tratați cu rituximab, ciclofosamidă, doxorubicină, vincristină și prednison [R-CHOP] a fost relativ concordant cu cel observat la pacienții cu mielom multiplu, diferențele principale fiind descrise mai jos. Reacțiile adverse la medicament identificate suplimentar în contextul utilizării terapiei de asociere (BR-CAP) au fost infecția cu virusul hepatitic B (< 1%) și ischemie miocardică (1,3%). Incidențele similare ale acestor evenimente în ambele brațe de tratament au indicat faptul că aceste reacții adverse la medicament nu se pot atribui doar tratamentului cu bortezumib. Diferențele

importante între categoria de pacienți cu LCM comparativ cu pacienții din studiile cu mielom multiplu au fost o incidență crescută cu  $\geq 5\%$  a reacțiilor adverse hematologice (neutropenie, trombocitopenie, leucopenie, anemie, limfopenie), neuropatie senzorială periferică, hipertensiune arterială, pirexie, pneumonie, stomatită, și afecțiuni ale părului.

În tabelul 8 de mai jos sunt prezentate reacțiile adverse identificate ca având o frecvență  $\geq 1\%$ , o frecvență similară sau mai mare în brațul de tratament cu BR-CAP și ca având o relație de cauzalitate cel puțin posibilă sau probabilă cu componentele brațului de tratament cu BR-CAP. Sunt de asemenea incluse reacțiile adverse la medicament identificate în brațul de tratament cu BR-CAP care au fost considerate de către investigatori ca având cel puțin o relație de cauzalitate posibilă sau probabilă cu bortezomib, pe baza datelor anterioare din studiile pentru mielom multiplu.

Reacțiile adverse sunt enumerate mai jos pe aparate, sisteme și organe și în funcție de frecvență. Frecvențele sunt definite după cum urmează: foarte frecvente ( $\geq 1/10$ ); frecvente ( $\geq 1/100$  și  $< 1/10$ ); mai puțin frecvente ( $\geq 1/1,000$  și  $< 1/100$ ); rare ( $\geq 1/10,000$  și  $< 1/1,000$ ); foarte rare ( $< 1/10,000$ ), cu frecvență necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile). În cadrul fiecărei categorii de frecvență, reacțiile adverse sunt prezentate în ordine descrescătoare a gravității. Tabelul 8 a fost generat utilizând Versiunea 16 a MedDRA.

*Tabelul 8: Reacții adverse la pacienți cu limfom cu celule de manta tratați cu BR-CAP într-un studiu clinic*

<b>Aparate, sisteme, organe</b>	<b>Frecvența</b>	<b>Reacție adversă</b>
Infecții și infestări	Foarte frecvente	Pneumonie*
	Frecvente	Sepsis (inclusiv șoc septic)*, herpes zoster (inclusiv diseminat & oftalmic), infecție cu virusul herpes*, infecții bacteriene*, infecții ale căilor respiratorii superioare / inferioare*, infecție fungică*, herpes simplex*
	Mai puțin frecvente	Infecție cu virusul hepatitic B*, bronhopneumonie
Tulburări hematologice și limfatice	Foarte frecvente	Trombocitopenie*, neutropenie febrilă, neutropenie*, leucopenie*, anemie*, limfopenie*
	Mai puțin frecvente	Pancitopenie*
Tulburări ale sistemului imunitar	Frecvente	Hipersensibilitate*
	Mai puțin frecvente	Reacție anafilactică
Tulburări metabolice și de nutriție	Foarte frecvente	Scăderea apetitului
	Frecvente	Hipopotasemie*, valori anormale ale glicemiei*, hiponatremie*, diabet zaharat*, retenție de lichide
	Mai puțin frecvente	Sindrom de liză tumorală
Tulburări psihice	Frecvente	Tulburări și dereglări ale somnului*
	Foarte frecvente	Neuropatie senzitivă periferică, disestezie*, nevralgii*

Tulburări ale sistemului nervos	Frecvente	Neuropatii*, neuropatie motorie *, pierderea conștienței (inclusiv sincopă), encefalopatie*, neuropatie periferică senzitivo-motorie, amețeli*, disgeuzie*, neuropatie vegetativă
	Mai puțin frecvente	Dezechilibru al sistemului nervos vegetativ
Tulburări oculare	Frecvente	Tulburări de vedere*
Tulburări	Frecvente	Dizacuzii (inclusiv tinitus)*
	Mai puțin frecvente	Vertij*, tulburări de auz (până la și inclusiv surditate)
Tulburări cardiace	Frecvente	Fibrilație cardiacă (inclusiv atrială), aritmie*, insuficiență cardiacă (inclusiv ventriculară stânga și dreapta)*, ischemie miocardică, disfuncție ventriculară*
	Mai puțin frecvente	Tulburări cardiovasculare (inclusiv șoc cardiogen)
Tulburări vasculare	Frecvente	Hipertensiune arterială*, hipotensiune arterială*, hipotensiune arterială ortostatică
Tulburări respiratorii, toracice și mediastinale	Frecvente	Dispnee*, tuse*, sughit
	Mai puțin frecvente	Sindrom de detresă respiratorie acută, embolism pulmonar, pneumonită, hipertensiune pulmonară, edem pulmonar (inclusiv acut)
Tulburări gastrointestinale	Foarte frecvente	Simptome de greață și vărsături*, diaree*, stomatită*, constipație
	Frecvente	Hemoragie gastro-intestinală (inclusiv la nivelul mucoaselor)*, distensie abdominală, dispepsie, durere orofaringiană*, gastrită*, ulcerații orale*, disconfort abdominal, disfagie, inflamație gastro-intestinală*, durere abdominală (inclusiv durere gastro-intestinală și splenică)*, afecțiuni ale cavității bucale*
	Mai puțin frecvente	Colită (inclusiv infecție cu <i>Clostridium difficile</i> )*
Tulburări hepatobiliare	Frecvente	Hepatotoxicitate (inclusiv afecțiuni hepatice)
	Mai puțin frecvente	Insuficiență hepatică
Afecțiuni cutanate și ale țesutului subcutanat	Foarte frecvente	Afecțiuni ale părului*
	Frecvente	Prurit*, dermatită*, erupții cutanate tranzitorii*
Tulburări musculo-scheletice și ale țesutului conjunctiv	Frecvente	Spasme musculare*, dureri musculoscheletice*, dureri la nivelul extremităților
Tulburări renale și ale căilor urinare	Frecvente	Infecții ale tractului urinar*
	Foarte frecvente	Febră*, fatigabilitate, astenie

Tulburări generale și la nivelul locului de administrare	Frecvente	Edem (inclusiv periferic), frisoane, reacție la locul de injectare*, stare de rău*
Investigații diagnostice	Frecvente	Hiperbilirubinemie*, valori anormale ale proteinelor plasmatice*, scădere ponderală, creștere ponderală

\*Grupează mai mult de un termen preferat MedDRA.

### Descrierea anumitor reacții adverse

#### Reactivarea virusului Herpes zoster

##### *Mielom multiplu*

Profilaxia antivirală a fost administrată la 26% din pacienții grupului tratat cu B+M+P. Incidența reactivării virusului herpes zoster la pacienții din grupul tratat cu B+M+P a fost de 17% pentru pacienții cărora nu li s-a administrat profilaxie antivirală comparativ cu 3% pentru pacienții cărora li s-a administrat profilaxie antivirală.

##### *Limfom cu celule de manta*

Profilaxia antivirală a fost administrată la 137 pacienți din 240 (57%) din brațul de tratament cu BR-CAP. Incidența herpes zoster în rândul pacienților din brațul de tratament cu BR-CAP a fost de 10,7% pentru pacienții cărora nu li s-a administrat profilaxia antivirală, comparativ cu 3,6% pentru pacienții cărora li s-a administrat profilaxia antivirală (vezi pct. 4.4).

#### Reactivarea și infecția cu virusul hepatitei B (VHB)

##### *Limfom cu celule de manta*

Infecția cu VHB cu rezultate letale s-a produs la 0,8% (n=2) dintre pacienții din grupul de tratament fără borteomib (rituximab, ciclofosfamidă, doxorubicină, vincristină, și prednison; R-CHOP ) și la 0,4% (n=1) dintre pacienții care au fost tratați cu borteomib în asociere cu rituximab, ciclofosfamidă, doxorubicină, și prednison (BR-CAP). Incidența globală a infecțiilor cu hepatita B a fost similară la pacienții tratați cu BR-CAP sau cu R-CHOP (0,8% comparativ cu 1,2% respectiv).

#### Neuropatia periferică în cazul terapiilor asociate

##### *Mielom multiplu*

În studiile în care borteomib s-a administrat ca tratament de inducție în asociere cu dexametazonă (studiul IFM-2005-01) și cu dexametazonă- talidomidă (studiul MMY-3010), incidența neuropatiei periferice în cazul terapiilor asociate este prezentată în tabelul de mai jos:

*Tabelul 9: Incidența neuropatiei periferice în timpul tratamentului de inducție în funcție de toxicitate și întreruperea tratamentului din cauza neuropatiei periferice*

	IFM-2005-01		MMY-3010	
	VDDx (n=239)	BDx (n=239)	TDx (n=126)	BTDx (n=130)
Incidența NP (%)				
NP de toate gradele	3	15	12	45
NP ≥ grad 2	1	10	2	31
NP ≥ grad 3	< 1	5	0	5
Întreruperi din cauza NP (%)	< 1	2	1	5

VDDx=vincristină, doxorubicină, dexametazonă; BDx=borteomib, dexametazonă; TDx=talidomidă, dexametazonă;

BTDx= borteomib, talidomidă, dexametazonă; NP=neuropatie periferică



Observație: Neuropatia periferică a inclus termenii preferați: neuropatie periferică, neuropatie periferică motorie, neuropatie periferică senzorială și polineuropatiile.

#### *Limfom cu celule de manta*

În studiul LYM-3002 în care bortezomib s-a administrat cu rituximab, ciclofosfamidă, doxorubicină și prednison (R-CAP) incidența neuropatiei periferice în cazul terapiilor asociate este prezentată în tabelul de mai jos:

*Tabelul 10: Incidența neuropatiei periferice în studiul LYM-3002 în funcție de toxicitate și întreruperea tratamentului din cauza neuropatiei periferice*

	<i>BR-CAP (n=240)</i>	<i>R-CHOP (n=242)</i>
<i>Incidența NP (%)</i>		
<i>NP de toate gradele</i>	30	29
<i>NP ≥ grad 2</i>	18	9
<i>NP ≥ grad 3</i>	8	4
<i>Întreruperi din cauza NP (%)</i>	2	< 1

BR-CAP=Bortezomib, rituximab, ciclofosfamidă, doxorubicină și prednison; R-CHOP= rituximab, ciclofosfamidă, doxorubicină, vincristină și prednison; NP= neuropatie periferică

Neuropatia periferică a inclus termenii preferați: neuropatie periferică senzorială, neuropatie periferică, neuropatie periferică motorie și neuropatie periferică senzitivo-motorie.

#### *Pacienții vârstnici cu LCM*

42,9% și 10,4% dintre pacienții din brațul BR-CAP cu vârsta cuprinsă între 65 și 74 ani și cu vârsta ≥ 75 de ani, respectiv. Deși la pacienții cu vârsta ≥ 75 ani, atât BR-CAP cât și R-CHOP au fost mai puțin tolerate, rata de apariție a evenimentelor adverse grave în grupul BR-CAP a fost de 68%, comparativ cu 42% în grupul R-CHOP.

#### *Diferențe semnificative în ceea ce privește profilul de siguranță al bortezomibului administrat subcutanat comparativ cu bortezomib administrat intravenos în monoterapie*

În studiul de fază III, pacienții tratați cu bortezomib administrat subcutanat în comparație cu cei care au fost tratați prin administrare intravenoasă, au avut incidența generală a reacțiilor adverse legate de tratament cu toxicitate de grad 3 sau mai mare mai redusă cu 13%, și o incidență cu 5% mai mică a întreruperii tratamentului cu bortezomib. Incidența generală de apariție a diareei, durerilor gastrointestinale și abdominale, a afecțiunilor astenice, infecțiilor tractului respirator superior și a neuropatiilor periferice a fost mai redusă cu 12%-15% la grupul cu administrare subcutanată decât la grupul cu administrare intravenoasă. În plus, incidența neuropatiilor periferice de grad 3 sau mai mare a fost redusă cu 10 % și rata întreruperii tratamentului din cauza neuropatiilor periferice a fost redusă cu 8% la grupul cu administrare subcutanată în comparație cu grupul cu administrare intravenoasă.

Șase la sută dintre pacienți au avut o reacție adversă locală la administrarea subcutanată, de cele mai multe ori eritem. Aceste cazuri s-au rezolvat într-o perioadă cu o mediană de 6 zile, la unii pacienți fiind necesară modificarea dozei. Doi (1%) dintre pacienți au avut reacții adverse severe: 1 caz de prurit și 1 caz de eritem.

Incidența decesului în timpul tratamentului a fost de 5% în grupul de tratament cu administrare subcutanată și de 7% în grupul de tratament cu administrare intravenoasă. Incidența decesului determinat de "progresia bolii" a fost de 18% în grupul de tratament cu administrare subcutanată și de 9% în grupul de tratament cu administrare intravenoasă.

#### *Repetarea tratamentului la pacienții cu mielom multiplu în faza de recădere*

Într-un studiu efectuat la 130 pacienți cu mielom multiplu în faza de recădere la care s-a repetat tratamentul cu bortezomib, pacienți care au avut anterior un răspuns parțial la schema terapeutică care

a conținut borteomib, cele mai frecvente reacții adverse care au apărut la cel puțin 25% dintre pacienți au fost trombocitopenia (55%), neuropatia (40%), anemia de toate gradele (37%), diareea (35%) și constipația (28%). Au fost observate toate gradele de neuropatie periferică și respectiv, neuropatie periferică de grad  $\geq 3$  la 40% și, respectiv 8,5% dintre pacienți.

#### Raportarea reacțiilor adverse suspectate

Raportarea reacțiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniștii din domeniul sănătății sunt rugați să raporteze orice reacție adversă suspectată la

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478- RO

e-mail: [adr@anm.ro](mailto:adr@anm.ro)

Website: [www.anm.ro](http://www.anm.ro)

## **4.9 Supradozaj**

La pacienți, supradozajul cu doze mai mari de două ori decât dozele recomandate s-a asociat cu instalarea acută a hipotensiunii arteriale simptomatice și a trombocitopeniei cu evoluție letală. Pentru studiile farmacologice preclinice de siguranță cardiovasculară vezi pct. 5.3.

Nu se cunoaște un antidot specific pentru supradozajul cu borteomib. În eventualitatea unui supradozaj, funcțiile vitale ale pacientului trebuie monitorizate și trebuie acordată asistență medicală adecvată de susținere a tensiunii arteriale (precum administrarea de lichide, substanțe presoare și/sau medicamente inotrope) și a temperaturii corpului (vezi pct. 4.2 și 4.4).

## **5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE**

### **5.1 Proprietăți farmacodinamice**

Grupa farmacoterapeutică: antineoplazice, alte antineoplazice ; codul ATC: L01XG01.

#### Mecanismul de acțiune

Borteomib este un inhibitor proteazomal. Este special conceput să inhibe activitatea asemănătoare chemotripsinei a proteazomului 26S în celulele de mamifer. Proteazomul 26S este un complex proteic mare care degradează proteinele de care se leagă ubiquitina. Calea metabolică ubiquitin-proteazomală are un rol esențial în reglarea turnover-ului proteinelor specifice, menținând astfel homeostazia în interiorul celulelor. Inhibarea proteazomului 26S împiedică această proteoliză și afectează multiplele cascade de semnale din interiorul celulei, având ca rezultat final apoptoza celulei neoplazice.

Borteomib prezintă selectivitate mare pentru proteazom. La concentrații de 10  $\mu\text{M}$ , borteomib nu inhibă nici unul dintr-o mare varietate de receptori și proteaze cercetate și este de peste 1500 ori mai selectiv față de proteazom decât față de următoarea enzimă pe care o preferă. Cinetica inhibării proteazomale s-a evaluat *in vitro* și s-a evidențiat că borteomibul disociază de pe proteazom cu un timp de înjumătățire plasmatică de 20 minute, prin aceasta demonstrând că inhibarea proteazomală prin borteomib este reversibilă.

Inhibarea proteazomală mediată prin borteomib afectează celulele neoplazice în câteva moduri, incluzând, dar fără a se limita la, alterarea proteinelor de reglare, care controlează progresia ciclului celular și activarea factorului nuclear kappa B (NF-kB). Inhibarea proteazomului are ca rezultat oprirea ciclului celular și apoptoza. NF-kB este un factor de transcripție a cărui activare este necesară

pentru multe aspecte ale genezei tumorale, inclusiv creșterea și supraviețuirea celulară, angiogeneza, interacțiunile celulă-celulă și metastazarea. În cadrul mielomului multiplu, bortezomibul afectează capacitatea celulelor mielomatoase de a interacționa cu micromediul din măduva osoasă.

Cercetările experimentale au demonstrat că bortezomib este citotoxic pentru o varietate de tipuri de celule neoplazice și că celulele neoplazice sunt mult mai sensibile la efectele pro-apoptotice ale inhibării proteazomale decât celulele normale. Bortezomib determină scăderea creșterii tumorale *in vivo* la multe modele tumorale preclinice, inclusiv în mielomul multiplu.

Date rezultate din studii cu bortezomib efectuate *in vitro*, *ex-vivo* și la modele animale sugerează că acesta crește diferențierea și activitatea osteoblastelor și inhibă funcția osteoclastelor. Aceste efecte au fost observate la pacienți cu mielom multiplu diagnosticat cu o boală osteolitică în stadiu avansat și care au fost tratați cu bortezomib.

#### Eficacitatea clinică la pacienții cu mielom multiplu netratat anterior

Un studiu (MMY-3002 VISTA) clinic prospectiv, de fază III, randomizat (1:1), internațional, deschis, care a inclus 682 pacienți cu mielom multiplu netratat anterior, a fost efectuat pentru a determina dacă bortezomib (1,3 mg/m<sup>2</sup> administrat intravenos) în asociere cu melfalan (9 mg/m<sup>2</sup>) și prednison (60 mg/m<sup>2</sup>) a determinat o îmbunătățire a timpului până la progresia bolii (TPP) comparativ cu melfalan (9 mg/m<sup>2</sup>) și prednison (60 mg/m<sup>2</sup>). Tratamentul a fost administrat maximum 9 cicluri (aproximativ 54 săptămâni) și a fost întrerupt precoce datorită progresiei bolii sau a toxicității majore.

Vârsta mediană a pacienților din studiu a fost de 71 de ani, 50% au fost de sex masculin, 88% au aparținut rasei albe, iar scorul median al statusului de performanță Karnofsky al pacienților a fost de 80. În 63%/25%/8% din cazuri pacienții erau diagnosticați cu mielom multiplu IgG/IgA/cu lanț ușor, mediana valorii hemoglobinei a fost de 105 g/l, iar numărul median de trombocite a fost de 221,5 x 10<sup>9</sup> /l. Proporții similare de pacienți aveau clearance-ul creatininei ≤ 30 ml/min (3% în fiecare braț).

În momentul analizei interimare programate, criteriul final principal, timpul până la progresia bolii a fost îndeplinit și pacienților din grupul M+P li s-a propus tratament B+M+P. Perioada de urmărire mediană a fost de 16,3 luni. Actualizarea finală a ratei de supraviețuire a fost făcută cu o valoare mediană a duratei de urmărire de 60,1 luni. S-a observat o îmbunătățire statistic semnificativă a ratei de supraviețuire în favoarea grupului tratat cu B+M+P (RR=0,695; p=0,00043), în pofida utilizării ulterioare a tratamentelor care au inclus scheme de administrare pe bază de bortezomib. Valoarea mediană a duratei de supraviețuire în grupul tratat cu B+M+P a fost de 56,4 luni, comparativ cu 43,1 luni în grupul tratat cu M+P. Rezultatele privind eficacitatea sunt prezentate în Tabelul 11:

*Tabelul 11: Rezultatele eficacității după actualizarea finală a supraviețuirii în studiul VISTA*

<b>Criteriul final de eficacitate</b>	<b>B+M+P n=344</b>	<b>M+P n=338</b>
<b>Timp până la progresia bolii –</b> Evenimente n (%)	101 (29)	152 (45)
Mediană <sup>a</sup> (Î 95%)	20.7 luni (17,6, 24,7)	15.0 luni (14,1, 17,9)
Rată de risc <sup>b</sup> (Î 95%)	0.54 (0.42, 0.70)	
Valoare p <sup>c</sup>	0.000002	
<b>Supraviețuire fără progresia bolii</b> Evenimente n (%)	135 (39)	190 (56)
Mediană <sup>a</sup> (Î 95%)	18.3 luni (16,6, 21,7)	14.0 luni (11,1, 15,0)

<b>Criteriul final de eficacitate</b>	<b>B+M+P n=344</b>	<b>M+P n=338</b>
Rată de risc <sup>b</sup> (ÎÎ 95%)	0.61 (0.49, 0.76)	
Valoare p <sup>c</sup>	0,00001	
<b>Supraviețuire fără progresia bolii</b>		
Evenimente n (%)	176 (51.2)	211 (62.4)
Mediană <sup>a</sup> (ÎÎ 95%)	56,4 luni (52,8, 60,9)	43,1 luni (35,3, 48,3)
Rată de risc <sup>b</sup> (ÎÎ 95%)	0,695 (0,567, 0,852)	
Valoare p <sup>c</sup>	0.00043	
<b>Rata de răspuns populație<sup>e</sup> n=668</b>	n=337	n=331
CR <sup>f</sup> n (%)	102 (30)	12 (4)
PR <sup>f</sup> n (%)	136 (40)	103 (31)
nCR n (%)	5 (1)	0
CR+PR <sup>f</sup> n (%)	238 (71)	115 (35)
Valoare p <sup>d</sup>	< 10 <sup>-10</sup>	
<b>Scăderea proteinei plasmatice M populație<sup>g</sup> n=667</b>	n=336	n=331
≥90% n (%)	151 (45)	34 (10)
<b>Timp până la primul răspuns în CR + PR</b>		
Mediană	1.4 luni	4.2 luni
<b>Durata mediană a răspunsului</b>		
CR <sup>f</sup>	24,0 luni	12,8 luni
CR+PR <sup>f</sup>	19,9 luni	13,1 luni
<b>Timpul până la următorul tratament</b>		
Evenimente n (%)	224 (65,1)	260 (76,9)
Mediană <sup>a</sup> (ÎÎ 95%)	27,0 luni (24,7, 31,1)	19.2 luni (17,0, 21,0)
Rată de risc <sup>b</sup> (ÎÎ 95%)	0.557 (0.462, 0.671)	
Valoare p <sup>c</sup>	< 0.000001	

a Estimare Kaplan-Meier.

b Estimarea ratei de risc se bazează pe modelul CoX de risc proporțional, adaptat pentru factorii de stratificare: β2-microglobulină, albumină și regiune geografică. O rată de risc mai mică decât 1 indică un avantaj pentru VMP

c Valoarea nominală a p calculată cu testul log-rank stratificat; adaptat pentru factorii de stratificare: β2-microglobulină, albumină și regiune geografică

d Valoarea p pentru Rata de Răspuns (RC + RP) din testul chi-pătrat Cochran-Mantel-Haenszel ajustat pentru factori de stratificare

e Populația evaluabilă include pacienții care au avut boală măsurabilă în momentul inițial

f RC =Răspuns complet; RP=Răspuns parțial, Criteriu EBMT

g Toți pacienții randomizați cu mielom secretor

\* Rata de supraviețuire actualizată pe baza unei valori mediane a duratei de urmărire de 60,1 luni

ÎÎ=Interval de încredere

#### Pacienți eligibili pentru transplant de celule stem

Două studii randomizate, deschise, multicentrice, de fază III (IFM-2005-01, MMY-3010) s-au

desfășurat pentru a demonstra siguranța și eficacitatea bortezomib în asocieri duble și triple cu alte substanțe chimioterapice, ca terapie de inducție înaintea transplantului de celule stem, la pacienți cu mielom multiplu, netratați anterior.

În studiul IFM-2005-01 tratamentul cu bortezomib în asociere cu dexametazonă [BDx, n=240] a fost comparat cu tratamentul cu vincristină- doxorubicină-dexametazonă [VDDx, n=242]. La pacienții din grupul de tratament cu BDx s-au administrat patru cicluri de 21 de zile, fiecare constând din bortezomib (1,3 mg/m<sup>2</sup> administrat intravenos de două ori pe săptămână în zilele 1, 4, 8, și 11) și dexametazonă administrată pe cale orală (40 mg/zi în zilele 1 - 4 și zilele 9 - 12, în Ciclurile 1 și 2, și în zilele 1 - 4 în Ciclurile 3 și 4).

Transplantul autolog de celule stem s-a efectuat la 198 (82%) pacienți și la 208 (87%) din pacienții din grupurile de tratament cu VDDx și, respectiv BDx; la majoritatea pacienților s-a efectuat o singură procedură de transplant. Datele demografice ale pacienților și caracteristicile bolii la momentul inițial au fost similare la cele două grupuri de tratament. Vârsta medie a pacienților din studiu a fost de 57 de ani, 55% dintre pacienți erau de sex masculin și 48% dintre pacienți au prezentat risc citogenetic mare. Durata mediană a tratamentului a fost de 13 săptămâni pentru grupul VDDx și de 11 săptămâni pentru grupul BDx. Numărul median de cicluri administrate ambelor grupuri a fost de 4 cicluri. Criteriul final principal de eficacitate al studiului a fost rata de răspuns post-inducție (RC+nRC). O diferență a ratei de răspuns semnificativă statistic aRC+nRC s-a observat în favoarea grupului la care s-a administrat bortezomib în asociere cu dexametazonă. Alte criterii secundare de evaluare a eficacității au inclus ratele de răspuns post-transplant (RC+nRC, RC+nRC+RPFb+RP), supraviețuirea fără progresia bolii, supraviețuire generală. Rezultatele de eficacitate sunt prezentate în Tabelul 12.

Tabelul 12: Rezultatele de eficacitate din studiul IFM-2005-01

Criteriul final principal	BDx	VDDx	RR; ÎI 95%; valoare p <sup>a</sup>
<b>IFM-2005-01</b>	n=240 (populație în intenție de tratament)	n=242 (populație în intenție de tratament)	
<i>RR (Post-inducție)</i>			
*CR+nCR	14,6 (10,4, 19,7)	6,2 (3,5, 10,0)	2,58 (1,37, 4,85); 0,003
CR+nCR+VGPR+PR % (ÎI 95%)	77,1 (71,2, 82,2)	60,7 (54,3, 66,9)	2,18 (1,46, 3,24); < 0,001
<i>RR (Post-transplant)<sup>b</sup></i>			
CR+nCR	37,5 (31,4, 44,0)	23,1 (18,0, 29,0)	1,98 (1,33, 2,95); 0,001
CR+nCR+VGPR+PR % (ÎI 95%)	79,6 (73,9, 84,5)	74,4 (68,4, 79,8)	1,34 (0,87, 2,05); 0,179

ÎI= interval de încredere; RC=răspuns complet; nRC=răspuns apropiat de răspunsul complet; RR=rată de răspuns; B=bortezomib; BDx= bortezomib, dexametazonă; VDDx=vincristină, doxorubicină, dexametazonă; RPFb=răspuns parțial foarte bun; RP=răspuns parțial, RR=risc relativ estimat;

\* Criteriul final principal

<sup>a</sup> RR pentru ratele de răspuns pe baza estimărilor Mantel-Haenszel pentru riscul relativ estimat pentru tabele stratificate; valorile p după testul Cochran Mantel-Haenszel.

<sup>b</sup> Se referă la rata răspunsului după al doilea transplant la pacienții la care s-a efectuat al doilea transplant (42/240 [18%] la pacienții din grupul BDx și 52/242 [21%] la pacienții din grupul VDDx).

Observație: o valoare a RR > 1 indică un avantaj pentru terapia de inducție ce conține B.

În studiul MMY-3010 tratamentul de inducție cu bortezomib în asociere cu talidomidă și dexametazonă [BTDx, n=130] a fost comparat cu tratamentul cu talidomidă - dexametazonă [TDx, n=127]. La pacienții din grupul de tratament cu BTDx s-au administrat șase cicluri de 4 săptămâni, fiecare constând din bortezomib (1,3 mg/m<sup>2</sup> administrat de două ori pe săptămână în zilele 1, 4, 8, și 11, urmat de o perioadă de pauză de 17 zile începând din ziua 12 și până în ziua 28), dexametazonă (doză de 40 mg administrată pe cale orală în zilele 1 - 4 și zilele 8 - 11) și talidomidă (administrare pe cale orală în doză de 50 mg zilnic în zilele 1-14, apoi doza este crescută la 100 mg în zilele 15-28 și

ulterior la 200 mg zilnic).

Transplantul autolog de celule stem s-a efectuat la 105 (81%) pacienți din grupul de tratament cu BTdx și la 78 (61%) pacienți din grupul de tratament cu TDx. Datele demografice ale pacienților și caracteristicile bolii la momentul inițial au fost similare la cele două grupuri de tratament. Vârsta mediană a pacienților din grupurile BTdx și, respectiv TDx a fost de 57 de ani respectiv 56 de ani, 99% respectiv 98% dintre pacienți au aparținut rasei albe și 58% respectiv 54% dintre pacienți au fost de sex masculin. În grupul de tratament BTdx, 12% dintre pacienți au fost clasificați ca având risc mare citogenetic comparativ cu 16% dintre pacienții din grupul de tratament TDx. Durata mediană a tratamentului a fost de 24,0 săptămâni și numărul de cicluri de tratament administrate a fost de 6,0, tratamentul a fost uniform în grupurile de tratament.

Criteriul final principal de eficacitate al studiului au fost ratele de răspuns post-inducție și posttransplant (RC+nRC). A fost observată o diferență semnificativă statistic a RC+nRC în favoarea grupului la care s-a administrat bortezomib în asociere cu dexametazonă și talidomidă. Alte criterii secundare de evaluare a eficacității au inclus supraviețuirea fără progresia bolii și supraviețuirea generală. Rezultatele de eficacitate principale sunt prezentate în Tabelul 13.

Tabelul 13: Rezultatele de eficacitate din studiul MMY-3010

Criterii finale	BTdx	TDx	RR; Î 95%; Valoare p <sup>a</sup>
<b>MMY-3010</b>	n=130 (populația în intenție de tratament)	n=127 (populația în intenție de tratament)	
*RR (Post-inducție)			
RC+nRC	49,2 (40,4, 58,1)	17,3 (11,2, 25,0)	4,63 (2,61, 8,22); < 0,001 <sup>a</sup>
RC+nRC +RP % (Î 95%)	84,6 (77,2, 90,3)	61,4 (52,4, 69,9)	3,46 (1,90, 6,27); < 0,001 <sup>a</sup>
*RR (Post-transplant)			
RC+nRC	55,4 (46,4, 64,1)	34,6 (26,4, 43,6)	2,34 (1,42, 3,87); 0,001 <sup>a</sup>
RC+nRC +RP % (Î 95%)	77,7 (69,6, 84,5)	56,7 (47,6, 65,5)	2,66 (1,55, 4,57); < 0,001 <sup>a</sup>

Î=interval de încredere; RC=răspuns complet; nRC=răspuns apropiat de răspunsul complet; RR=rată de răspuns;

B=bortezomib; BTdx= bortezomib, talidomidă, dexametazonă; TDx=talidomidă, dexametazonă;

RP=răspuns parțial, RR= risc relativ estimat;

\* Criteriul final principal

<sup>a</sup> RR pentru ratele de răspuns pe baza estimărilor Mantel-Haenszel pentru riscul relativ estimat pentru tabele stratificate; valorile p după testul Cochran Mantel-Haenszel.

Observație: o valoare a RR > 1 indică un avantaj pentru terapia de inducție ce conține Vc.

#### Eficacitatea clinică în cazul mielomului multiplu refractar la tratament sau recidivant

Siguranța și eficacitatea bortezomibului (administrat intravenos) s-au evaluat în 2 studii clinice cu doza recomandată de 1,3 mg/m<sup>2</sup>: un studiu de Fază III randomizat, studiu comparativ (APEX) cu dexametazonă (Dex), la 669 pacienți cu mielom multiplu refractar la tratament sau în faza de recădere, la care s-au administrat anterior 1-3 linii de tratament și un studiu de Fază II cu un singur braț, la 202 pacienți cu mielom multiplu refractar la tratament sau în faza de recădere, la care s-au administrat anterior cel puțin 2 cicluri de tratament și la care s-a observat progresia bolii în cursul tratamentului cel mai recent.

În studiul clinic de Fază III, tratamentul cu bortezomib a condus la o creștere semnificativă a timpului până la progresia bolii, o supraviețuire semnificativ crescută și o rată de răspuns semnificativ mai mare, comparativ cu tratamentul cu dexametazonă (vezi Tabelul 14), la toți pacienții precum și la pacienții la care s-a administrat anterior un ciclu de tratament. Ca rezultat al analizei interimare programate, brațul de tratament cu dexametazonă a fost oprit la recomandarea comitetului de monitorizare a datelor și tuturor pacienților randomizați la tratament cu dexametazonă li s-a administrat bortezomib, indiferent de statutul bolii. Din cauza acestei administrări încrucișate precoce,

durata mediană de supraveghere la pacienții care au supraviețuit a fost de 8,3 luni. Atât la pacienții refractari la ultimul ciclu anterior de tratament, cât și la cei care nu au fost refractari la tratament, supraviețuirea totală a fost crescută semnificativ și rata de răspuns a fost semnificativ mai mare în brațul la care s-a administrat bortezomib.

Dintre cei 669 pacienți incluși în studiu, 245 (37%) aveau vârsta de 65 ani sau peste. Parametrii de răspuns la tratament precum și TTP (timpul până la progresia bolii) au rămas semnificativ mai buni pentru bortezomib, independent de vârstă. Indiferent de valorile inițiale ale  $\beta$ 2-microglobulinei, toți parametrii de eficacitate (timpul până la progresia bolii și supraviețuirea totală, precum și rata de răspuns) au fost îmbunătățiți semnificativ în brațul la care s-a administrat bortezomib.

În populația refractară din studiul clinic de fază II, răspunsurile au fost stabilite de un comitet independent de evaluare și criteriile de răspuns au fost cele ale Grupului European de Transplant de Măduvă Osoasă. Mediana supraviețuirii tuturor pacienților incluși a fost de 17 luni (limite extreme <1 și 36+ luni). Această supraviețuire a fost mai mare decât mediana de supraviețuire de șase-la-nouă luni anticipată de investigatorii clinicieni consultanți pentru o populație similară de pacienți. Prin analiza multivariabilă, rata răspunsului a fost independentă de tipul mielomului, statutul de performanță, statutul deleției cromozomului 13 sau de numărul sau tipul tratamentelor anterioare. Pacienții la care s-au administrat anterior 2 sau 3 cicluri de tratament au prezentat o rată de răspuns de 32% (10/32) și pacienții la care s-au administrat mai mult de 7 cicluri de tratament au prezentat o rată de răspuns de 31% (21/67).

Tabelul 14: Rezumatul consecințelor bolii din studiile de fază III (APEX) și de fază II

	Fază III		Fază III		Fază III		Fază II
	Toți pacienții		1 ciclu anterior de tratament		> 1 ciclu anterior de tratament		≥ 2 cicluri anterioare de tratament
Evenimente în funcție de timp	B n=333 <sup>a</sup>	Dex n=336 <sup>a</sup>	B n=132 <sup>a</sup>	Dex n=119 <sup>a</sup>	B n=200 <sup>a</sup>	Dex n=217 <sup>a</sup>	B n=202 <sup>a</sup>
TTP, zile [Î 95%]	189 <sup>b</sup> [148, 211]	106 <sup>b</sup> [86, 128]	212 <sup>d</sup> [188, 267]	169 <sup>d</sup> [105, 191]	148 <sup>b</sup> [129, 192]	87 <sup>b</sup> [84, 107]	210 [154, 281]
1 an de supraviețuire, % [Î 95%]	80 <sup>d</sup> [74,85]	66 <sup>d</sup> [59,72]	89 <sup>d</sup> [82,95]	72 <sup>d</sup> [62,83]	73 [64,82]	62 [53,71]	60
<b>Cel mai bun răspuns (%)</b>	<b>B n=315<sup>c</sup></b>	<b>Dex n=312<sup>c</sup></b>	<b>B n=128</b>	<b>Dex n=110</b>	<b>B n=187</b>	<b>Dex n=202</b>	<b>B n=193</b>
RC	20 (6) <sup>b</sup>	2 (< 1) <sup>b</sup>	8 (6)	2 (2)	12 (6)	0 (0)	(4)**
RC + nRC	41 (13) <sup>b</sup>	5 (2) <sup>b</sup>	16 (13)	4 (4)	25 (13)	1 (< 1)	(10)**
RC+ nRC + RP	121 (38) <sup>b</sup>	56 (18) <sup>b</sup>	57 (45) <sup>d</sup>	29 (26) <sup>d</sup>	64 (34) <sup>b</sup>	27 (13) <sup>b</sup>	(27)**
RC + nRC+RP+ RM	146 (46)	108 (35)	66 (52)	45 (41)	80 (43)	63 (31)	(35)**
<b>Durata mediană Zile (luni)</b>	242 (8,0)	169 (5,6)	246 (8,1)	189 (6,2)	238 (7,8)	126 (4,1)	385*
<b>Timpul până la răspuns RC + RP (zile)</b>	43	43	44	46	41	27	38*

<sup>a</sup> Populația cu intenție de tratament (ITT)

<sup>b</sup> Valoarea p din testul log-rank stratificat; analiza după liniile de tratament exclude stratificarea după istoricul terapeutic; p<0,0001

<sup>c</sup> Populația care răspunde include pacienții care au avut boală detectabilă la momentul inițial și la care s-a administrat cel puțin o doză de medicament în studiu.

<sup>d</sup> Valoarea p din testul chi-pătrat Cochran-Mantel-Haenszel ajustat pentru factori de stratificare; analiza după liniile de tratament exclude stratificarea după istoricul terapeutic

\* RC+RP+RM \*\*RC=RC, (IF-); nRC=RC (IF+)

NA = nu se aplică, NE = nu s-a estimat

TTP-Timpul până la progresia bolii

ÎÎ=Interval de încredere

B=bortezomib; Dex=dexametazonă

RC=Răspuns complet; nRC = Răspuns apropiat de răspunsul complet

RP=Răspuns parțial; RM =Răspuns minim

În studiul clinic de fază II, pacienții la care nu s-a obținut un răspuns optim la tratamentul cu bortezomib în monoterapie au putut utiliza doze mari de dexametazonă în asociere cu bortezomib. Protocolul a permis pacienților să utilizeze dexametazonă dacă au prezentat un răspuns suboptimal la monoterapia cu bortezomib. Un număr total de 74 pacienți evaluați au utilizat dexametazonă în asociere cu bortezomib. Optsprezece procente din pacienți au obținut sau au prezentat un răspuns ameliorat [RM (11%) sau RP (7%)] la tratamentul asociat.

#### Eficacitatea clinică a administrării subcutanate de bortezomib la pacienți cu mielom multiplu recidivant/refractor la tratament

Un studiu deschis, randomizat, de fază III pentru demonstrarea non-inferiorității a comparat eficacitatea și siguranța administrării subcutanate de bortezomib versus administrarea intravenoasă. Acest studiu a inclus 222 de pacienți cu mielom multiplu recidivant/refractor la tratament, care au fost randomizați în raport de 2:1 să li se administreze 1,3 mg/m<sup>2</sup> de bortezomib, fie pe cale subcutanată sau intravenoasă pentru 8 cicluri. Pacienților care după 4 cicluri nu au obținut un răspuns optim (mai puțin decât Răspuns Complet [RC]) la terapia cu bortezomib administrat în monoterapie, li s-a permis să utilizeze dexametazonă 20 mg zilnic în ziua de administrare și după administrarea bortezomib. Au fost excluși pacienții cu neuropatie periferică de grad  $\geq 2$  sau număr de trombocite <50000/ $\mu$ l. Un număr total de 218 pacienți au fost evaluabili pentru răspuns.

Acest studiu a atins obiectivul principal de non-inferioritate a ratei de răspuns (RC+RP) după 4 cicluri de tratament cu bortezomib în monoterapie, pentru ambele căi de administrare atât cea subcutanată cât și intravenoasă, 42% în ambele grupuri. În plus, obiectivul final secundar de eficacitate corelat cu răspunsul și durata de timp până la apariția evenimentului a demonstrat rezultate concordante atât pentru administrarea subcutanată cât și pentru cea intravenoasă (Tabel 15).

*Tabelul 15: Rezumatul analizelor de eficacitate ce compară administrarea subcutanată și cea intravenoasă a bortezomibului*

	<b>Brațul de administrare intravenoasă a bortezomibului</b>		<b>Brațul de administrare subcutanată a bortezomibului</b>
<b>Populația evaluabilă din punct de vedere al răspunsului</b>	<b>n=73</b>		<b>n=145</b>
<b>Rata Răspunsului după 4 cicluri n (%)</b>			
RR (CR+PR)	31 (42)		61 (42)
Valoarea p <sup>a</sup>		0.00201	
RC n (%)	6 (8)		9 (6)
RP n (%)	25 (34)		52 (36)



nRC n (%)	4 (5)	9 (6)
<b>Rata Răspunsului după 8 cicluri n (%)</b>		
RRG (RC+RP)	38 (52)	76 (52)
Valoarea p <sup>a</sup>	0.0001	
RC n (%)	9 (12)	15 (10)
RP n (%)	29 (40)	61 (42)
nRC n (%)	7 (10)	14 (10)
<b>Populația în intenție de tratament<sup>b</sup></b>	<b>n=74</b>	<b>n=148</b>
<b>TPP, luni</b>	9,4	10,4
(Î95%)	(7,6, 10,6)	(8,5, 11,7)
Rata de risc (Î 95%) <sup>c</sup>	0,839 (0,564, 1,249)	
Valoarea p <sup>d</sup>	0,38657	
<b>Supraviețuire în absența progresiei bolii, luni</b>	8,0	10,2
(Î 95%)	(6,7, 9,8)	(8,1, 10,8)
Rata de risc (Î 95%) <sup>c</sup>	0,824 (0,574, 1,183)	
Valoarea p <sup>d</sup>	0,295	
<b>Supraviețuirea globală 1-an (%)<sup>e</sup></b>	76,7	72,6
(Î95%)	(64,1, 85,4)	(63,1, 80,0)

<sup>a</sup> Valoarea p este pentru ipoteza de non-inferioritate, conform căreia brațul SC își păstrează cel puțin 60% din rata răspunsului pentru brațul IV.

<sup>b</sup> au fost înrolați în studiu 222 de subiecți; 221 de subiecți au fost tratați cu bortezomib

<sup>c</sup> Estimarea ratei de risc se bazează pe un model Cox ajustat pentru factori de stratificare: stadializare ISS și numărul de linii terapeutice anterioare.

<sup>d</sup> Testul log rank ajustat pentru factori de stratificare: stadializare ISS și numărul de linii terapeutice anterioare.

<sup>e</sup> Durata mediană a urmăririi este de 11,8 luni

#### Asocierea terapeutică cu bortezomibși doxorubicină lipozomală pegylată (studiul DOXIL-MMY-3001)

Un studiu multicentric, de fază III, randomizat, cu grupuri paralele, deschis, a fost efectuat la 646 pacienți pentru a evalua siguranța și eficacitatea bortezomib plus doxorubicină lipozomală pegylată comparativ cu monoterapia cu bortezomib la pacienți cu mielom multiplu cărora li s-a administrat cel puțin 1 tratament anterior și care nu au înregistrat progresie a bolii în timpul terapiei cu antracicline. Criteriul final principal de evaluare a eficacității a fost TTP, în timp ce obiectivele secundare de eficacitate au fost SG și RRG (RC + RP), utilizând criteriile Grupului European pentru sânge și transplant de maduvă (EBMT).

O analiză intermediară definită în protocol (pe baza a 249 evenimente TTP) a condus la întreruperea prematură a studiului din motive de eficacitate. Această analiză interimară a indicat o scădere a riscului de TTP cu 45 % (Î 95 %, 29-57% , p < 0,0001) pentru pacienții tratați cu asocierea terapeutică cu bortezomib și doxorubicină lipozomală pegylată. Mediana TPP a fost de 6,5 luni pentru pacienții tratați cu bortezomibîn monoterapie, comparativ cu 9,3 luni pentru pacienții cărora li s-a administrat terapie de asociere cubortezomibplus doxorubicină lipozomală pegylată. Aceste rezultate, deși nu foarte elaborate, au constituit analiza finală definită de protocol.

Analiza finală privind supraviețuirea globală, realizată după o perioadă medie de 8,6 ani, nu a indicat diferențe semnificative privind supraviețuirea globală între cele două brațe de tratament. Supraviețuirea globală medie a fost de 30,8 luni (Î 95% 25,2-36,5 luni) pentru pacienții tratați cu bortezomib în

monoterapie și 33,0 luni (Î 95% 28,9-37,1 luni) pentru pacienții tratați cu bortezomib plus doxorubicină lipozomală pegylată.

#### Asocierea terapeutică bortezomib și dexametazonă

În lipsa unei comparații directe între monoterapia cu bortezomib și asocierea terapeutică cu bortezomib și dexametazonă la pacienți cu mielom multiplu progresiv, s-a efectuat o analiză statistică pe perechi corespunzătoare pentru a compara rezultatele obținute în brațul de tratament ne-randomizat cu bortezomib în asociere cu dexametazonă (studiu deschis, de fază II, MMY-2045), cu rezultatele obținute în brațele de tratament cu bortezomib în monoterapie din diferite studii randomizate, de fază III (M34101-039 [APEX ] și DOXIL MMY-3001) în aceeași indicație.

Analiza pe perechi corespunzătoare este o metodă statistică în care pacienții din grupul de tratament (de exemplu, bortezomib în asociere cu dexametazona) și pacienții din grupul de comparație (de exemplu, bortezomib) sunt comparabili în ceea ce privește factorii de confuzie prin asocierea individuală a subiecților din studiu. Aceasta minimizează efectele factorilor de confuzie observați atunci când se estimează efectele tratamentului, folosind date care nu sunt randomizate.

Au fost identificate o sută și douăzeci și șapte de perechi corespunzătoare pacienților. Analiza a demonstrat îmbunătățirea RRG (RC + RP) (risc relativ 3,769, Î 95 % 2,045-6,947,  $p < 0,001$ ), PFS (rata de risc 0,511; Î 95 % 0,309-0,845;  $p = 0,008$ ), TTP (rata de risc 0,385; Î 95% 0,212-0,698,  $p = 0,001$ ) pentru bortezomib în asociere cu dexametazona comparativ cu monoterapia cu bortezomib.

Sunt disponibile informații limitate cu privire la repetarea tratamentului cu bortezomib la pacienții cu mielom multiplu recidivat.

Studiul MMY-2036 (RETRIEVE) de fază II, cu un singur braț, deschis, a fost realizat în vederea determinării eficacității și siguranței la repetarea tratamentului cu bortezomib. O sută treizeci de pacienți (cu vârsta  $\geq 18$  ani) cu mielom multiplu care au avut anterior cel puțin un răspuns parțial la schemele terapeutice care au conținut și bortezomib s-a repetat tratamentul din cauza progresiei bolii. A fost început tratamentul cu bortezomib la cel puțin 6 luni după tratamentul anterior, cu ultima doză tolerată de 1,3 mg/m<sup>2</sup> (n=93) sau  $\leq 1,0$  mg/m<sup>2</sup> (n=37) și s-a administrat în zilele 1, 4, 8 și 11 la interval de 3 săptămâni, timp de maximum 8 cicluri de tratament, fie în monoterapie, fie în asociere cu dexametazonă, în conformitate cu standardul de îngrijire. Dexametazona a fost administrată în asociere cu bortezomib la 83 pacienți în Ciclul 1, cu un număr suplimentar de 11 pacienți cărora li s-a administrat dexametazonă în timpul ciclurilor de repetare a tratamentului cu bortezomib. Criteriul final principal a fost cel mai bun răspuns confirmat la repetarea tratamentului și a fost evaluat pe baza criteriilor EBMT.

Rata de răspuns cea mai bună generală (RC + RP) la repetarea tratamentului la 130 pacienți a fost de 38,5% (95% Î: 30,1, 47,4).

#### Eficacitatea clinică la pacienții cu limfom cu celule de manta (LCM) netratați anterior

Studiul LYM 3002 a fost un studiu de fază III, randomizat, deschis ce a evaluat eficacitatea și siguranța terapiei de asociere cu bortezomib, rituximab, ciclofosfamidă, doxorubicină și prednison (BR-CAP; n = 243), comparativ cu terapia cu rituximab, ciclofosfamidă, doxorubicină, vincristină și prednison (R-CHOP; n = 244), la pacienți adulți cu LCM, netratați anterior (stadiul II, III sau IV). Pacienții din brațul de tratament cu BR-CAP au utilizat bortezomib (1,3 mg/m<sup>2</sup>; în zilele 1, 4, 8, 11, cu o perioadă de pauză între zilele 12- 21), rituximab 375 mg/m<sup>2</sup> IV în ziua 1; ciclofosfamidă 750 mg/m<sup>2</sup> IV în ziua 1; doxorubicină 50 mg/m<sup>2</sup> IV în ziua 1; și prednison 100 mg/m<sup>2</sup> oral, în ziua 1 până în ziua 5 a ciclului de tratament cu bortezomib cu durata de 21 zile. Pacienții care au avut un răspuns documentat pentru prima dată în ciclul 6, au urmat două cicluri suplimentare de tratament.

Criteriul final principal de eficacitate a fost supraviețuirea fără progresia bolii, bazat pe evaluarea Comitetului independent de evaluare (IRC). Criteriile de evaluare secundare au inclus durata de timp până la progresia bolii (TTP), durata de timp până la următorul tratament anti-limfom (TNT), durata intervalului

fără tratament (TFI), rata răspunsului global (RRG) și rata răspunsului complet (RC/ RCN), supraviețuirea globală (SG) și durata răspunsului.

Caracteristicile demografice și caracteristicile bolii la momentul inițial au fost în general bine echilibrate între cele două brațe de tratament: vârsta medie a pacienților a fost 66 ani, 74% au fost de sex masculin, 66% au fost caucazieni și 32% asiatici, 69% dintre pacienți au avut un aspirat medular pozitiv și /sau o biopsie de măduvă osoasă pozitivă pentru LCM, 54% dintre pacienți au avut un scor de  $\geq 3$  la Indicele Internațional de Prognostic (IPI), iar 76% au avut boală în Stadiul IV. Durata tratamentului (mediana = 17 săptămâni) și durata de urmărire (medie = 40 luni) au fost comparabile în ambele brațe de tratament. Pacienții din ambele brațe de tratament au fost tratați în medie cu 6 cicluri de tratament iar 14% din subiecții din grupul BR-CAP și 17% din pacienții din grupul R-CHOP au urmat 2 cicluri suplimentare de tratament. Majoritatea pacienților din ambele grupuri au finalizat tratamentul, 80% în grupul BR-CAP și 82% în grupul R-CHOP. Rezultatele privind eficacitatea sunt prezentate în tabelul 16:

Tabelul 16: Rezultate privind eficacitatea din studiul LYM-3002

Criteriaul final de eficacitate	BR-CAP	R-CHOP	
n: pacienți ITT	243	244	
<b>Supraviețuire fără progresia bolii (IRC)<sup>a</sup></b>			
Evenimente n (%)	133 (54,7%)	165 (67,6%)	RR <sup>b</sup> (95% ÎÎ)=0,63 (0,50; 0,79)
Mediana <sup>c</sup> (ÎÎ 95%) (luni)	24,7 (19,8; 31,8)	14,4 (12; 16,9)	Valoarea-p <sup>d</sup> < 0,001
<b>Rata de răspuns</b>			
n: pacienți cu răspuns evaluabil	229	228	
Răspuns complet global (RC+RCn) <sup>f</sup> n(%)	122 (53,3%)	95 (41,7%)	OR <sup>e</sup> (95% ÎÎ)=1,688 (1,148; 2,481) Valoarea-p <sup>g</sup> =0,007
Răspuns global (RC+RCn +RP) <sup>h</sup> n(%)	211 (92,1%)	204 (89,5%)	OR <sup>e</sup> (95% ÎÎ)=1,428 (0,749; 2,722) Valoarea-p <sup>g</sup> =0,275

<sup>a</sup> bazată pe evaluarea Comitetului independent de evaluare (IRC) (doar date radiografice).

<sup>b</sup> estimarea ratei de risc se bazează pe un model Cox stratificat în funcție de riscul IPI și stadiul bolii. O rată de risc < 1 indică un avantaj în favoarea BR-CAP.

<sup>c</sup> pe baza estimatorului de produs limită Kaplan-Meier.

<sup>d</sup> pe baza testului Log rank stratificat în funcție de riscul IPI și stadiul bolii.

<sup>e</sup> se utilizează estimarea Mantel-Haenszel privind riscul relativ estimat frecvent pentru tabelele de stratificare, în care factori de stratificare sunt riscul IPI și stadiul bolii. Un risc relativ estimat (OR) > 1 indică un avantaj în favoarea BR-CAP.

<sup>f</sup> Include toate CR+CRu, în funcție de IRC, măduvă osoasă și LDH.

<sup>g</sup> Valoarea -p din testul chi-pătrat după Cochran Mantel-Haenszel, în care factori de stratificare sunt IPI și stadiul bolii .

<sup>h</sup> Include toate evaluările radiografice CR+CRu+PR efectuate de IRC indiferent de verificarea în funcție de măduva osoasă și LDH.

RC= Răspuns complet; RCn= Răspuns complet neconfirmat; RP=răspuns parțial; ÎÎ= Interval de încredere, RR=risc relativ; OR=risc relativ estimat; ITT=Intenția de tratament

Mediana SFP conform evaluării investigatorului a fost de 30,7 luni în grupul de tratament cu BR-CAP și de 16,1 luni în grupul de tratament cu R-CHOP (risc relativ [RR] = 0,51; p <0,001). Un beneficiu semnificativ statistic (p <0,001) în favoarea grupului de tratament cu BR-CAP față de grupul de tratament cu R-CHOP a fost observat pentru TTP (mediana 30,5 comparativ cu 16,1 luni), TNT (mediana 44,5 comparativ cu 24,8 luni) și TFI (mediana 40,6 comparativ cu 20,5 luni). Durata medie a răspunsului complet a fost 42,1 luni în grupul de tratament cu BR-CAP, comparativ 18 luni în grupul de tratament cu

R-CHOP. Durata răspunsului global a fost cu 21,4 luni mai mare în grupul de tratament cu BR-CAP (mediana 36,5 luni comparativ cu 15,1 luni în grupul de tratament cu RCHOP). Analiza finală pentru SG a fost efectuată după o durată medie de urmărire de 82 de luni. Valoarea mediană a SG a fost de 90,7 luni pentru grupul de tratament cu VcR-CAP comparativ cu 55,7 luni pentru grupul R-CHOP (RR = 0,66; p=0,001). Diferența finală medie observată între cele două grupuri de tratament în ceea ce privește SG a fost de 35 de luni.

#### Pacienți tratați anterior pentru amiloidoză cu lanțuri ușoare (LA)

Un studiu de fază I/II deschis, nerandomizat, a fost efectuat pentru a determina siguranța și eficacitatea bortezumibului la pacienții tratați anterior pentru amiloidoză cu lanțuri ușoare (LA). Pe parcursul studiului nu au fost observate noi motive de îngrijorare și în mod particular bortezumib nu a produs o agravarea afectării organelor țintă (inimă, rinichi și ficat). Într-o analiză experimentală a eficacității, la 49 de pacienți evaluați, tratați cu doza maximă admisă de 1,6 mg/m<sup>2</sup> pe săptămână și 1,3 mg/m<sup>2</sup> de două ori pe săptămână, a fost raportată o rată de răspuns de 67,3 % (incluzând o rată a RC de 28,6 %) măsurată prin răspuns hematologic (proteina M). Pentru acest grup, rata de supraviețuire combinată la 1 an a fost de 88,1 %.

#### Copii și adolescenți

Agenția Europeană a Medicamentului a suspendat obligația de depunere a rezultatelor studiilor efectuate cu bortezumib la unul sau mai multe subgrupuri de copii și adolescenți cu mielom multiplu și cu limfom cu celule de manta (vezi pct. 4.2 pentru informații privind utilizarea la copii și adolescenți).

Un studiu de fază II, cu un singur braț, care a evaluat siguranța și farmacocinetica, coordonat de Children's Oncology Group, a evaluat activitatea bortezumibului ca tratament suplimentar la polichimioterapia de re-inducție la copii și adolescenți și adulți tineri cu neoplasme limfatice (leucemie limfoblastică acută cu precursori de celule B (LLA), LLA cu celule T și limfom limfoblastic cu celule T (LL). A fost administrată polichimioterapie de reinducție, în 3 faze. Bortezumib a fost administrat numai în fazele 1 și 2, pentru a evita suprapunerea toxicității cu medicamentele administrate în faza 3.

Răspunsul complet (RC) a fost evaluat la sfârșitul fazei 1. La pacienții cu LLA-B care au avut recidivă în decursul a 18 luni de la diagnosticare (n=27), rata RC a fost 67% (ÎI 95% 46,84); rata supraviețuirii fără evenimente a fost 44% (95% ÎI: 26, 62). La pacienții cu LLA-B cu recidivă la 18-36 luni de la diagnostic (n=33), rata RC a fost 79% (95% CI: 61,91) și rata de supraviețuire fără evenimente în decurs de 4 luni a fost 73% (95% ÎI: 54, 85). Rata RC la pacienții cu LLA la prima recidivă a fost 67% (95% ÎI: 42, 83). Datele de eficacitate raportate nu sunt considerate concludente (vezi pct. 4.2).

140 de pacienți cu LLA sau LL au fost înrolați în studiu și evaluați din punct de vedere al siguranței; vârsta medie a fost 10 ani (interval 1-26). Nu au fost identificate probleme de siguranță atunci când bortezumib a fost adăugat la chimioterapia copiilor și adolescenților cu LLA cu precursori de celule B. Următoarele reacții adverse (Grad  $\geq 3$ ) au fost observate cu o incidență mai mare la pacienții tratați doar cu bortezumib, comparativ cu pacienții tratați doar cu o schemă terapeutică de bază: în faza 1, neuropatie periferică senzorială (3% comparativ cu 0%), ileus (2,1% comparativ cu 0%), hipoxie (8% comparativ cu 2%). Nu au fost disponibile informații cu privire la urmări posibile sau rate ale remisiei neuropatiei senzoriale în acest studiu. De asemenea, au fost observate incidențe mai mari în cazul infecțiilor asociate neutropeniei de grad  $\geq 3$  (24% comparativ cu 19% în faza 1 și 22% comparativ cu 11% în faza 2) și hiponatremiei (12% comparativ cu 5% în faza 1 și 4% comparativ cu 0 în faza 2).

## 5.2 Proprietăți farmacocinetice

### Absorbție

După administrarea intravenoasă în bolus a unei doze de 1,0 mg/m<sup>2</sup> și 1,3 mg/m<sup>2</sup> la 11 pacienți cu mielom multiplu și valori ale clearance-ului creatininei mai mari de 50 ml/minut, mediile concentrațiilor plasmatiche maxime de bortezomib după prima doză au fost de 57 și respectiv 112 ng/ml. La următoarele administrări, mediile concentrațiilor plasmatiche maxime observate au fost cuprinse între 67 până la 106 ng/mL pentru doza de 1,0 mg/m<sup>2</sup> și de la 89 la 120 ng/ml, pentru doza de 1,3 mg/m<sup>2</sup>.

În urma injectării intravenoase în bolus sau a injectării subcutanate a unei doze de 1,3 mg/m<sup>2</sup> la pacienți cu mielom multiplu (n = 14 în grupul cu administrare intravenoasă, n = 17 în grupul cu administrare subcutanată), expunerea sistemică totală după administrarea dozelor repetate (ASC<sub>last</sub>) a fost echivalentă pentru administrările subcutanate și intravenoase. C<sub>max</sub> după administrare subcutanată (20,4 ng/ml) a fost mai mică decât după administrare IV (223 ng/ml). Raportul mediei geometrice ASC<sub>last</sub> a fost de 0,99 și intervalele de încredere de 90% au fost 80,18% - 122,80%.

### Distribuție

Volumul mediu de distribuție (V<sub>d</sub>) al bortezomibului a variat între 1659 litri și 3294 litri după administrarea intravenoasă în doză unică sau doze multiple de 1,0 mg/m<sup>2</sup> sau de 1,3 mg/m<sup>2</sup> la pacienții cu mielom multiplu. Aceasta sugerează că bortezomibul se distribuie într-o mare măsură în țesuturile periferice. Într-un interval de concentrații de bortezomib de la 0,01 μg/ml până la 1,0 μg/ml, la om, legarea de proteinele plasmatică *in vitro* a atins o medie de 82,9%. Frația de bortezomib legată de proteinele plasmatiche nu a fost dependentă de concentrație.

### Metabolizare

Studiile *in vitro* cu microzomi hepatici umani și izoenzime umane ale citocromului P450 expresie a ADNc indică faptul că bortezomib este metabolizat oxidativ în principal prin intermediul enzimelor 3A4, 2C19 și 1A2 ale citocromului P450. Calea metabolică principală este deborinarea pentru a forma doi metaboliți deboronați care sunt ulterior hidroxilați la diferiți metaboliți. Metaboliții deboronați ai bortezomibului nu prezintă activitate de inhibare a proteazomului 26S.

### Eliminare

Timpul mediu de înjumătățire prin eliminare (t<sub>1/2</sub>) al bortezomibului după doze multiple a variat între 40-193 de ore. Bortezomib este eliminat mai rapid după prima doză în comparație cu dozele ulterioare. Mediile clearance-ului corporal total a fost de 102 și 112 l/oră după prima doză, pentru doze de 1,0 mg/m<sup>2</sup>, respectiv de 1,3 mg/m<sup>2</sup> și a variat de la 15 la 32 l/oră și 18 la 32 l/oră după doze ulterioare, pentru doze de 1,0 mg/m<sup>2</sup>, respectiv de 1,3 mg/m<sup>2</sup>.

### Grupe speciale de pacienți

#### Disfuncție hepatică

Efectul disfuncției hepatice asupra farmacocineticii bortezomib a fost evaluat într-un studiu de fază I pe perioada primului ciclu terapeutic, la 61 de pacienți care au în principal tumori solide și grade variate de disfuncție hepatică cu doze variate de bortezomib de la 0,5 la 1,3 mg/m<sup>2</sup>.

Comparativ cu pacienții cu funcție hepatică normală, disfuncția hepatică ușoară nu a alterat ASC a dozei normalizate de bortezomib. Cu toate acestea, valorile ASC medii ale dozei normalizate au crescut cu aproximativ 60% la pacienții cu disfuncție hepatică moderată sau severă. O doză de inițiere mai scăzută este recomandată la pacienții cu disfuncție hepatică moderată sau severă, iar acești pacienți trebuie monitorizați cu atenție (vezi pct. 4.2, tabelul 6).

#### Disfuncție renală

A fost efectuat un studiu de farmacocinetică la pacienți cu diverse grade de disfuncție renală care au fost clasificați în funcție de valorile clearance-ului la creatinină (Cl Cr): funcție renală normală (Cl

Cr>60ml/minut și 1,73m<sup>2</sup>, n=12), disfuncție renală ușoară (Cl Cr=40-59 ml/min și 1,73m<sup>2</sup>, n=10), disfuncție renală moderată (Cl Cr=20-39 ml/minut și 1,73m<sup>2</sup>, n=9) și disfuncție renală severă (Cl Cr<20 ml/minut și 1,73m<sup>2</sup>, n=3). A fost inclus în studiu și un grup de pacienți care efectuau dializă cărora li s-a administrat tratament după dializă (n=8). Pacienților li s-a administrat bortezomib intravenos în doză de 0,7-1,3mg/m<sup>2</sup> de două ori pe săptămână. Expunerea la bortezomib (ASC și C max corectate în funcție de doză) au fost comparabile pentru toate grupurile (vezi pct. 4.2).

### Vârsta

Farmacocinetica bortezomibului a fost caracterizată după administrarea în bolus intravenos de două ori pe săptămână a unor doze de 1,3 mg/m<sup>2</sup> la 104 pacienți copii și adolescenți (cu vârsta între 2 și 16 ani) cu leucemie limfoblastică acută (LLA) sau leucemie mieloidă acută (LMA). Pe baza analizei farmacocinetice populaționale, clearance-ul bortezomibului a crescut o dată cu suprafața corporală (BSA). Media geometrică a clearance-ului (%CV) a fost 7,79 (25%) L/h/m<sup>2</sup>, volumul de distribuție în fază staționară a fost 834 (39%) L/m<sup>2</sup>, iar timpul de înjumătățire prin eliminare a fost 100 (44%) de ore. După corecția efectului BSA, alte variabile precum vârsta, greutatea corporală și sexul nu au avut efecte semnificative clinic asupra clearance-ului bortezomibului. Clearance-ul normalizat cu BSA al bortezomibului la pacienții copii și adolescenți a fost similar celui observat la adulți.

### **5.3 Date preclinice de siguranță**

La evaluarea *in vitro* a aberațiilor cromozomiale, utilizând celule ovariene de hamster chinezesc (CHO), la concentrații mici de 3,125 μg/ml, care a fost concentrația cea mai mică studiată, bortezomibul a prezentat un rezultat pozitiv privind activitatea clastogenică (aberații cromozomiale structurale). Bortezomibul nu a prezentat genotoxicitate când a fost testat prin evaluarea mutagenității *in vitro* (testul Ames) și *in vivo* prin testul micronucleilor la șoarece.

Studiile de toxicitate asupra dezvoltării la șobolan și iepure au prezentat efecte letale embrio-fetale la doze toxice pentru femelă, dar nu și toxicitate directă embrio-fetală la doze mai mici decât dozele toxice pentru femela gestantă. Nu s-au realizat studii de fertilitate, dar evaluarea țesuturilor implicate în funcția reproductivă a fost efectuată în studiile de toxicitate generală. Într-un studiu cu durata de 6 luni la șobolan s-au observat efecte degenerative atât în testicule, cât și în ovare. De aceea, este probabil ca bortezomib să prezinte efect potențial asupra fertilității masculine sau feminine. Nu s-au realizat studii de dezvoltare peri- și postnatală.

În studii multi-ciclu de toxicitate generală efectuate la șobolan și maimuță, principalele organe țintă au inclus tractul gastro-intestinal având ca rezultat vărsături și/sau diaree; țesuturile hematopoietic și limfatic rezultând citopenie în sângele periferic, atrofia țesutului limfatic și hipocelularitatea măduvei osoase hematopoietice, neuropatie periferică (observată la maimuță, șoarece și câine) implicând axonii nervilor senzitivi și ușoare modificări la nivelul rinichiului. După întreruperea tratamentului, în toate aceste organe țintă s-a demonstrat o recuperare parțială până la totală.

Pe baza studiilor la animale, traversarea barierei hemato-encefalice de către bortezomib pare să fie scăzută dacă aceasta există și relevanța la om nu este cunoscută.

Studiile farmacologice de siguranță cardiovasculară la maimuță și câine au evidențiat că doze administrate intravenos de aproximativ două până la trei ori mai mari decât doza clinică recomandată exprimată în mg/m<sup>2</sup> sunt asociate cu creșteri ale frecvenței cardiace, scăderea contractilității, hipotensiune arterială și letalitate. La câine, scăderea contractilității cardiace și hipotensiunea arterială au prezentat răspuns la intervenția rapidă cu medicamente inotrop pozitive și vasopresoare. Mai mult, în studiile efectuate la câine s-a observat o creștere ușoară a intervalului QT corectat.

## **6. PROPRIETĂȚI FARMACEUTICE**

## 6.1 Lista excipienților

Manitol  
Clorură de sodiu  
Hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului)  
Acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului)  
Apă pentru preparate injectabile

## 6.2 Incompatibilități

Acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente, cu excepția celor menționate la pct. 6.6.

## 6.3 Perioada de valabilitate

18 luni

Stabilitatea înaintea utilizării

Stabilitatea chimică și fizică după prima deschidere și/sau diluare a fost demonstrată pentru:

- 28 zile, păstrată la 2°C - 8°C și ferită de lumină
- 28 zile, păstrată la 25°C și ferită de lumină
- 24 ore, păstrată la 25°C și condiții normale de lumină în flaconul original și/sau în seringă din polipropilenă.

Din punct de vedere microbiologic, soluția reconstituită trebuie utilizată imediat, cu excepția cazului în care metoda de reconstituire exclude riscul de contaminare microbiană. Dacă nu este utilizată imediat, timpul și condițiile de păstrare constituie responsabilitatea utilizatorului.

În timpul reconstituirii pentru administrare și în timpul administrării nu este necesar ca medicamentul să fie ferit de lumină.

## 6.4 Precauții speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2°C - 8°C).

A se păstra flaconul în cutie pentru a fi protejat de lumină.

Pentru condiții de depozitare după prima deschidere și/sau diluare a medicamentului, vezi pct. 6.3.

## 6.5 Natura și conținutul ambalajului

Flacon din sticlă incoloră de tip I, prevăzut cu dop din cauciuc bromobutlic și o capsă din aluminiu cu disc din plastic.

Mărimi de ambalaj

- 1 x flacon de 1 ml (2,5 mg/1 ml)
- 5 x 1 flacoane de 1 ml (2,5 mg/1 ml)
- 1 x flacon de 1,4 ml (3,5 mg/1,4 ml)
- 5 x flacoane de 1,4 ml (3,5 mg/1,4 ml)

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

## 6.6 Precauții speciale pentru eliminarea reziduurilor și alte instrucțiuni de manipulare

### Precauții generale

Bortezomib este un medicament citotoxic. De aceea, Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă trebuie manipulat și preparat cu prudență. Se recomandă utilizarea mănușilor și a altor piese de îmbrăcăminte cu rol protector pentru a preveni contactul cu pielea.

Persoanele însărcinate nu ar trebui să manipuleze acest medicament.

**Tehnica aseptică** trebuie respectată strict în timpul manipulării Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă deoarece acesta nu conține nici un conservant.

Au existat cazuri letale de administrare inadecvată a bortezomibului pe cale intratecală.

Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg pulbere pentru soluție injectabilă se administrează prin injectare subcutanată sau - după diluare – prin injectare intravenoasă.

Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă nu trebuie administrat intratecal.

### Instrucțiuni pentru preparare și administrare

Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg pulbere pentru soluție injectabilă trebuie pregătit de un profesionist în domeniul sănătății.

Fiecare flacon conține o cantitate suplimentară de 0,2 mg.

#### *Administrare intravenoasă*

Fiecare flacon cu capacitatea de 1 ml de Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă trebuie diluat cu 1,8 ml soluție injectabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9 %) pentru administrare intravenoasă prin folosirea unei seringi de volum corespunzător, fără a îndepărta dopul flaconului.

#### SAU

Fiecare flacon cu capacitatea de 1 ml de Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă trebuie diluat cu 2,4 ml soluție injectabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9 %) pentru administrare intravenoasă prin folosirea unei seringi de volum corespunzător, fără a îndepărta dopul flaconului.

După diluare, fiecare ml de soluție conține 1 mg de bortezomib. Soluția diluată este limpede și incoloră până la galben deschis, cu un pH final de 4 până la 7. Soluția diluată trebuie inspectată vizual înainte de administrare, pentru a observa eventualele particule sau modificări de culoare. Dacă este observată orice modificare de culoare sau particule în suspensie, soluția diluată trebuie eliminată.

#### *Administrare subcutanată*

Fiecare flacon de Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă este gata de a fi folosit pentru injectare subcutanată. Fiecare ml de soluție conține 2,5 mg de bortezomib. Soluția este limpede și incoloră până la galben deschis, cu un pH de 4 până la 5,5. Soluția trebuie inspectată vizual înainte de administrare, pentru a observa eventualele particule sau modificări de culoare. Dacă este observată orice modificare de culoare sau particule în suspensie, soluția trebuie eliminată.

### Eliminare

Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml soluție injectabilă este numai pentru folosință unică. Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale pentru agenți citotoxici.



**7. DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

EVER Valinject GmbH  
Oberburgau 3  
4866 Unterach am Attersee  
Austria

**8. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

14860/2023/01-04

**9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI**

Data primei autorizări: Ianuarie 2023

**10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI**

Ianuarie 2023